

84/c E. xv. b
18


3 vols
62

Deus + Smith
2/8/10

9m2
69
96

58. f. 20

24771.



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28772453_0001

HEDENDAAGSCHE

OEFFENENDE

HEELKUNDE.

HERBERT A. VOSCH

NEW YORK

HERBERT A. VOSCH

HEDENDAAGSCHE
OEFFENENDE
HEELKUNDE.


DOOR

DAVID VAN GESSCHER,

*Heelmeester van het St. Pieters Gasthuis te Amsterdam, Lid van de Hollandsche
Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem, van het Zeeuwsch Genoot-
schap der Weetenschappen te Vlisfingen, en van het Provinciaal Utrecht-
sche Genootschap van Konsten en Weetenschappen.*

MET PLATEN.

EERSTE DEEL.



TE AMSTERDAM,
BY JAN DÓLL,

MDCCLXXI.

THE JOURNAL OF THE
ROYAL MEDICAL SOCIETY




NEW YORK: G. P. PUTNAM'S SONS, 1895.

Published by the Royal Medical Society, 11, St. Andrews Place, Regent's Park, London, W.1.

Vol. 1, No. 1, 1895.

Price 1s. 6d.



THE JOURNAL OF THE
ROYAL MEDICAL SOCIETY
LONDON

D E N
WEL EDELEN HOOGGELEERDEN HEERE,
D E N H E E R E

A N D R E A S B O N N ,

Hoogleeraar der Ontleed- Heel- en Verloskunde, aan het Doorluchte School te Amsterdam; Lid van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem, van het Zeeuwsch Genootschap der Weetenschappen te Vlisfingen, van het Provinciäal Genootschap van Konsten en Weetenschappen te Utrecht; Lid Consultant van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam; Directeur van de Maatschappye ter redding der Drenkelingen, te Amsterdam, enz. enz. enz.

M I T S G A D E R S

D E
WEL EDELE ZEER GELEERDE HEEREN,
D E H E E R E N

J A C O B U S H O V I U S ,

Med. Doctor, Lid van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen.

H E R M A N N U S G E R A R D U S O O S T E R D Y K ,

Med. Doctor der Stad, van het Edelmoogend Collegie ter Admiraliteit, van het St. Pieters Gasthuis, Inspecteur van het Collegium Medicum, en Directeur van de Maatschappye ter redding der Drenkelingen te Amsterdam; Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Weetenschappen te Vlisfingen, als ook van het Provinciaal Genootschap van Konsten en Weetenschappen te Utrecht.

D I R K T I M M E R ,

Inspecteur van het Collegium Medicum, en Stads Apotheker te Amsterdam.

WORDT DIT

W E R K

M E T

ONGEVEINSDE HOOGAGTING

E N

DEN MEEST MOOGLYKEN EERBIED

T O E G E W Y D,

D O O R

DEN SCHRYVER.

V O O R.

VOORREEDEN.

*H*et getal der Heelkundige Saamenstelsels is zeer groot. Men vind egter weinige die voldoen aan het oogmerk ten opzichte hunner inhoud; en nog minder, waarin kortheid en volledigheid, beleezenheid en oordeelkunde, beschouwlyke kennis en ondervinding, in eene juiste evenreedigheid saamenloopen.

Sommige ook, geschreeven door Lieden, niet gewoon op eene regelmaatige wyze te denken, onthreekt het geheel of ten deele aan goede orde; en zyn uit dien hoofde alleen, hoe goed ook anderzints, van minder nut voor Leerlingen, voor jonge Heelmeesters.

Andere, wier Schryvers aanbidders waren der Oudheid, of in een Tydperk leefden waarna nog veele dingen ontdekt zyn, mischen verscheiden gewigtige verbeteringen, zyn meer of min opgevuld met dwaalingen, en strekken niet anders dan tot zeer onzekere leidraaden.

Eenige eindelyk, in den tegenwoordigen Tyd geschreeven, tekenen byna op ieder Bladzyde, eene verregaande veragting der Ouden, en bevatten nauwlyks anders dan voorgewende nieuwigheden, steelsgewyze dikmaalen de Ouden ontnoomen; verbeteringen van welken men hoog opgeeft, maar die veelal de toets van het gezond verstand, om niet te zeggen, eener waare Heelkundige Weetenſchap, en der Ondervinding, niet kunnen doorstaan.

Niet zonder reeden derhalven, hebben veelen gewenscht naar de uitgave van een Werk, bevreed van dergelyke onvolkoomenheden; waarin de waarheid alleen hulde gedaan werdt; dat de Ouden zoo wel als Hedendaagschen, hun onkreukbaar regt deed erlangen; en 't welk, gegrond op welbeweezen beschouwlyke en ondervindelyke Kundigheden, kort, klaar, volledig, onbevooroordeeld, en in eene goede orde geschreeven was.

Ik hebbe gedacht, daar groote Verstanden zwygen, myne geringe vermoogens te moeten aanwenden, om deezzen wensch niet geheel nutloos te doen blyven. Ik hebbe ten dien einde, de Leerstellingen der Ouden en Hedendaagschen; de ondervindingen van anderen, en de myne, vergeleeken met elkanderen. Ik hebbe daarënboven getragt, my te ontdoen van alle voorïngenoomenheid, en de waarheid te eerbiedigen, waar, en in welk een kleed ik dezelve aantrof. In hoe verre ik hier in geslaagd ben, moet ik aan het oordeel van anderen overlaaten.

De uitgebreithed van myn Ontwerp, en de verkiezing om hetzelve binnen zulke enge paalen te besluiten als my immer mooglyk zyn zoude, hebben my niet toegelaaten om telkens de Schryvers aan te wyzen, van dewelken ik deeze of geene Leerstellingen

ontleend hebbe. Ik begrype daarenboven, dat dit vertoon van beleezenheid, in Werken van deezen aart zeer kwalyk geplaatst is, om dat men daarin niets moet toelaten dan onwyffelbaare waarheden, die geene ondersteuning behoeven van eenig gezag; en het den leerenden onverschillig is te weten, wiens denkbeelden en handelwyzen men hem aanpryst. Om egter eenig regt te doen aan de verdiensten der genen welke ik inzonderheid geraadpleegd hebbe, zal ik hunne Naamen en Werken, ten einde van het laatste Deel deezer Werks, in eene Alphabetische Orde voordraagen.

Beschouwlyke redeneeringen, zoo dikmaalen misbruikt ter opheldering van oeffenende Leerregels, zal men niet dan zeer spaarzaam, in dit Werk aantreffen. Ik meende dezelve, zoo veel doenlyk was te moeten voorbygaan, zoo om te voldoen aan myne voorgenoomen kortheid; als uit overtuiging, dat zeer veele deezer Leerregels, daar voor onvatbaar zyn.

Omtrent de Kenmerken der Gebreken ben ik kort, en bepaale my inzonderheid tot de meest weezenlyke. De reeden hier van is, dat eene optelling van alle verschynzelen derzelver, gelyk meestäl de gewoonte is, verwerring baard, uit hoofde dat 'er alsdan veele inkoomen, welke niet zoo zeer soortonderscheidend, dan wel algemeen zyn.

De hoeveelheid der Geneesmiddelen, door my aangepreezen, is gering; en derzelver aart, saämenstel, en aanleg, meestäl zeer eenvoudig. Een vyand zynde van allen noodloozen omslag, konde ik niet van my verkrygen, den gewoonen slender te volgen. Algemeen bekende Hulpmiddelen hebbe ik slegts by hunne Naamen genoemd: dezulke die minder bekend, en of my, of myne vrienden byzonder eigen waren, ten einde van elk Boekdeel waarinze het eerst voorkwaamen, beschreeven.

Van zoo veelerlye Kunstbewerkingen, als 'er ter geneezing van zekere Gebreken door de Schryvers zyn voorgesteld, hebbe ik alleen dezulke beschreeven, welke eene strenge redeneering, of herhaalde ondervindingen, my hadden doen kennen als de besten. Zy, wier handelwyzen ik met stilzwygen ben voorbygegaan, verschoonen in my eene vryheid, waar toe ik door de noodzaaklykheid verpligt was.

De meest noodzaaklyke en beste Werktuigen, hebbe ik doen afbeelden zoo veel zulks mooglyk was in hunne eigen grootte, gedeeltelyk naar de zeer fraije modellen van den beroemden PERRET, gedeeltelyk naar die van den Kunstryken GOBELS, in myne verzaamling berustende. In derzelver beschryving, welke even als die der Geneesmiddelen, ten einde van elk Boekdeel voorkomt, hebbe ik de onderrigtingen gevolgd van de eerste deezer Meesters, en verbeelde my, hier door eenen zeer weezenlyken dienst gedaan te hebben aan veele Heelmeesters, die by gebrek van genoegzaame

Werk.

Werktuigkunde, daaglykch gevaar loopen om door onweetende *Instrumentmaakers* bedroogen te worden.

In het getal der *Verbanden*, van my aangepreezen beschreeven en afgebeeld, ben ik even zoo spaarzaam geweest, als in dat der *Geneesmiddelen*; en hebbe my alleen bepaald tot de besten. De nutloosheid van sommige, de overtolligheid van andere, de gelykheid van veele, wettigen dunkt my genoeg deze handelwyze.

Dat ik het gantsche *Werk* den *Tytel* gegeven hebbe van **HEDENDAAGSCHE OEFFENENDE HEELKUNDE**, is geschied, niet om dat ik my verbeelde, dat myne denk- en handelwys in alle opzigten dezelfde is als die van alle *Heelkundigen* onzer *Leeftyd*; maar alleen, om dat ik voor een zeer groot gedeelte gevolgt hebbe, het spoor der meest beroemde *Hedendaagsche Heelmeesters*, zoo in zaaken welke zy met reeden van de *Ouden* ontleend hebben, als in dezulken, welke wy haar alleen verschuldigt zyn.

Het verzoek myner *Leerlingen*, en myne deelneeming in hun belang, zyn de voornaame reedenen welke my bepaald hebben tot eene stukswyze uitgave. De overtuiging daarenboven, dat ik aan minvermoogende hier mede geenen ondienst doen zoude, is eene andere drangreeden.

Het vermyden van noodlooze, en altoos veeelende herhaalingen, heeft gelegenheid gegeven tot het splitsen van den *Inhoud* in *Paragraafen*, waar door zekerlyk dit oogmerk best bereikt wordt.

Myn eerste *Ontwerp* was, om alles te besluiten in twee *Boekdeelen*, zoo naa mooglyk in grootte gelyk aan elkanderen. Al werkende egter, werd my zulks meer en meer ondoenlyk, en was ik verpligt 'er nog een derde *Deel* by te voegen. Ik hebbe hier toe geschikt de *Verhandeling* der *Heelkundige Kunstbewerkingen*; zoo om derzelver uitgebreithed, als om de onvrmidelyke veelheid der *Platen* daar toe behorende. De optelling van dit *Leerstuk* onder de *Deelen* der *Algemeene Oeffenende Heelkunde*, hadt wel gevorderd dat hetzelve het tweede *Deel* maakte, en onder dien *Tytel* doorliep; maar, dewyl het inderdaad geene meerder betrekking heeft tot deeze, dan tot de *Deelen* der *Byzondere Oeffenende Heelkunde*, dagt my best te zyn, het onder dien naam, in het laatste *Deel* te doen voorkoomen.

Het oeffenen der *Verloskunde*, schoon behoorende tot dat der *Heelkonst*, is in meest alle *Steden* van ons *Vaderland*, den *Heelmeesteren* in het algemeen, door de *Wetten* ontzegt, en slegts toegelaaten aan weinigen. Dit *Leerstuk* derhalven, dagt ik niet alleen te kunnen, maar zelfs te moeten, myn ontwerp uitsluiten.

De *Algemeene Oeffenende Heelkunde* des Heeren **PLENCK**, door my, in den
-III
Jaare

Jaare 1776. met eenige vermeederingsen in onze Moedertaal uitgegeeven, moet men niet begrypen, dat ik door het tegenwoordig Werk tragte nutloos te maaken. Dit stuk is, en blyft, denzelfden leidraad voor eerst beginnende, en kan men steeds, voor zoo veel het algemeene betreft, als een kort begrip deezer Heelkunde aanmerken. Dat ik het vervolg van dit Werk, in naakooming myner beloften, den Nederduitschen Leezet niet ter hand gesteld hebbe, is voornaamlyk geschied, om dat de stukken hier toe behorende, niet aan myne verwagting voldeeden, doordien ze merendeels op eenen gantsch anderen Leest geschoeid waren.

Welk een Lot dit Werk wedervaaire, is my vry onverschillig. Ik hebbe op myne wyze gedacht, gehandeld, en geschreeven. De volmaaking onzer Konst eischt vryheid, niet eene slaafsche navolging. Zy die van het tegendeel myner stellingen overtuigd zyn, zullen het algemeen en my, eenen weezenlyken dienst doen met dezelve te betwisten, en haare onbestaanbaarheid op eene bescheiden wyze aan te toonen.

Omtrent Taalkundige mislagen egter, vraage ik verschooning. Gebrek aan Tyd heeft my somwylen buiten de mooglykheid gesteld, om alle vereischte oplettenheid te gebruiken ter vermyding van deezen. In het naleezen der afgedrukte Bladen, vinde ik, dat in de Kanttekeningen op Bladzyde 46 staat, inpenetrantia voor non penetrantia, Bladz. 78 alienorum, voor alienum, Bladz. 87 partum genitalia, voor partium genitalium, Bladz. 134. Scrophulus, voor Scrophula, en Bladz. 179. Hæmatocèle, voor Hæmatomphalus. Deeze dagten my, dat te gewigtig waren om hier met stilzwygen voorby te gaan. De overige, die meestal bestaan in het agterlaten van eene enkele Letter, of in het stellen der eene Letter voor de andere, zal ik ten einde van elk geheel Boekdeel aanwyzen.

HEDENDAAGSCHE

OEFFENENDE

HEELKUNDE.

INLEIDING.

De HEELKONST is dat gedeelte der GENEESKUNDE, welks oogmerk is, de Verhoeding, Verbetering, en Geneezing van sommige inwendige, zoo wel als van alle uiterlyke Gebreken, door eenig Konstig Handwerk, of uiterlyk aangelegde Hulpmiddelen. *Chirurgia.*
Medecina.

II.

Het Menschelyk Lighaam, beschouwd vooral in het geval van Ziekte, somwylen ook in den staat der Gezondheid, is het onderwerp der Heelkunde. Men kan zelfs, met zeeker beroemd Heelmeester, het afgestorven Lighaam als zoodaarnig aanmerken, dewyl men zig dikmaalen bevindt in de noodzaaklykheid tot het onderzoek der Lyken, 't zy om zig te verzeekeren van eene niet genoeg gekende Ziekte, 't zy, om in 't geval van Manflag, den Regter te dienen van berigt.

III.

De Heelkunst wordt gemeenlyk, en zeer wel verdeeld, in eene Beschouwlyke en Oeffenende, dewyl alles wat daar toe betrekking heeft, tot één deezer beiden kan gebragt worden.

IV.

IV.

*Chirurgia
theoretica.*

De BESCHOUWLYKE HEELKUNDE, even als alle andere beschouwlyke Wetenschappen, is inzonderheid betreklyk tot het Verstand; en alleen van ter zyden, dat is door overbrenging, van eenig weezenlyk nut voor onzen noodlydenden Medemensch.

V.

*Chirurgia
practica.*

De OEFFENENDE HEELKUNDE, behoort regtstreeks tot onze daaden; bevat de toepassing der vastgestelde Leerregels op gegeven gevallen; en is één der nuttigste en noodzaaklykste Konsten voor de saamenleving.

VI.

De Deelen der Beschouwlyke Heelkunde, zyn, de kennis der Ontleedkunde en van de dierlyke huishouding des Lighaams; gelyk ook, die der Levenswys, der Ziektekunde, der Hulpmiddelen, der Konstbewerkingen, en dergelyken.

VII.

De Deelen der Oeffenende Heelkunde, zyn of algemeene, of byzondere. Tot de eerste behooren, de kennis en behandeling der Wonden, der Zweeren, der Gezwellen, der Uitzakkingen, der Beenziekten, der Wangestalten, en het doen der Konstbewerkingen. Tot de laaste worden betrokken, die der Huidziekten, der Oogziekten, der Ziekten van de Tandén, des Piswegs, de Geregelyke Heelkunde, en de Verloskunde. Elk deezer Deelen in het byzonder, en alle in 't gemeen, hebben een zeer naauw verband met de Deelen der beschouwlyke Heelkunde, en berusten zelfs geheellyk op deezen. Wy moeten de laatsten als van elders bekend, voorönderstellen, om dat ons oogmerk is, niet te spreken dan van de eersten.

VIII.

Hy, die de Leerstellingen van beide deeze Deelen, op gegeven gevallen toepast, en derhalven tragt te voldoen aan één of meer der oogmerken, in de be-
Chirurgus. paalinge der Heelkunde gemeld, word een HEELMEESTER genoemd.

IX.

Deeze Naam was onbekend voor den Leeftyd van ERASISTRATUS. De Heelkunde, nog niet afgescheiden van de Geneeskunst, maakte toen met dezelve, één Lighaam, en werdt door één enkel Mensch, onder den Tytel van
Medicus. GENEESHEER, behandeld. Omtrent deezen tyd, de Konst meer en meer
aan.

aanwasfende, vermeerderde naar evenredigheid den arbeid van derzelver Oeffenaars, en vond men goed, om het Heelkundige te fcheiden van het Geneeskundige; en het eerfte te vertrouwen aan hem, die men den naam gaf van Heelmeester, terwyl het laafte onder het beftier bleef van den Geneesheer.

X.

De Kundigheden welke een Heelmeester noodzaaklyk bezitten moet, zyn veele. Men kan dezelve onderscheiden in *Voorbereidende* en *eigene*. Tot de eerfte behooren de Taalkennis, de Wiskonst, en de Natuurkunde. Tot de laafte, alle byzondere Deelen der Beschouwlyke en Oeffenende Heelkunde.

XI.

De hoedaanigheden eens Heelmeester, behooren niet minder te zyn, dan het getal zyner Kundigheden. Een goed Gezigt, eene vaste Hand, het vermoogen om zig van beide Handen onverschillig te bedienen, een doordringend Verftand, een gezond Oordeel, eene niet dubbelzinnige Oprechtheid, een goed Voorkoomen, eene gepaste Voorzigtigheid, eene verftandige Belangloosheid, een Menschlievend Hart, en eene gematigde Stoutmoedigheid, moeten de heerschende trekken zyn, zyner Kenschets.

XII.

By alle deeze Kundigheden, by alle deeze Hoedaanigheden, behoord nog gevoegt te worden, eene veeljarige Oeffening, onder den toezigt van bekwaame Leermeefters, in Legers, Ziekenhuizen, en elders. De Heelkunde naamlyk, behoord wel voor een gedeelte tot het getal der Wetenschappen, waarin men aanmerklyke vorderingen kan maaken, door den weg alleen van Letteroeffening, maar is ook tevens betreklyk tot de Werktuiglyke Konften, waarin men zig niet volmaaken kan, dan door eene daadelyke Oeffening.

XIII.

Gelyk alles, zoo worden ook de daaden eens Heelmeester bepaald door Wetten, gegrond voor een gedeelte op de voorschriften der Menschlykheid, gedeeltelyk op die van het gezond Verftand, en der Heelkunde zelve. De noodzaaklykheid van de kennis deezer Wetten, verpligt ons tot derzelver mededeeling, in de gedaante van Regelen, op datze te gemaklyker zouden kunnen verftaan en onthouden worden.

XIV.

1^e. REGEL. *Onderneem nimmer de behandeling eener Ziekte, dan na dat gy te alvorens, zoo veel mooglyk zy, verzeekert hebt van derzelver Natuur, Staat, en Oorzaaken, gelyk ook, van de heerschende gesteltheid des Lyders, zyne Levenswys, Ouderdom, Kragten, en wat dergelyke meer zyn. Eene welgekende Ziekte, zegt een groot Geneesheer, is half geneezen. Het tegendeel derhalven moet waar zyn, wanneer de Ziekte onbekend is; en vooräl, wanneer men tevens onkundig is van den juistten staat des voorwerps in dewelke dezelve plaats grypt. Men kan zelfs met veel regt beweeran, dat, in dit geval iets van aanbelang te onderneemen, niet dan by geluk van eenige goede uitwerking zyn konne, en natuurlyker wyze, eerder moet dienen om de Ziekte te doen verërgeren, dan verbeteren.*

XV.

2^e. REGEL. *Spaar in alle uwe behandelingen, allen noodloozen omslag, en behartig altoos eene verstandige eenvoudigheid. De Natuur waarlyk, is eenvoudig in alle haare Werkingen. De Konst, zal ze volmaakt zyn, moet haare treden navolgen. En, indien het ooit mooglyk zy, om tot de meeste volmaaktheid daarin op te klimmen, zal zulks ongetwyffeld zyn, door dien weg in te slaan, welke zy zelve ons aanwyst.*

XVI.

3^e. REGEL. *Draag egtër zorg, dat de Eenvoudigheid u niet verleide tot Onagtzaamheid. Zoo noodig de eerste is, zoo schaadelyk is de laatste. Eenvoudig te zyn in zyne daaden, is de volmaakheden der Natuur naderen; terwyl de Onagtzaamheid geleid tot allerlye afdwaalingen.*

XVII.

4^e. REGEL. *Bepaal u nimmer tot eenige Konstbewerking, ten zy gy van derzelver noodzaaklykheid volstrekt verzeekert zyt. Het is immers geene onverschillige zaak voor een Lyder, zugtende onder den smertelyken last zyner Ziekte, of hy op eene gemaklyke, dan pynlyke wyze geneezen worde. Alle Konstbewerkingen, geene uitgezondert, zyn pynlyk; en deeze Smerten, gevoegd by die der Ziekte zelve, zyn met betrekking tot het enkel vooruitzigt, grievend; en kunnen, ten opzigte der gevolgen in sommige gevallen, uitermaaten gevaarlyk worden. Dat intusfchen, de noodzaaklykheid daar zynde, het nut des Lyders, alle andere bedenkingen moet worden voorgetrokken, is iets, 't welk ik nauwlyks behoeve aan te merken.*

XVIII.

XVIII.

5^e. REGEL. *Verschrik nooit uwen Lyder, door eene noodlooze veelheid van Toezieners, en onttrek denzelven, zoo veel mooglyk zy, het gezigt uwer Werktuigen.* De meeste Menschen, worden door vreeze, niet minder dan door het werklyk gevoel van pyn, op zulk eene blykbaare wyze aangedaan, dat dit alleen fomwylen in staat is, om de best gedaane Konstbewerking te doen mislukken. De tegenwoordigheid van zoo veele Toezieners, en het ten toon spreiden der noodige Werktuigen, maakt by veele, zulk eenen diepen indruk van het gewigt en de gevaarlykheid hunner toestand, datze zig geheel overgeeven aan deeze Hartstogt, en hier door alleen, eene gantsche omkeering in de dierlyke huishouding veröorzaakt wordt. Omstandigheden, welke het gevaar der Ziekte zelve indervoegen vergrooten, dat men nooit te omzigtig kan zyn in zyne voorzorgen.

XIX.

6^e. REGEL. *Onderwerp niemand aan eenige Konstbewerking, ten zy gy u verzekerd hebt van de genoegzaamheid zyner kragten.* Alle Konstbewerkingen naamlyk, baaren Ontsteking; en deeze, gelyk in alle andere gevallen, heeft tot eene onafscheidelyke gezellin, de Koorts; en ten gevolge, eene Veröttering, van welks paalen men niet altoos, van vooren kan zeker zyn. De Pynen zelfs, aan alle Operatiën verknogt, maaken eenen zeer nadeeligen indruk in het Zenuwgestel, vooral by Zwakken, en veroorzaaken, tegelyk met de voorige, verscheidenlye wanordes. Redenen waarlyk, welke den Heelmeester verpligten, om de hoegrootheid der kragten eens Lyder, by wien eene merklyke Operatie moet plaats grypen, op haare juiste waarde te schatten, indien hy het ongenoegen niet wil hebben, om denzelven te zien bezwyken, ingevolge eener Bewerking, al te onëvenreedig alleen aan zyne kragten.

XX.

7^e. REGEL. *Laat alle uwe Operatiën vooraf gaan, van eene Ontleedkundige beschouwing der Deelen, welken in dezelve moeten betrokken worden: dat is te zeggen; vertegenwoordig aan uwen Geest, alle Kundigheden, welke u de Ontleedkonst, met betrekking tot het Saamenstel, de Plaats, het Verband, en de Werking der Deelen, gegeven heeft, ten einde gy zeker zyt van elk ondeelbaar stip, welk het snymes in zyne beweging moet doorloopen.* Deeze opmerking inderdaad, is van zoo veel aanbelang, dat hy, die zig hier toe niet in staat bevind, voor den Lyder immer

zoo gevaarlyk is, dan zyne Ziekte, en niet dan by toeval, denzelven eenige hulp zal toebrengen.

XXI.

8^e. REGEL. *Voorziet by tyds in alle noodwendigheden der Operatie welke gy doen zult, gelyk ook in alles, wat dezelve op eene toevallige wyze, zoude kunnen vergezellen, of volgen.* Hier toe behooren voornaamlyk, de keuze, beproeving, en gereed ligging der Werktuigen, en van de saamenstellende deelen des Verbands; de keuze, en plaatsing der Helpers; de ligplaats des Lyders, na de gedaane Kunstbewerking; en de regeling der Hulpmiddelen, ter verhoeding of wegneeming der moeglyke, of reeds aanwezige toevallen.

XXII.

9^e. REGEL. *Draag altoos zorg, eene verstandige keuze te doen, aangaande den Tyd, de Plaats, en de wyze uwer Kunstbewerking, zoo wel, als omtrent de plaatsing zelve van den Lyder.* In sommige gevallen naamlyk, wordt de Tyd door de noodzaaklykheid aangewezen, en is het minste uitstel, een onherstelbaar verlies voor den Lyder. In andere daarentegen, is dezelve willekeurig; en als dan verkiest men doorgaans de Lente of Herfst, als de gematigdste Jaargetyden. Van de plaats kan men hetzelfde zeggen; want deeze, schoon meestäl noodzaaklyk, is egter in sommige gevallen willekeurig. De wyze van Opereeren is geenzints onverschillig, maar wordt bepaald, gedeeltelyk door de Natuur en Omstandigheden der Ziekte, gedeeltelyk door haaren aart zelve, en de voordeelen welken zy inluit. Dus is het ook met de byzondere plaatsing des Lyders, die altyd moet over een koomen met het gemak des Heelmeesters, en de meeste zekerheid voor de Kunstbewerking.

XXIII.

10^e. REGEL. *Zyt in uwe Kunstbewerkingen stout, maar niet roekloos. Verban voor een oogenblik alle medelyden. Dog hoed u tevens voor het tegengestelde uiterste, de Wreedheid naamlyk.* De stoutheid is één der voornaamste deugden eens Heelmeester, terwyl de roekloosheid niet genoeg kan misprezen worden. Zonder haar, zyn we, in moeilyke gevallen, in onverwagte toevallige omstandigheden, by ons zelve hulploos, en onbekwaam, om op eene behoorlyke wyze de Operatie te volëindigen. Eene te groote medelydenheid, heeft hetzelfde uitwerkzel; dat is te zeggen, dat ze ons van gelyken buiten staat stelt, om het noodige te kunnen uitvoeren. De Wreedheid is altoos berispelyk. De Menschelyke Natuur heeft
een

een billyke afkeer van dezelve; en, het past vooräl geen Heelmeester, alleen geroepen om den noodlydenden te verligten, zig schuldig te maaken aan deeze.

XXIV.

11^e. REGEL. *Indagtig, dat de Tyd van Lyden, een ondraaglyke last is voor een Zieke, voltrek altoos uwe Konstbewerkingen, met de meest mooglyke vaardigheid. Elk oogenblik eener Konstbewerking inderdaad, is ten opsigte des Lyders, een oogenblik van verschrikking, zoo wel, als van verdubbeling van smerten, en meerder blootstelling aan toevallen. De verkorting derhalven van tyd, heeft eene juist tegengestelde uitwerking, en voldoet in 't algemeen ook meerder, aan de Toezieners. Dit egter sluit niet in, dat het goed is, op het Minuut te werken. Want, hoe pryslyk en voldoende het is, vaardig te zyn, heeft nogthans de zeekerheid den voorrang, en moet boven alles in het oog gehouden worden. *Sat cito, si sat bene*, is eene Heelkundige Stelregel; eene Stelregel, even zoo waaragtig, als het ongerymd is, een Heelmeester te schatten alleen naar zyne vaardigheid, en met het Horologie in de hand, den Tyd af te meeten, welke tot het voltrekken zynen Operatiën besteed wordt.*

XXV.

12^e. REGEL. *Zyt met alle zorgvuldigheid bedagt, op de behandeling der gedaanne insnydingen, en waakt onophoudelyk tegen de Toevallen, welke uwe Operatiën kunnen agtervolgen, of reeds werklyk aanwezig zyn. Eene wel voltrokken Operatie alleen, beslist nimmer het toekomend lot des Lyders. Geregelde verbanden, en eene oplettende behandeling der byzynde, of opvolgende Toevallen, hebben in zyne herstelling, een niet minder aandeel dan deeze.*

XXVI.

In de Bepaaling der Heelkunde, hebbenwe tevens betrokken derzelver oogmerken. De Heelmeester bediend zig ter bereiking deezer oogmerken, van zekere hulpmiddelen, welke alle behooren, of tot de Klasse der Heelmiddelen, of tot die der Werktuigen, of tot die der Verbanden. De natuur, verscheidenheid, en werking deezer hulpmiddelen, wordt in de Beschouwlyke Heelkunde beschreeven. Hier ter plaatse derhalven, zullen we alleenlyk aanmerken, dat ze allen, slegts hunne bepaalde en betreklyke vermoogens hebben, en men dienvolgens, daaraan niet meerder moet toeschryven dan ze waarlyk verdienen, nog dezelve toepassen, op alle schynbaar overeenkomstige gevallen zonder onderscheid. Door

be-

betreklyke vermoogens, verftaa ik dezulken, welke hun opzigt hebben tot dit of dat geval by uitftek, met uitzondering van anderen.

XXVII.

Wat het nut betreft der Heelkunde, en de waarde des Heelmeesters, deeze blyken, gedeeltelyk uit verfcheiden byzonderheden welken wy bereids gemeld hebben, en zullen in den gantschen loop van dit Werk, nader worden aangewezen. Een kort en volleedig verflag ondertusfchen, van de nuttigheid der Heelkonst is, *datze gezondheid belooft aan den Zieke; en van de waarde des Heelmeesters, dat by door zyne Kunstmaatige behandelingen, in de meeste gevallen, deeze belofte bekragtigt.*

XXVIII.

*Chirurgia
practica.
universa-
lis.*

*Particula-
ris.*

Ter geleidelyke Verklaaring der Oeffenende Heelkunde, het voornaame onderwerp onzer befchouwingen, wordt verëischt, dat men elk van derzelve Deelen afzonderlyk in overweeging neeme; en eerst spreekte van de *Algemeene*, naderhand van de *Byzondere*. Door de *Algemeene Oeffenende Heelkunde* verftaa ik dezulke, welke zig uitftrekt, tot alle byzondere ftippen van de uitgebreithed des Lighaams, of tot elk deel deezes Werktuigs, zonder onderscheid; en door de *Byzondere*, die zig bepaald tot het een of ander van deszelfs Deelen, in het afgetrokkene. In §. VII. is gebleeken, welke de ondergeschikte Deelen zyn van deezzen.

XXIX.

Wy zullen, overëenkomftig deeze Orde, onzen arbeid inrigten; en met de Verhandeling der Wonden, het eerfte Leerftuk der *Algemeene Oeffenende Heelkunde*, een aanvang maaken.

R E G I S T E R
D E R
L E E R S T U K K E N.

IN DIT EERSTE DEEL.

I.	Leerstuk der Wonden,	Bladz.	I —	52.
II.	— — — — —	Zweeren,	— — 53 —	92.
III.	— — — — —	Gezwollen,	— — 93 —	190.
IV.	— — — — —	Uitzakkingen,	— — 191 —	236.
V.	— — — — —	Beenziekten,	— — 237 —	338.
VI.	— — — — —	Wangestalten,	— — 339 —	402.
Beschryving der Aangepreezen Hulpmiddelen,				403 — 416.
Verklaaring der Afbeeldingen				417 — 456.

VERBE.

V E R B E T E R D E

Z I N H I N D E R E N D E

D R U K F E I L E N.

Bladz.	§.	Regel.	Voor	Lees.
3	14.	1.	behooreu . .	behooren.
4	17.	2.	gewetste . .	gekwetste.
16	85.	5.	Speezel . .	Speekzel.
89	413.	4.	loodververwigen .	loodverwigen.
126	583.	4.	Gangrena . .	Gangræna.
127	586.	2.	blyven . .	blynen.
150	702.	3.	PELIT . .	PETIT.
165	764.	4.	du . .	dus.
181	839.	2.	veeltyd . .	veeltyds.
236	1102.	2.	verscheidenden .	verscheidenheden.
257	1162.	6.	uittrekking en tegentrekking, uittrekking en tegenrekking.	
262	1186.	5.	de buitenste oppervlakte. de buitenste en binnenste oppervlakte.	
298	1334.	4.	tweebuikige .	tweehoofdige.
299	1337.	5.	tweebuikige .	tweehoofdige.
450 . . .	25.	uiit . .	uit.	

HEDEN.

HEDENDAAGSCHE
ALGEMEENE OEFFENENDE
HEELKUNDE.

EERSTE LEERSTUK.

VERHANDELING

DER

WONDEN.

I N H O U D.

1 HOOFDDEEL. *De Wonden in het algemeen.*

2 HOOFDDEEL. *De Wonden in het bijzonder.*

De Gestookten Wonden.

— *Gescheurde Wonden.*

— *Gekneusde Wonden.*

— *Geschooten Wonden.*

— *Vergifte Wonden.*

— *Wonden der Peezen.*

— *Wonden der Zenuwen.*

— *Wonden der Bloedvaten.*

— *Wonden der Watervaten.*

— *Hoofdwonden.*

— *Wonden van het Aangezicht.*

— *Halswonden.*

— *Borstwonden.*

— *Buikwonden.*

— *Wonden der Ledemaaten.*

HEDENDAAGSCHE

ALGEMEENE OEFFENENDE

HEELKUNDE.



EERSTE LEERSTUK.

VERHANDELING DER WONDEN.



I. HOOFDDEEL.

De Wonden in het Algemeen.

§ 1.

Een WOND is eene versche, meestäl bloedende, somwylen niet bloedende *Vulnus*, scheiding des geheels in de vaste Deelen van ons Lighaam, door een hard en scherp of stomp Werktuig, met geweld tuschen dezelve ingedreeven, veroorzaakt.

§ 2.

Gescheiden aaneenhang, van een wyking der gescheiden Deelen, Bloedvliet, vorming van Bloedklonters, uitvloed van een dun rood en wateragtig Vogt, Pyn, Roodheid, Zwellling, omkrulling en ontsteking der Randen, Koortsagtige beweging, ontlasting van Etter, opvulling der holte met Vleeschgraantjes, onder-

A 2

linge

linge nadering der Zyden, en de vorming van een Lidteken, zyn de gewoone verschynzelen der Wonden.

§ 3.

Het meest weezenlyk verschil derzelve, wordt bepaald door de verschillende Natuur der beleedigde Deelen, ten aanzien van hunne Vastheid, Plaats, Verband, en ingeslooten Vogten: door derzelve verschillende Werkingen in den staat der Gezondheid: gelyk ook, door het verschil der Oorzaaken van welken dezelve afhangen.

§ 4.

Op dit verschil is gegrond, de verdeeling der Wonden, in Eenvoudige en Saamengestelde; in Geringe, Gewigtige, Gevaarlyke, en Doodelyke; in Gestookten, Gefneden, Gehouwen, Gekneusde, Geschooten en Vergifte.

§ 5.

*Vulnus
simplex.*

Eene EENVOUDIGE WONDE, bepaald zig geheellyk tot de algemeene bekleedzelen; of vordert ten minsten niets anders ter Geneezing, dan de herëeniging.

§ 6.

*Vulnus
Compositum.*

Eene SAAMENGESTELDE WONDE wordt genoemd, die uit kragt van den byzonderen aart der gekwetste Deelen, gevolgt, of liever verzeld wordt van omstandigheden, welke eene behandeling eischen, in geenen deele betreklyk tot die der Wonde zelve.

§ 7.

*Vulnera
parva.*

Als GERINGE WONDEN kan men dezulken beschouwen, die in het geval zyn der eenvoudige, en geenerhanden gevaar influiten.

§ 8.

*Vulnera
magna.*

GEWIGTIGE WONDEN zyn, door dewelken wel het Leven niet ondermynd wordt, maar die egter, met de grootste oplettenheid moeten behandeld worden.

§ 9.

*Vulnera
periculosa.*

Door GEVAARLYKE WONDEN verstaat men dezulken, door dewelken het leven des Lyders, op eene meer of min blykbaare wyze, met eenen geheel on-dergang gedreigd wordt, zonder hierom te vallen in den term van de een of ander der Doodelyke Wonden.

§ 10.

§ 10.

Van de DOODELYKE WONDEN zal in het Leerstuk der Geregte Heelkunde; van de Gestoken, Gesneden, Gehouwen, Gekneusde en Vergifte Wonden, in het vervolg deezer Verhandeling, onder byzondere Opschriften gesproken worden. *Vulnera lethalia.*

§ 11.

DE OORZAKEN DER WONDEN, gelyk eenigzints uit de Bepaaling deezer Gebreken kan afgeleid worden, zyn alle uitwendig; en betreklyk tot de treffing van harde, 't zy scherpe 't zy stompe Werktuigen, met meer of minder kragt en snelheid bewoogen. *Causa vulneraria.*

§ 12.

Omtrent de werking deezer Oorzaaken moet men aanmerken. 1. Dat het op hetzelfde uitkomt, of zy tegen ons Lichaam bewoogen worden, dan of ons Lichaam zig beweegt tegen deezen. 2. Dat derzelver uitwerkingen bepaald worden, door de kragt inzonderheid van het beweegend vermoogen, 't zy dit vermoogen is een beziel of onbeziel Lichaam. 3. Dat in het eerste geval, de kragt altoos evenreedig is aan den stand en de gemoedsbeweeging van ditzelfde vermoogen; en in het laatste, aan de snelheid van deszelfs indruk op het bewoogen Lichaam. 4. Dat ten opsigte van vallende Lichaamen, de snelheid, en diensvolgens ook de kragt, meestäl afhanglyk is van de hoogte. 5. Dat, al het overige gelyk staande, de kragt toeneemt, naar maate van de meerderheid des tegenstands. 6. En eindelijk: dat de scherpte der snede van scherpe, en de zwaarte van stompe Lichaamen, veel toebrenge tot het vermeerderen der uitwerkingen.

§ 13.

DE TEKENEN DER WONDEN zyn, of *gissende*, of *aanwyzende*, of *voorzeggende*. *Signa vulneraria.*

§ 14.

Tot de GISSENDE TEKENEN behooren, alle die omstandigheden welke ten tyde der Kwetsing hebben plaats gehadt, als by voorbeeld, de plaatsing des Lyders, de stand des Beleedigers, de natuur van het kwetsend Werktuig, en de gemoedsgesteltheit, zoo van hem die de Wond heeft toegebracht, als van den gewonde. *Signa conjecturalia.*

HEDENDAAGSCHE ALGEMEENE

§ 15.

*Signa diagnos-
tica.*

De AANWYZENDE TEKENEN, worden in *Zinlyke*, en *Redelyke* onderscheiden.

§ 16.

*Signa sensu-
alia.*

De ZINLYKE TEKENEN zyn vooräl betreklyk tot het Gezigt, het Gevoel, het Gehoor en den Reuk. Zy leeren ons de gesteltheit der Wonden kennen, door het beschouwen van derzelver afmetingen, door het onderzoek met den Vinger, of het Tentyzer, en door het rieken der Uitwerpzelen, welken uit de Wonden van zekere Deelen uitvloeijen.

§ 17.

*Signa, ra-
tionalia.*

De REDELYKE TEKENEN, ontleend men hoofdzaaklyk uit de beleedigde werking der gewetste Deelen, uit de plaatsing der Wonde, en van de Pyn welke daar mede gepaard gaat, uit den aart van het Vogt, door dezelve uitvloeiende, uit de gedaante en grootte derzelver, met die van het wondend Werktuig vergeleeken, gelyk ook, uit de opvolgende Toevallen.

§ 18.

*Signa
prognostica.*

De VOORZEGGENDE TEKENEN, berusten vooräl, op de plaats welke de Wonde inneemt, gevoegd by derzelver oorzaak, en weezenlyke hoedaanigheden.

§ 19.

*Sympto-
mata.*

Alle, of immers de meeste Wonden, hebben haare TOEVALLEN. De voornaamste derzelver, zyn de Bloedvliet, Pyn, Ontsteking, Koorts, Verëtering, Buikloop, nederzetting van Etter in eenig afgelegen Deel, en dergelyken.

§ 20.

*Hemor-
ragia.*

BLOEDVLIET, is de uitstorting van Bloed door de opening van eenig gekwetst, of doorsneden Bloedvat, 't zy hetzelfde slagaderlyk zy, of aderlyk.

§ 21.

Dit toeval is eigen aan alle Wonden, welke gemaakt zyn door stekende, snydende, of houwende Werktuigen. Kneuzende Werktuigen verwekken hetzelfde wel veelmaalen, maar niet altyd; en by geschooten Wonden wordt het niet dan zeer zeldzaam waargenoomen.

§ 22.

§ 22.

De Bloedvliet is te meer te dugten, als de Wond eene aanzienlyke Ader of Slagader geopent heeft, en eene plaats inneemt, waar men geene Heelkundige hulp kan toebrengen.

§ 23.

De gevolgen eener aanhoudende, en sterke Bloedvliet, zyn kragtloosheid, bezwyming, Stuiptrekkingen, en den Dood. Alle deeze gevolgen, zyn afhanglyk van het geschonden of vernietigt evenwigt, tusfchen de vaste en vloeibaar Deelen, aan welke men inzonderheid moet toeëigenen, de kragt, en duuring van het Leeven.

§ 24.

De PYN, welke de Wonde doorgaans verzeld, is oorspronglyk, of van de gedeeltelyke kwetfing eener Zenuw, of van de tegenwoordigheid van eenig vreemd Lighaam, of van eene byzynde Ontfteking, of eindelyk, van eene uitftorting, onder eenig Pees- of Vliesagtig Uitbreidzel. *Delor.*

§ 25.

Dit toeval, is in veele gevallen de bronwel van verfcheiden wanordes, in de Wond zelve niet alleen, maar ook in het gantsche Lighaam, en veroorzaakt Ontfteking, Koorts, Stuiptrekkingen, Ylhoofdigheid, en dergelyken.

§ 26.

Wat de ONTSTEEKING betreft, deeze is veelal het gevolg of de gezellin der Pyn, en zal in haaren aart en gevolgen, naderhand beschouwd worden. *Inflam-*

matio.

§ 27.

De KOORTS, als een Toeval beschouwd der Wonden, wordt doorgaans veroorzaakt door de hevigheid der Pyn en Ontfteking, welke daar by plaats heeft; of, door eenige opsluiting van Etter in eenig gedeelte van den omtrek. Ze is altoos evenreedig aan de hoegrootheid haarer voortbrengende Oorzaaken, en aan de meer of minder goede gefteltheid van den Lyder. *Febris.*

§ 28.

De Verëttering, Verfterving, en Verlamming, zullen we hier met ftilzwygen voorby gaan, om dat we dezelve naderhand meer opzettelyk verklaaren moeten.

§ 29.

§ 29.

Convulsio. De STUIPTREKKING, 't zy dezelve zig bepaald tot eenig byzonder Deel, of uitstrekt door het gantsche Lighaam, wordt den meesten tyd gezien by geschooten Wonden, by de gescheurde Wonden der Gewrigten, en dergelyken. Zy is een der gevaarlykste toevallen, welken by mooglykheid de Wonden vergezellen kunnen, en eindigt veelmaalen door den Dood. De Mondklem, de Regtstyvigheid, de Vooroverkromming, de Agteroverkromming, enz. moet men als zoo veele foorten van dit toeval aanmerken.

§ 30.

Diarrhoea. De BUIKLOOP is in het geval van Wonden, somwylen als naar gewoonte, somwylen daarëntegen is ze Etteragtig, en afhanglyk van eene terugvloeiing des Etters, uit eene nevensgaande verzweering. Het laatste geval is alleen door de vermindering der zwelling kenbaar, en doet somwylen de verëtering eindigen, zonder eenige ontlasting naar buiten.

§ 31.

Metastasis. Eene NEDERZETTING van ETTER in eenig ander Deel dan het gekwetste, wordt meest waargenoomen by Hoofdwonden, waar zulks dikmaalen gebeurd is met opzigt tot de Lever. De rede hier van, is als nog niet blykbaar, en wordt van verscheiden Schryvers, op eene verschillende wyze begreepen.

§ 32.

Curatio. De GENEEZING van alle Wonden, de zwaarste zelfs niet uitgezondert, is alleen het werk der Natuur, dat is, van de gewoone werkingen des Levens.

§ 33.

In veele gevallen egter, kan de Kunst, de Natuur te hulp koomen, door het wegneemen der beletzelen, welke deeze in haare werkingen belemmeren.

§ 34.

Gelyk deeze hinderpaalen betrekking hebben, of tot de Wonde zelfs, of tot de byzynde Toevallen, zoo bepaald zig ook hier by, al de hulp des Heelmeesters; en kan men alle zyne poogingen brengen, tot de opvolging van deeze weinige voorschriften.

1. Dat hy alle vreemde Lighaamen, in de Wond verhoolen, opruime.

2. Dat hy reeds zuivere, of gezuiverde Wonden, op alle mooglyke wyze, en ten spoedigste herëenige.

3. Dat hy de dreigende Toevallen verhoede, en de aanwezende wegneeme.

§ 35.

De opruiming van vreemde zelfstandigheden, in de Wond verhoolen, geschied op verscheidenerlye wyze, en overeenkomstig met den verschillenden aart van deezen, zoo wel als met de verscheiden Natuur van het gekwetste Deel. Dus moeten zachte en niet zeer vasthoudende zelfstandigheden, met eene Spons, in Water of Wyn bevogtigt, worden afgewaschen; terwyl vaste, en meer aanhangende of ingedrongen Lighaamen, daar uit genoomen worden met den Vinger, een Steenlepeltje, dunne en buigbaare Tentyzers, dunne Tangen, en zelfs door eene tegenopening, als men 'er anders niet kan by koomen.

§ 36.

Verscheiden toevallige omstandigheden, kunnen den Heelmeester in de zuivering der Wonden belemmeren. De voornaamsten derzelve zyn, eene hevige Bloedvliet, en de onmoglykheid om het vreemd Lighaam te brengen onder het bereik zyner werktuigen. In het eerste geval moet men door het aanleggen van een Tournequet op den stam van het geopent Vat, zig alvorens meester maaken van den Bloedvliet. In het tweede laat men alles aan de Natuur over, en behandelt slegts de Wond met verzagtende en flapmaakende middelen.

§ 37.

Ter verëeniging der Wonden, bediend men zig, naar het verschil der omstandigheden, van de *plaatsing des Deels*, van de *drooge Hegting*, van de *bloedige Hegting*, of van het *verëenigend Verband*.

§ 38.

Het eerste deezer Hulpmiddelen, is inzonderheid van nut, in diep doorgaande, en dwersche Spier- of Peeswonden; gelyk ook, in geheel afgesneden of gebrooken Peezen en Banden. Het tweede diend vooräl in Huid- of langwerpige en oppervlakkige Spierwonden. Het derde is toepaslyk op zeer diepe, 't zy langwerpige, 't zy dwersche Spierwonden; op de doorgaande, en eenigzints aanmerklyke Buikwonden; gelyk ook, op de loodlynige doorsnyding der Lippen, en de gedeeltelyke

afsnijding van sommige deelen des Aangezigts. Van het vierde eindelyk, bediend men zig meestäl in de langwerpige Wonden der Ledemaaten, 't zy met of zonder behulp der drooge Hegting.

§ 39.

Dat alle gesneden en gehouwen Wonden zonder verlies van Zelfstandigheid, gelyk ook sommige gestookten en gescheurde, alleen vatbaar zyn voor deeze aanwyzing, is iets, 't welk men wel moet opmerken.

§ 40.

Wat de *Verhoeding* betreft der dreigende, en de *Geneezing der aanweezende Toevallen*, deeze verschild grootelyks in verscheiden omstandigheden; en kan bezwaarlyk tot algemeene Regelen gebragt worden.

§ 41.

Het eerste, en mischien het gevaarlykste Toeval, is de *Bloedvliet*, afhanglyk vooräl van de kwetsing eener aanzienlyke Slagäder. Deeze wordt te keer gegaan: 1. Door den aanleg van het Tournequet op den Stam der Slagäder. 2. Door de opening van het Vat te sluiten met eenen drukkenden Vinger. 3. Door het gebruik van Saamentrekkende plaatsmiddelen, van droog plukzel, van Bovist, van de Spons, de Eiken zwam, en dergelyken, ondersteund van tragswyze Drukdoeken en een weersluitend Windzel. 4. Door de Onderschepping van het Vat. 5. Door de geheele afsnyding der slegts geopende Slagäder. 6. Door de Branding. 7. Door de gestaadige drukking der handen van elkander afwisselende Helpers.

§ 42.

Hoedaanig men zig bedienen moet van elk deezer hulpmiddelen, en in welke gevallen het eene den voorrang heeft voor het andere zal by gelegenheid der beschryving van de Wonden der Slagäderen nader getoond worden.

§ 43.

De *Pyn*, afhanglyk van één der Oorzaaken, § 24. gemeld, geneest men, overëenkomstig met deeze, door de geheele afsnyding der gekwetste Zenuw; door de wegneeming van het ingeslooten vreemd Ligham; door de gewoone hulpmiddelen der Ontsteking; of door de ontlasting van het verzaameld Vogt, door eene insnyding.

§ 44.

Een algemeen Pynstillend middel is het *HEULSAP*, door den Mond ingegeven, en op de Wond zelve aangelegt. Men moet zig egter hier van niet bedienen, dan wanneer men de Oorzaak der Pyn niet kan naaspooren of wegneemen; gelyk ook, in eene groote gevoeligheid der Zenuwen, de eenige Oorzaak somwylen van dit Toeval.

§ 45.

Hoedaanig de *Ontsteking*, *Koorts*, *Verettering*, *Versteroving*, *Verlamming* en *Buikloop* moeten behandelt worden, zal gedeeltelyk in het vervolg blyken; gedeeltelyk kan men hier over verscheiden Geneeskundige Schryvers raadpleegen.

§ 46.

Ter geneezing der *Stuiptrekking*, van welk eene soort dezelve ook zyn mooge, dienen de zoogenaamde algemeene Geneesmiddelen, en vooräl het *Heulsap*, zoo uit- als inwendig toegediend.

§ 47.

Wat betreft de *nederzetting van Etter*, in eenig afgelegen Deel; deeze moet, als ze geschied in een der voornaame Ingewanden, aan de Natuur bevoolen, en indien uitwendig, of in de Borst en Buikholte, door eene konstige opening ontlast worden.

II. H O O F T D E E L.

De Wonden in het Byzonder.

§ 48.

Het Onderwerp van dit Hooftdeel is zeer uitgebreid, en bevat niet minder dan de byzondere beschouwing der *gestooken*, *gescheurde*, *gekneusde*, *geschooten*, en *vergifte Wonden*; de *Wonden der Peezen*, *Zenuwen*, *Bloedvaten*, en *Waternvaten*; gelyk ook de *Hoofd- Hals- Borst- en Buikwonden*; de *Wonden der Ledemaaten*, en dergelyken. Wy zullen elk derzelver, onder haar eigen Opschrift voordraagen.

De Gestookten Wonden.

§ 49.

Vulnera puncta.

GESTOOKEN WONDEN zyn het uitwerkzel der treffing van een Degen, Mes, Priem, Glas, Doorn, en in 't algemeen, van alle fcherp gepunte, en meer of min harde Lighaamen.

§ 50.

Deeze Wonden, alsze alleen de algemeene Bekleedzelen inneemen, zyn van weinig aanbelang; maar dieper gaande, en wanneerze doordringen tot in een der holligheden van het Lighaam, of een Pees, Peesägtig uitbreidzel, Zenuw, Slagader, en dergelyken beleedigen, hebbenze meestäl zeer fchadelyke gevolgen, en eifchen al de oplettenheid des Heelmeesters.

§ 51.

De reede hier van, ligt ten opzigte der Zenuwen, in de gedeeltelyke fcheiding der Vezelen; en met betrekking tot de overige Deelen, in eene uitftorting van Vogten, en derzelver verhinderde, of geheel belette ontlasting naar buiten..

§ 52.

Het verhinderen der Uitftorting, door den invloed van het Bloed in het gekwetste Deel te maatigen, is de eerste aanwyzing ter geneezing, van alle deeze Wonden zonder onderscheid.

§ 53.

Men voldoet aan dit Oogmerk, door de Aderlaating, Buikzuivering, eene verkoelende Eetregel, rust van het beleedigd Deel of van het gantsche Lighaam, en vooräl door het *uitdryvend Verband van THEDEN*, als de Wond zig bevind aan een der Ledemaaten..

§ 54.

Beantwoorden deeze hulpmiddelen niet aan de verwagting, zoo moet de Wond, overäl waar zulks zyn kan, door infnyding verwyd, het uitgestorte Vogt ontlast, en de gekwetste Deelen, overëenkomstig hunnen byzonderen aart, behandelt worden..

De Gescheurde Wonden.

§ 55.

Geene WONDEN mischien zyn gevaarlyker dan de GESCHEURDE; inzonderheid wanneer daar in betrokken zyn de Peezen, de Zenuwen, de Bloedvaten, de banden der Gewrigten, en dergelyken; of als een meer of min aanzienlyk gedeelte van eenig Deel, 't zy geheel, 't zy ten deele, daar door afgezonderd wordt van het overige. *Vulnera lacerata.*

§ 56.

In deeze gevallen naamlyk, verschynen doorgaans zeer hevige Pynen, Ontsteking, Zwelling, Stuiptrekkingen, Bloedstortingen, Verëatteringen, Verstervingen, Koortsen, en dergelyken; welke niet, of nauwlyks eindigen dan door den Dood.

§ 57.

Onbepaalde, dog voorzigtig gedaane insnydingen, herhaalde Aderlaatingen, Buikzuiveringen, verkoelende Geneesmiddelen, een ruim gebruik van het *Heulsap*, en den aanleg van Balsemagtige en Verzagtende Plaatsmiddelen, koomen ter geneezing deezer Wonden, vooräl in aanmerking. Dat alle deeze Hulpmiddelen van den beginne af moeten aangewend worden, is iets, waar op ik nauwlyks genoeg kan aandringen.

§ 58.

In Wonden van deeze foort, by welke men de meest dringende der gemelde toevallen heeft afgekeerd of overwonnen, maar die in het geval zyn eener groote Verëtering, moet eene voedende Eetregel, en het gebruik van den *Koortsbast* worden voorgeschreeven.

§ 59.

Eene aanmerklyke verscheuring der Gewrigten, en de gedeeltelyke of geheele afscheuring van een meer of min aanzienlyk gedeelte van eenig Deel, is den meesten tyd doodelyk, als men niet ten spoedigste besluit tot de Afzetting.

De Gekneusde Wonden.

§ 60.

*Vulnera
Contusa.*

GEKNEUSDE WONDEN zyn het uitwerkzel van vallen, slaan, stooten, smyten, schieten, en in 't algemeen, der geweldige toepassing van een zwaar, hard en stomp Werktuig, op eenig gedeelte van ons Lighaam.

§ 61.

Contusa.

Eene gekneusde Wonde ondersteld KNEUZING; dat is, eene saamendrukking, of verbreeking der zagte Deelen, met stilstand der Vogten in de Vaten, of uitstorting derzelve in de vakjes van het Celwyze Weeffel.

§ 62.

De eerste soort van Kneuzing, kan opklimmen van het gevoel eener ligte pyn, tot den graad van Versterving; de laatste, van eene zeer geringe Bloedvlek, tot eene volstrekte Vermorseling.

§ 63.

Elk deezer soorten heeft zyne eigen kenmerken, welken het zeer noodig is te onderscheiden.

In die der eerste soort naamlyk, blyft de kleur der Bekleedzelen dezelfde als natuurlyk; 'er is of geheel geene, of althans zeer weinig Zwelling; en de Lyder klaagt slegts over eene doove Pyn in het aangedaane Deel, en onvermoogen in de beweeging.

In de tweede soort zyn de pynen doorgaans levendiger, de huid is miskleurig, en 'er vertoond zig eene loodverwige, of blaauwroode Zwelling, in alle gevallen evenreedig aan de hoegrootheid zelve der Kneuzing.

§ 64.

Eene gekneusde Wonde, op zig zelfs beschouwd, verschilt zeer weinig van eene gesneden. Al het gevaar welk dezelve insluit, is afhanglyk van den trap der byzynde Kneuzing, en den aart der Deelen, welken deeze inneemt.

§ 65.

Wat de behandeling belangt deezer Wonden; deeze is in verscheiden gevallen verschillend, en betreklyk, of tot de Wonde zelfs, of tot de nevensgaande Kneuzing.

§ 66.

§ 66.

De Wond wordt in alle gevallen verbonden, met zagte en eenigzints Balsmagtige Dragtmiddelen. Alsze te klein is om ontlasting te geeven aan het uitgestorte Bloed, of zeer Zenuwagtige Deelen inneemt, moetze verwyd worden door eene insnyding. Zoo draa eindelyk, alsze in den staat gesteld is eener eenvoudige Wonde, kan menze op dezelfde wyze geneezen als deeze.

§ 67.

De behandeling der Kneuzing, sluit de herstelling in der verlooren Veerkracht van de saamengedrukte Vaten; en de oplosfing, of ontlasting der geslagneerde of uitgestorte Vogten.

§ 68.

Men voldoet aan het eerste Oogmerk, door het Deel by aanhoudenheid te stooven met roode Wyn en het Ammoniak Zout; aan het tweede, door een mengzel van gelyke Deelen Azyn, Water, en Brandewyn, met hetzelfde Zout bedeed, of met den Geest van MINDER verslapt met Water; en aan het derde, door het opsnynen der Verzaamling, of de verwyding van de Wonde.

Het uytdryvend verband van THEDEN, als het Deel zulks toelaat, en het aanwenden der algemeene, ontlastende, en van verdunnende Geneesmiddelen, begunstigen zeer de Oplosfing.

§ 69.

Dat soort van Kneuzing, welk een gantsch Deel doet verfterven; gelyk ook de geheele vermorseling van één der Ledemaaten, erkend geene andere Geneezing dan de Afzetting.

§ 70.

De verbryzeling der Gewrigten, is in het zelfde geval met de voorige, en kan op geene andere Wyze gered worden.

De Geschooten Wonden.

§ 71.

GESCHOOTEN WONDEN behooren gedeeltelyk tot de Klasse der Gekneusde, gedeeltelyk tot die der Gescheurde, dog zyn ook somwylen van den aart der *Vulnera sclopetaria* ge.

gestooken, gesneden, of gehouwen Wonden. De verschillende Natuur der Lighaamen, door Schietgeweer voortgedreeven, bepaald alleen deeze verscheidenheid.

§ 72.

Deeze Wonden, 't zy dezelve zyn met of zonder verlies van Zelfstandigheid, alsze alleen de algemeene Bekleedzelen en Spieren inneemen, zyn van geen groot aanbelang. Het tegendeel is waar, alsze tevens de Paezen, Peesagtige Uitbreidzels, Zenuwen, aanzienlyke Bloedvaten, en de Gewrigten beleedigen; of, wanneer de Kogel doorgaat tot in een der holligheden van het Lighaam, met kwetsing van één of meer der Ingewanden daar in beslooten.

§ 73.

De Schootwonden worden onderscheiden, in die geheel of ten deele een gegeven Deel doordringen; in dezulken welke een aanzienlyk gedeelte daar van wegneemen; en in die genen, waarin het wondend Werktuig al of niet verhoolen is in de Wonde.

§ 74.

Alle deeze soorten van Wonden bloeden weinig, als 'er geen groot Vat tevens geöpent is; zyn in haar gantsch beslag met eene doode Korst bezet; worden verzeld van zeer veel Ontsteking; en zyn onderhevig aan eene groote, dog traage Verëtering.

§ 75.

De algemeene behandeling eener eenvoudige Schootwonde, bestaat in de verwyding der Wond door een of meer insnydingen; in het aanleggen van zagte Balsmagtige Middelen op deeze, en van verflappende, langs de gantsche uitgestrektheid van het Deel; gelyk ook, in het toedienen van zeer verdunnende, verkoelende, ontlastende, en pynstillende Geneesmiddelen, gevoegd by herhaalde Aderlaatingen, en eene koele Leefregel.

Eenvoudige geschooten Wonden, noeme ik dezulken, in welken geenig vreemd Lighaam verhoolen is, nog eenige zeer gewigtige Deelen betrokken zyn.

§ 76.

Gedeeltelyk doorgaande Schootwonden, hebben altoos de Kogel, of eenig ander vreemd Lighaam in zig beslooten. Deeze moeten, na behoorlyke verwyding van den ingang der Wond, op eenige der wyzen § 35. gemeld, daar uit genoomen worden.

§ 77.

§ 77.

Indien eenig geöpent aanmerklyk Bloedvat, en de hier van afhangende Bloedvliet, zig tegen de wegneeming deezer zelfftandigheden aankanten, moet men door de onderschepping van het Vat zig-meester maaken van den Bloedvliet, vermits de overige manieren van Bloedftemping, die alle eene meer of min aanzienlyke drukking influiten, hier niet te pas komen.

§ 78.

Is de wegneeming van het vreemd Lighaam onmooglyk, 't zy uit hoofde van deszelfs plaatsing, 't zy om eenige andere oorzaak, zoo moet men de uitwerping daar van aan de Natuur beveelen, en de Wond intusfchen zagt, dat is, zonder eenige opvulling verbinden.

§ 79.

Ingevalle de Kogel, de gantsche zelfftandigheid van eenig Deel doorboord heeft, moet beide de ingang en uitgang der Wond door insnyding verwyd worden, en wel zoo diep, als de Natuur van het Deel, behoudens alle mooglyke veiligheid, maar eenigzints toelaat.

§ 80.

De gantsche wegneeming van een Deel door een Kanons-Kogel, gaat doorgaans gepaart met fplyting der overgebleeven Beenëinden, en eifcht hieröm, en om de zeer groote verfcheuring der zagte Deelen van den ftomp, eene fpoedige Afzetting.

§ 81.

In de gefchooten Wonden van het Aangezigt, waar in dit Deel ontfierd wordt, door de in de Huid gedreeven Kruidkorrels, moet men zig wel wagten om het voorfchrift te volgen van sommige Heelmeesters, met opfigt tot de wegneeming van deezen door een fcherp gepunt Werktuig. Men ftoove flegts het Deel by aanhoudenheid met lauwe Melk en Water; en de Natuur zelve, zal door middel der Verëttering, alles uitwerpen.

§ 82.

Eene algemeene Regel in de behandeling van alle aanmerklyke Schootwonden is, dat, zoo draa de Ontfteking geweeken, de Verëttering tot ftand gebragt, de

Pyn zeer vermindert, en de Pols eenigermaten aan het Zinken is, terstond moet gebruik gemaakt worden van den Koortsbast, en eene voedende Eetregel.

De Vergifte Wonden.

§ 83.

*Vulne-
ra venena-
ta.*

VERGIFTE WONDEN zyn, in dewelken eenigerhanden, voor ons Leven vernielende zelfstandigheden, zyn ingedrukt.

§ 84.

*Morsus
Canisrabi-
di.*

De gemeenzaamste deezer, en mischien ook de gevaarlykste, is de DOLLE HONDSBEET, by dewelke wy ons enkel bepaalen zullen.

§ 85.

Een Hond wordt *Dol* genoemd, wanneer hy geheel en al, in gedaante en houding verändert; mager, droog, verhit, en zeer ontstelt wordt; niet drinken wil; doorgaans buiten adem is; roode en ontstoken Oogen heeft; de Staart en Ooren hangen laat; de Bek bestendig open houdt; de Tong uitsteekt; een schuimend Speezel uitwerpt; het water vreest; met den Kop op zyde hangende, onbezuïd voortloopt; zonder blaffen, alles wat hem in den weg is, aanvliegt; geen de minste agt slaat op zynen Meester; en van andere Honden gevreesd, en niet te keer gegaan wordt.

§ 86.

*Hydro-
phobia.*

Een Mensch van zulk eenen Hond gebeeten, wordt Droefgeestig, benauwd, krygt menigvuldige flauwtens, zwarte Galbraakingen, Stuipen, Zinvang, uitwerping van een lymig Speekzel, de Hik, Koud Zweet, WATERVREES, moeilyke of geheel belette doorzwelging, dolheid, en dergelyken, welken allen tot aan zynen Dood hem byblyven.

§ 87.

Het getal, en de hoegrootheid deezer Toevallen, gelyk ook de Tyd waarin dezelve doorgaans verschynen, is meer dan waarschyglyk afhanglyk van de hoegrootheid der Wonde zelfs; van de hoeveelheid en kwaadäartigheid des Vergifts, daar in gebragt; en van de byzondere gesteltheid zoo wel, als Levenswyze des Lyders.

§ 88.

§ 88.

De behandeling deezer Wonden, is of *algemeen*, of *byzonder*. De laatste is betreklyk tot de Wond zelfs, de eerste tot het gantsche Lighaam.

§ 89.

Tot de *byzondere behandeling* behooren.

1. De Zuiging door een Kopglas, op de Wond zelve geplaatst, en het opvolgend wegsnyden van alles wat in dit glas opryst.
2. De aanleg van een sterke spaansche - vliegen pleister, zoo op de Wond, als op een aanmerklyk gedeelte van den Omtrek, en het onderhouden der lekking hier door verwekt, geduurende verscheiden Weeken.
3. De vernieling van den grond der Wonde, door daadelyke Brandmiddelen; onder welke een aangestoken Kegel van Buskruid, op dezelve geplaatst, om zyne gemaklyke verkrygbaarheid, en vaardige uitwerking, mischien uitmunt.
4. Het veelvuldig waschen der Wond, met Azyn, Zout, en Theriaak.
5. De afzetting van het gebeeten Deel, onmiddelyk na de Kwetsing.

§ 90.

Het getal der *Algemeene Geneesmiddelen*, dat is derzulken, welken door den Mond ingenoomen, hunne Uitwerking oeffenen op de gantsche Massa onzer Vogten, en mischien ook op het Zenuwgestel, is zeer groot, en kan nauwlyks bepaald worden. De Voornaamste van deezen egter, zyn het *middel van PALMARIUS*, dat van *BEVERWYK*, van de *Staatē van Gelderland en Friesland*, van *COBB*, de *Bildsche Kookdrank*, het *Specificum*, onlangs op hooge Orde des Konings van *Pruisfen* gemeen gemaakt, en de bereidzelen van het *Kwik-Zilver*.

§ 91.

In de *Waterrees*, het gevaarlykste toeval der dolle Hondsbet, schynd niets van eenige uitwerking, dan mischien het voorgemelde middel van *COBB*, gepaart met herhaalde Aderlaatingen, Klysteeren, en het gebruik van het *Heulsap*, de *Asa fetida*, *Castorium*, *Valeriana Sylvestris*, en andere soortgelyke Geneesmiddelen.

De Wonden der Peezen.

§ 92.

*Vulnera
zendum.*

DE WONDEN DER PEEZEN zyn fomwylen van niet veel aanbelang; fomwylen verwekken dezelve veelerhanden, en zelfs zeer gevaarlyke Toevallen.

§ 93.

In het eerste geval, is de Uitwendige Wond meestäl ruim, en word 'er eene vrye ontlasting gegeven aan de Wye, welke uit de gescheiden Peesvezelen uitlekt. In het laatste, behoord de Wond doorgaans tot de Klasfe der gestooke- ne, en is de ingang zoo nauw, dat ze de uitvloed belet van dit Vogt, en het zelve in de Kooker der Pees, of elders, doet ophoopen.

§ 94.

Een bestendig toeval, by geheel afgesneden Peezen, is de beweegloosheid des Deels, waar de beleedigde Pees naar toe gaat, voor zoo veel deeze beweeging afhangt van de werking der Spier, welkers Pees is afgesneden. Men kan hier nog byvoegen, dat de tegenwerkende Spieren, het Deel naar de juist tegestelde zyde trekken, en het geduurig in dien stand gevestigd houden.

§ 95.

De gewoone toevallen der gestooken Peeswonden, zyn Pyn, Ontsteeking, Veröttering, Verfterving, en dergelyken. De Pyn, verschynd zeldzaam terstond na de kwetsing, maar doorgaans eerst na verloop van eenige Uuren of Dagen, en doet zig bepaaldelyk gevoelen langs den loop van die Spier, tot welke de beleedigde Pees behoord. Men moet op deeze byzonderheeden wel agt geeven, om dat ze zeer nauwkeuring de Peeswonden onderscheiden, van die der Zenuwen.

§ 96.

Ter geneezing der gestooken Peeswonden, moet men het wondje dekken met een weinig Plukzel, doordrongen met den *Terpentyn Geest*, de *Balsamus Copai- vae*, die van *Peru*, of dergelyke, en dezelve met eene daar op gehouden warme Spatel doen indringen. Men overdekt vervolgens het Plukzel met een dikke Drukdoek, bevogtigt met het *Aqua Regin. Ungar.* met *Azyn* en *Water*, met *Vlier. Azyn*, of *Azyn* getrokken op *Goudglit*, en verflapt met eene dubbele hoeveelheid

veelheid Water. Het Uitdryvend verband van *THEDEN*, moet deezee geheel toefstel influiten, en met één deezee zelfde Hulpmiddelen gefladig nat gehouden worden. Eene Aderlaating als den Lyder bloedryk is, en verkoelende Buikzuiveringen, gepaart met eene ftrengge Leefregel, begunftigen heel zeer de geneezing.

§ 97.

Ingevalle deeze behandeling niet voldoet aan het Oogmerk, of men 'er wordt bygeroepen, als den Lyder zig reeds bevind in den ftaat der Toevallen, moet de Wonde aanftonds door infnyding verwyd, met zagte Balfemächtige middelen verbonden, en het gantfche Deel met eene weekmaakende en verkoelende Pap gedekt worden.

§ 98.

In de geheelee of gedeeltelyke afnyding der Peezen, moet men het Deel in dien ftaat plaatfen, welke aan de Werking der overéénkomftige Spier beäntwoord: dat is te zeggen, dat als by voorbeeld de Pees eener uitftrekkende Spier doorsneden is, het Deel moet gehouden worden in den ftaat van Uitftrekking, en indien der buigende, in die van buiging.

§ 99.

De Wond intusfchen, wordt in deeze omftandigheid behandeld met dezelfde Hulpmiddelen, als in het voorige geval; en vooräl fteunend gehegt met de droogge Hegting.

§ 100.

Peezen, behoudens de geheelheid der Bekleedzelen, door een val, of fprong gebrooken, vallen in dezelfde aanwyzing als die geheel zyn doorgesneden. Dit wil zeggen, datze door de plaatfing des Deels moeten geheeld worden.

§ 101.

Wat betreft de kwetfing der Peesächtige Uitbreidingen; deezee zyn in alle opfigten gelyk aan die der Peezen, en verdienen geene byzondere oplettenheid.

De Wonden der Zenuwen.

§ 102.

De WONDEN DER ZENUWEN, zyn aan een zelfde verfchil onderworpen als die der Peezen; geeven in gelyke omftandigheden, byna dezelfde verfchynzelen, *Vulnera nervorum.*

len, hoewel in eenen meerderen graad; en worden op gelyke wyze, de plaatsing des Deels alleen uitgezondert, gencezen.

§ 103.

Eene geheel doorgesneden Zenuw, neemt het gevoel weg van het Deel, waar dezelve naar toe gaat, dog beroofd dit niet altoos van zyne beweging.

§ 104.

Eene gedeeltelyk afgesneden of gestookten Zenuw, wordt van meer en zwaarder Toevallen gevolgt, dan die geheel is doorgesneden. Men kan hetzelfde zeggen van de gekneusde.

§ 105.

De Toevallen der Zenuwwonden verschynen veelmaalen terstond, somwylen binnen weinig Uuren, en zeldzaam, na verloop van 2, 4, en meerder Dagen. In het laatste geval ontspruitente meestal uit eene ontsteking der Zenuw, of derzelver beginnende Verëtering.

§ 106.

Het eerste soort onderscheidend kenmerk eener Zenuwkwetsing, is eene hevige Pyn, zig uitstreckende langs derzelver geheele loopstreek, en die in de meeste gevallen bestendig aanhoud, dog ook wel eens, voor eenen zeekeren tyd nalaat.

§ 107.

Als het gevaarlykst Toeval deezer wonden, moet men aanmerken de Stuiptrekking, en vooräl de Mondklem, waar van slegts zeer weinige ontkoomen. Dit Toeval is het inzonderheid, welk dergelyke Wonden gemeenzaamer verzeld dan die der Peezen.

§ 108.

Het dringend gevaar der Zenuwwonden, vordert ten aanzien haarer behandeling, alle spoed en oplettendheid. Ik hebbe reeds in het voorbygaan gezegd, dat deeze behandeling, de omstandigheden gelyk gesteld zynde, dezelfde was als die der Peeswonden; en moet nu aanmerken, dat de Aderlaatingen in het algemeen, menigvuldiger, en de hoogst verkoelende en Pynstillende Middelen in grooter hoeveelheid moeten gegeven worden, dan by deezen. Eene dwersche afsnyding der slegts geprikte, of gedeeltelyk doorgesneden Zenuw, moet daarenboven,
in

in alle gevallen waar zulks zyn kan, en de gewoone hulpmiddelen geene Uitwerking altoos hebben, nimmer verzuimd worden.

De Wonden der Bloedvaten.

§ 109.

De WONDEN DER BLOEDVATEN, zyn betreklyk, of tot de *Slagäderen*; ^{*Vulnera*}
of tot de *Aderen*, en kunnen dezelve, of geheel, of gedeeltelyk doorsnyden, of ^{*vasorum*}
zig alleenlyk bepaalen by derzelver meest uitwendige bekleedzelen. ^{*sanguifero-*}
^{*rum.*}

§ 110.

De ontlasting van een helder rood, schuimend, en stootswys springend Bloed, die zig niet dan met veel moeite bedwingen laat, is een vry onbedrieglyk kenmerk eener gekwetste Slagäder. Eene droppel- of boogwyze en eenpaarige ontlasting deezer Vloeistof integendeel, die met weinig toefstel gestuit wordt, bewyst niet minder ontwyffelbaar, het bestaan eener gekwetste Bloedäder.

§ 111.

De Bloedvliet eener flegts geöpende Slagäder, is aanhoudender, minder stempbaar, en dienvolgens gevaarlyker, dan die eener geheel doorsnedene. De reede hier van is, dat in het eerste geval, de gescheiden Vezelen door saamentrekking de Wond bestendig open houden, daarze dezelve integendeel doen sluiten in het laatste.

§ 112.

De Bloedstorting eener geöpende, of geheel doorsneden Ader, sluit geenerhande gevaar in, en is in de meeste gevallen, met zeer weinig moeite te beteugelen.

§ 113.

De Natuur, stempende zelfs eene Bloedvliet, bediend zig hier toe van tweërlye hulpmiddelen, overëenkomstig met de verschillende Natuur der Kwetsing, van dewelke dezelve afhangt. Het eerste is de aanëengroeiing van de zyden des geöpende Vats, met de omliggende Deelen. Het tweede, de inkorting, en sluiting van derzelver einden, ter plaatze der doorsnede.

§ 114.

§ 114.

Wy hebben § 41. gezien, van welke Hulpmiddelen de Kunst gebruik maakt ter bewerking der Bloedstemping, en moeten nu aanwyzen, hoedaanig deezen de Bloedvliet te keer gaan, en op welk eene wyze men zig daar van bedienen moet.

§ 115.

Het eerste Hulpmiddel hebbenwe gesteld te zyn, de aanleg van het Tournequet op den Stam der geöpende Slagader. Dit egter, moet men enkel beschouwen als voorbereidend, dat is te zeggen, als geschikt om de Bloedvliet zoo lang af te keeren, tot men zig op eenige andere wyze daar van meester maake. In gewoone gevallen is het Schroeftournequet van PETIT, of eenig ander, hier na gemaakt het beste. By gelegenheid der Afzettingen daarëntegen, heeft het gemeene Draaitournequet den voorrang. In beide omstandigheden, wordt dit Werktuig, op eenigen afstand boven de Wond gelegd op den Stam der Vaten, en niet meer aangeslooten dan genoeg is om den uitvloed des Bloeds te beletten.

§ 116.

Het tweede Hulpmiddel ter Bloedstemping, door ons voorgeschreeven, is de fluiting der opening van het Vat, door een drukkende Vinger. Dit is voor een gedeelte in hetzelfde geval als het Tournequet, en diend alleen om zig zoo lang meester te maaken van den Bloedvliet, tot men in staat is eenig ander Hulpmiddel aan te wenden; gedeeltelyk, bediend men zig van hetzelfde als het voornaame, en eischt alsdan Helpers, die uit hoofde van hun Beroep aan een zittend Leven gewend zyn.

§ 117.

Als een derde Hulpmiddel hebbenwe beschouwd, het gebruik van saamentrekken-de dingen, van droog Plukzel by voorbeeld, van *Bovist*, van de Spons, de Eiken zwam, de Terpentyn Geest, de overgehaalde Brandewyn, de meeste soorten van Koperrood, de Aluin, en dergelyken. Alle deezen worden tegen de einden der Vaten aangebragt, of op zig zelfs, of vermengt met elkander, voor zoo veelze hier voor vatbaar zyn; en op eene Wyze, met den byzonderen aart derzelver, en de plaatsing van het geopent Vat overeenkomstig. Een welsluitend Verband, is ter ondersteuning der Werking van elk deezer Hulpmiddelen, zeer noodzaaklyk.

§ 118.

§ 118.

Het vierde Bloedstempend middel, de onderschepping naamlyk van het Vat, is eenigermaten verschillend, na dat de Slagäder, of geheel doorgesneden, of alleen zydelijk geopent is. In het Leerstuk der Kunstbewerkingen, zullenwe hierömtrent de noodige onderrigtingen geeven.

§ 119.

Het vyfde middel ter Bloedstemping voorgesteld, is de geheele doorsnyding eener slegts zydelijk geöpende Slagäder. Om deeze te doen zonder kwetsing van eenige naastgeleegen Deelen, welken moeten gemyd worden, ontbloot men de Slagäder zoo veel noodig zy door eene insnyding; men brengt onder dezelve door, een geboogen Tentyzer, een stomp Haakje, of eenig ander dergelyk Werktuig; ligt dezelve hier mede op, en doorsnyd het opgeligte gedeelte, ter plaatse der Kwetsing, geheellyk. Dit Middel komt inzonderheid te pas in die omstandigheden, waar in nog de saamentrekkende middelen, nog de Drukking, van eenige Uitwerking zyn kunnen, en de Wond, of groot genoeg is, of door Konst kan gemaakt worden, om hetzelfde toe te laten.

§ 120.

De Branding, de zesde manier van Bloedstemping, heeft een uitsluitend regt in de bloeding der Slagäderlyke Vaten van de Tong en het gehemelte, gelyk ook by de wegneeming van zeer groote Uitwasfen aan het Tandvleesch, en dergelyken. Men moet ömtrent dezelve aanmerken, dat de grootte en gedaante van het Brandyzer, uet de Uitgebreitheid en plaats van het geval, zoo veel mooglyk zy moeten overéénkomen, en het niet dan volmaakt gloeiend moet aangelegt worden.

§ 121.

Wat het laatste Bloedstelpend Middel, te weten, de gestadige drukking der Handen van elkander afwisselende Helpers betreft; deeze behoort tot meest alle beschreeven wyzen van Bloedstemping zonder onderscheid; en moet meer als medehelpend, dan wel als weezenlyk beschouwd worden.

§ 122.

Behalven deeze aangewezen manieren van Bloedstemping, zyn 'er nog andere van minder aanbelang; en zulke, welken alleen tot zekere byzondere Deelen be-

trekking hebben. De eersten zullenwe met stilzwygen voorby gaan; van de laatsten zal gesproken worden, zoo dikmaalen zig de gelegenheid hier toe, aanbied.

§ 123.

Dat eene koele Levenswys, rust van het beleedigd Deel en van het gantsche Lighaam, gelyk ook het gebruik van verkoelende en de beweeging maatigende Geneesmiddelen, in alle gevallen van Bloedstorting volstrekt noodzaaklyk zyn, is iets, 't welk nimmer uit het oog moet verlooren worden.

§ 124.

De volgende byzonderheden, zyn betreklyk vooräl tot de derde manier van Bloedstemping; en van te veel aanbelang, om dezelve ongemerkt voorby te gaan.

§ 125.

Het Plukzel, welk wy onderstellen dat fyn is, moet sterk in een geperst, en knoopswyze gelegd worden tegen de opening der bloedende Slagäder, terwyl de gantsche Wond met dergelyk Plukzel opgevuld, met trapswys grooter wordende Drukdoeken gedekt, en van een welsluitend Verband eenpaarig gedrukt wordt.

§ 126.

Van de Swam worden één of meer stukken, een weinig grooter dan de doorsnede is van het Vat, met dat gedeelte welk tegen zynen schors overstaat, gelegd tegen het einde der Slagäder, en door een zelfde Verband aangeslooten. Omtrent het gebruik der Bovist, kan men hetzelfde aanmerken.

§ 127.

De Spons, alsze zal beäntwoorden aan het oogmerk ter Bloedstemping, moet fyn, droog, en evenwydig aan de strekking haarer saamenstellende plaatjes gesneden zyn. Verscheiden stukken derzelver, van een trapswys vermeerderde grootte, worden dermaaten geplaatst op elkander, datze eene afgekorte Kegel maaken van ten minsten een duim hoogte. Het toppunt deezer Kegel, welks vlak eenige meerder omtrek moet hebben dan de doorsnede heeft der Slagader, wordt zoo nauwkeurig als mooglyk is, tegen deeze doorsnede aangelegt, en de Wond voor het overige, op gelyke wyze als vooren verbonden.

§ 128.

§ 128.

De vloeibaare Stempmiddelen, worden door een Spuit aangebragt in hevige Neusbloedingen, en in de slagäderlyke bloedingen van andere Deelen, door middel van zeer vast in een geperst fyn Plukzel.

§ 129.

De verschillende foorten van Kopperrood, worden gebruikt by wyze van instrooijing; of men besluit dezelve, in een neteldoeks lapje, dat in de gedaante eener knoop, tegen het bloedend Vat wordt aangelegt.

§ 130.

Van de Aluin bediend men zig veelal in Water opgelost; en fomwylen by wyze van een Pennetje, 't welk voor een klein gedeelte gestooken wordt in het afgesneden einde der bloedende Slagäder. Dit Hulpmiddel is inzonderheid voorgesteld ter stuiting van den Bloedvliet, na de afzetting der Ledemaaten.

De Wonden der Watervaten.

§ 131.

De tederheid der Watervaten, hunne geringe Veerkracht, en de zeer groote dunheid van het Vogt welk zy insluiten, maaken de kwetsing deezer Deelen fomwylen zeer moeilyk, uit hoofde vooräl, eener langduurige, en nauwlyks betembaare lekkings. *Vulnera
vasorum
lymphaticorum.*

§ 132.

Hoe gering derhalven, ons deeze Wonden ook moogen toefchynen, moet men dezelve altoos met veel oplettenheid behandelen, indien men nog de eer der Heelkunst, nog zynen goeden naam wil in de Waagschaal stellen.

§ 133.

Een ander gevolg van de kwetsing deezer Vaten, is eene uitstorting der Wye in het Celwyze Weeffel, en eene hier van afhangende onpynlyke, en niet misleurige Zwellings van den omtrek der Kwetsing.

§ 134.

Beide deeze gevallen, ik wil zeggen, de lekkings en de zwellings, moeten

gedeeltelyk op dezelfde, gedeeltelyk op eene verschillende wyze, behandeld worden.

§ 135.

In het eerste geval naamlyk, tragt men de lekkings te stuiten, door het aanleggen van een weinig Plukzel, doordrongen met eene sterke smelting van blauw Koperrood, in overgehaalde Brandewyn, ondersteund van tragswyze Drukdoeken, en een welsluitend Windzel.

§ 136.

In het tweede legt men het uitdryvend verband aan van THEDEN, en bevogtigt zulks by aanhoudenheid met eene ontbinding van het Ammoniaksout in Water en Brandewyn.

§ 137.

In het een zoo wel, als in het ander deezer gevallen, moet het Wondje, door insnyding verwyd worden, wanneer de aangewende Hulpmiddelen van geene uitwerking zyn, en men zig verplicht mogt vinden, het gekwetste Vat, door verzeering te vernielen.

De Hoofdwonden.

§ 138.

*Vulnera
capitis.*

HOOFDWONDEN noemt men in 't algemeen dezulken, welke eenig gedeelte van den omtrek des Bekkeneels inneemen; zonder eenige agt te slaan op die van het Aangezicht.

§ 139.

Deeze Wonden bepaalen zig alleen by de algemeene Bekleedzelen, de Peeskakel, en het Panvlies; of dringen door tot in de zelfstandigheid der Bekkeneelsbeenderen, van het harde Hersenvlies, of zelfs der Hersenen. Zy zyn afhankelijk, of van scherpe, of van stompe Werktuigen; en al of niet vergezeld van eene uitstorting van Bloed onder de Hersenpan, schudding der Hersenen, en dergelyken.

§ 140.

Op dit verschil is gegrond, de gewoone onderscheiding deezer Wonden, in eenvoudige en saamengestelde, in doorgaande, en niet doorgaande; in gestookten, ge-

gesneden, gehouwen, gekneusde, en geschooten; in geringe, gevaarlyke, doodelyke, en wat dergelyken meer zyn.

§ 141.

De gestookten, gesneden, en gehouwen Wonden van de bedekzelen des Bekkeneels, zyn in hetzelfde geval, en eischen dezelfde behandeling, als die der Bekleedzelen in het algemeen, der Peesagtige Uitbreidingen van andere Deelen, en dergelyken. Uit de te vooren gegeven beschryving derhalven van deeze Wonden, kan men alle byzonderheden ontleenen, welke betrekking hebben tot genen.

§ 142.

Men kan hetzelfde aanmerken omtrent de gekneusde en geschooten Wonden deezer Deelen; met byvoeging alleen, dat die der Slaapspiereu, der Peeskalot, en van het Panvlies; gelyk ook dezulken, welke gepaart gaan met eene schudding der Hersenen, of uitstorting van Bloed onder de Hersenpan; een byzonder gevaar insluiten, en van stonden aan, op eene zeer beslissende wyze moeten behandeld worden.

§ 143.

Alle mooglyke beleedigingen van het Bekkeneel, voor zoo veel dezelve behooren tot de toepassing van scherpe Werktuigen, kunnen gevoeglyk gebragt worden tot de oppervlakkige Insnyding, de diepe Insnyding, de Doorsnede, de schuinze Snede, en de Afsnyding.

§ 144.

Door de OPPERVLAKKIGE INSNYDING, verstaat men eene snede, welke niet verder dan tot in de buitenste Taafel des Bekkeneels doorgaat. De DIEPE INSNYDING, strekt zig uit tot in het Taafelscheidzel. De DOORSNEDE, de SCHUINZE SNEDE, en de AFSNYDING, verdienen geene opheldering, om dat haare Naam zelve deeze insluit.

*Seder.**Incisio.**Percissio.**Diacopé.**Deolatio.*

§ 145.

De twee eersten deezer Bekkeneelswonden, sluiten doorgaans weinig gevaar in, en worden door eene eenvoudige behandeling zeer gemaklyk geneezen. De derde en vyfde, gaan meest altyd verzeld met eene kwetsing der Hersenen, of met

uitstorting. De vierde is min of meer van aanbelang, na datze minder of meerder schuins is, en of oppervlakkig, of diep doordringt.

§ 146.

De beledigingen des Bekkeneels, afhanglyk van stompe Werktuigen, bevatten inzonderheid de Scheur, Breuk, Indrukking, Kneuzing, en afwyking der Naaden.

§ 147.

Fisfura. De SCHEUR bepaald zig alleen tot de buitenste Taafel der Bekkeneelsbeenderen, of dringt tevens door tot in de binnenste. Ze is somwylen zoo fyn, datze niet dan met moeite kan ontdekt worden, en draagt in dit geval den naam van *Rima ca. illaris* HAIRSCHEUR.

§ 148.

Fractura. De BREUK ondersteld eene verbreeking der Bekkeneelsbeenderen, in twee of meer stukken, door derzelver gantsche zelfstandigheid heen gaande. In alle gevallen is dezelve vergezeld met uitstorting, en somwylen zelfs, met verscheuring des harde Hersfenvlies, en der Hersfenen.

§ 149.

Impressio. Door INDRUKKING verstaat men eene inwaardsbuiging van eenig gedeelte deezer beenderen, 't zy met, 't zy zonder verbreeking. Het laatste geval gebeurd meest by Kinderen, dog is niet volstrekt onmooglyk by Bejaarden, gelyk sommige gewild hebben. Dit geval kan bestaan zonder uitstorting, het eerste is altoos daar mede verbonden.

§ 150.

Contusio. De KNEUZING is eene saamenperping der Beenplaatjes van de buitenste Taafel der Hersfenpan alleenlyk, of van deeze Taafel op de binnenste. Somwylen gaat dezelve vergezeld van eene Schudding der Hersfenen. Doorgaans wordze gevolgt van Beenbederf.

§ 151.

Disjunctio futurum. De VANEENWYKING DER NAADEN bestaat zeldzaam op zig zelfs, maar is meestäl verbonden met eene breuk der Bekkeneelsbeenderen, uitstorting van Bloed onder de Hersfenpan, en verscheuring van het harde Hersfenvlies. Dat egter, 't gene men nauwlyks vermoeden zoude, in enkele gevallen van deezen, aart,

aart, de geheelheid van dit Vlies ongeschonden blyft, heeft eene zeer zeldzaame ondervinding my geleeraard.

§ 152.

Alle deeze beleedigingen van het Bekkeneel, zyn niet gevaarlyk, dan uit hoofde eener schudding der Hersenen, derzelver kwetsing, uitstorting van Bloed op of onder het harde Hersenvlies, en der drukking of prikkeling deezer Deelen, door eenig Beenstuk, of eene opvolgende Ontsteking. Dit gevaar, algemeen genoomen, is evenreedig aan de kleinheid der blykbaare beleediging: dat is te zeggen, dat, alle overige omstandigheden gelyk zynde, eene geringe kwetsing der Bekkeneelsbeenderen, doorgaans gevaarlyker is, dan eene groote. De reede hier van moet gezogt worden, in de gebreklyke, of geheel onmooglyke ontlasting van het uitgestorte Vogt, by gene, en de gemaklykheid hier van, by deeze.

§ 153.

De kenmerken deezer kwetsingen van de Hersenpan, zyn in het geval eener byzynde aanzienlyke Wonde der Bekleedzelen, doorgaans zeer blykbaar. Als 'er geen Wonde by is, besluit men tot dezelve aanweezen, uit de kragt der voortbrengende Oorzaak, vergeleeken met de waarschyglyke of van elders bekende vastheid en dikte der Bekkeneelsbeenderen van het gekwetste Voorwerp; uit eene byzynde Kneuzing of *pateuse Zwelling* der Bekleedzelen; uit het gevoel van zeer merklyke onëffenheden, welke gedrukt wordende, den Lyder eene min of meer scherpe Pyn veröorzaaken; maar vooräl uit de toevallen eener drukking der Hersenen, Ontsteking van het harde Hersenvlies, of dergelyken.

§ 154.

Wy hebben § 142. aangemerkt, dat de gekneusde en geschooten Wonden der Slaapspieren, der Peeskalot, en van het Panvlies, zeer gevaarlyk waren; en moeten 'er nu byvoegen, dat zulks insgelyks moet verstaan worden van de gestooken; en het eerste Toeval deezer Wonden is eene zugtige Roos, die den gantschen omtrek des Bekkeneels inneemt, met uitfluiting alleen van de Ooren, en welke, verzuimd zynde, dikmaalen doodelyke gevolgen gehad heeft.

§ 155.

De SCHUDDING DER HERSENEN, waar van reeds zoo dikmaalen gesprooken is, heeft haare eigen Toevallen, welke tevens tot kenmerken dienen van deeze. Dus is het ook met de Uitstorting.

*Concussio
Cerebri.*

§ 156.

§ 156.

De Schudding der Hersenen, verwekt plotslyk, Braking, berooving der Zintuiglyke Werkingen, Bloeding uit den Neus, de Mond, of de Ooren, en dergelyken. Deeze Toevallen egter, verdwynen van zelfs, of na veelvuldige Aderlaatingen en Buikzuiveringen, in den Tyd van 24, of 48 Uuren.

§ 157.

Extravasatio.

De UITSTORTING, maakt, alsze gering is, in den eersten Tyd geene Toevallen, maar, niet wordende opgenoomen, na verloop van eenige Dagen. Eene zeer merklyke uitstorting, verwekt aanstonds bovengemelde Toevallen, welke steeds toeneemen, en nimmer nalaaten.

§ 158.

Dat 'er intusfchen veele gevallen voorkoomen, waarin de Toevallen van Schudding, en Uitstorting, elkander onafgebrooken opvolgen, en dienvolgens niet te onderscheiden zyn, is iets 't welk men wel moet in agt neemen.

§ 159.

Door *Schudding der Hersenen*, dit moet ik hier in 't voorbygaan aanmerken, verstaat men eene nedervalling, platdrukking, of ineenpersing van de saamenstellende Deelen deezes Ingewands, gepaart met eene geschonden veerkragt zyner Vezelen.

§ 160.

Wat betreft de behandeling der Hoofdwonden; deeze is in verscheiden gevallen verschillend, en kan tot geene algemeene Regelen gebragt worden. De volgende byzonderheden koomen hier omtrent voornaamlyk in aanmerking.

§ 161.

In de eenvoudige gestooken, gesneden, en gehouwen Wonden der algemeene Bekleedzelen, der Peeskalot, en van het Panylies, hebbenwe reeds te vooren gezegt, dat dezelfde behandeling moest plaats grypen, als in de overéénkomstige Wonden der Bekleedzelen en Peesägtige Uitbreidingen van andere Deelen. Misfchien egter, zal het niet onnut zyn hier by te voegen, dat men in de gestooken Wonden deezzer Deelen, welke het gebruik van een uitdryvend Verband niet

toelaa-

toelaaten, zoo draa maar eenige spanning in den Omtrek bespeurd wordt, de Wond door insnyding moet verwyden, om alle verzaamling van Vogten te voorkomen. Dat men ook, ter verééniging van gesneden en gehouwen Wonden, zig alleen van de drooge Hegting, en het veréénigend Verband bedienen moet, is eene andere Aanmerking, niet minder noodzaaklyk dan de vorige.

§ 162.

De gekneusde en geschooten Wonden deezer zelfde Deelen, vooräl ter plaatse der Slaap-Spieren, behooren zoo haast immer mooglyk is, met het Mes verwyd te worden, terwyl men tevens gebruik maakt van ontlastende, verkoelende, en Pynstillende Hulpmiddelen. De opvolging van Toevallen naamlyk is hier zee-ker, en het is van vooren beschouwd, onbepaalbaar, tot welk eenen graad de- zelve zullen opklimmen.

§ 163.

In de oppervlakkige, en diepe Insnydingen van het Bekkeneel, wanneer de- zelve niet verzeld zyn van eenige innerlyke Toevallen, moet men de behande- ling volgen der Eenvoudige Wonden: dat is te zeggen, men moet van den be- ginne af, den weg inslaan van Verééniging, en de Wond droog, spoedig, en zeldzaam verbinden. Dit laatste voorschrift is van veel aanbelang, en moet men tegelyk betrekken tot allerlye Beenwonden.

§ 164.

De Doorsnede der Hersfenpan, is altoos verzeld van Uitstorting, en niet ge- neesbaar dan door de Panboor, om datze geene vreije ontlasting toelaat.

§ 165.

In de schuinsche Snede der Bekkeneelsbeenderen, als dezelve gering is, wor- den geene oplettenheden gevordert, verschillend van die eener eenvoudige Wond. Het is geenzints hetzelfde, wanneerze diep in de zelfstandigheid des Beens door- dringt, en een gedeelte daar van als opligt. In deeze omstandigheid naamlyk, geschied 'er veeltyds eene Uitstorting, en is men verpligt daaraan uittogt te gee- ven door de Panboor, en het opgeligte Beendeel, met eene kleine fragmentzaag, weg te neemen.

§ 166.

De geheele affnyding van een gedeelte deezer Beenderen, ondersteld altoos
E een

een evenreedig verlies der Bekleedzelen; en dus eene Wonde, die alleen door Verëtering kan geneezen worden. In dit geval gebeurt 'er doorgaans eene afschilfering van de blootliggende Oppervlakte des Beens, en moet men zig om die reeden bedienen van droogende en Balsemächtige aanlegzels. Wanneer deeze afnyding zig wat diep in de zelfstandigheid des Beens uitstrekt, gaatze meestäl gepaart met eene schudding der Hersenen, of uitstorting van bloed op het harde Hersenvlies, en moet alsdan behandeld worden, meer in overëenkomst met deeze, dan met zig zelve.

§ 167.

In de oppervlakkige Scheur der Bekkeneelsbeenderen zonder eenige byzynde Toevallen, kan het verband niet te eenvoudig zyn, en behoeft alleenlyk te bestaan uit droog Plukzel, op zyne plaats gehouden door een der meest gewoone Hoofdverbanden. In de doorgaande Scheur integendeel, die altoos verzeld wordt van Uitstorting, is het gebruik der Panboor onvermydelyk.

§ 168.

De Breuk deezer Beenderen, alsze geene ontlasting van het uitgestorte Bloed toelaat, of 'er Beensplinters by zyn, welke het harde Hersenvlies prikkelen, kan niet geholpen worden, dan door de Panbooring. Deeze Kunstbewerking daarëntegen, is onnoodig, wanneer de Breuk eene vrije ontlasting geeft, en 'er geene innerlyke Toevallen by plaats hebben.

§ 169.

De indrukking, 't zy met, 't zy zonder Breuk, eischt, als 'er toevallen eener drukking der Hersenen by zyn, de opligting van het nedergedrukte Beendeel. In het laatste geval, kan zulks beproefd worden, door de Schroefstrepiaan: in het eerste, moet het Bekkeneel in de nabyheid der indrukking doorboord, en het neêrgezonkene, door een Hefzyzer opgeheven worden. Geene Toevallen aanwezig zynde, behandeld men het geval eenvoudig, en als eene gemeene Hoofdwonde, met Beenkwetsing.

§ 170.

Gelyk de kneuzing der Bekkeneelsbeenderen, alsze eenigermaten aanzienlyk is, doorgaans gevolgt wordt van Beenbederf, moet men dezelve behandelen, overëenkomstig met deeze, ter bevordering eener noodzaaklyke afschilfering. In het *Leerstuk der Beenziekten*, zal deeze behandeling worden aangewezen.

§ 171.

§ 171.

De afwyking der Naaden, met of zonder byzynde Beenbreuk, eischt de Panboor alsze het uitgestorte Bloed geene ontlasting verleend; maar kan in het tegengestelde geval, zonder dezelve geneezen worden. Een meer dan gemeen fluitend Hoofdverband, is op het laaft der behandeling van deeze gevallen, zeer noodzaaklyk en nuttig.

§ 172.

In alle deeze Wonden zonder onderscheid, gelyk ook in die der Bedekzelen van het Bekkeneel, welke verzeld zyn van de gewoone Toevallen der Schudding, of Uitstorting, moet men zig zonder uitstel bedienen van de Aderlaating, sterke, dog niet verhittende Buikzuiveringen, dergelyke Darmspuitingen, zeer verkoelende en verdunnende Geneesmiddelen, Spaansche vliegpleisters in den Nek en aan de Beenen, en dergelyken. Het Hoofd zelve wordt intuschen omslagen met koude oplosfende Stovingen, onder welken eene sterke sinelting van het Ammoniakzout, in Azyn en Water, uitmunt. Dat men egter, in gevallen waarin de Panboor onvermydelyk is, zig niet lang met het gebruik deezer middelen moet ophouden, is iets 't welk men wel moet aanmerken.

§ 173.

Dezelfde behandeling moet plaats grypen in Hoofdwonden, welke na verloop van weinig Dagen de kenmerken aanwyzen eener Ontsteking der Hersenen. Als deeze Ontsteking overgaat tot Verëttering, kan de doorbooring des Bekkeneels, ondersteld dat de plaats der beleediging bekend is, als het eenig Hulpmiddel beschouwd worden. Men besluit tot het bestaan van het eerste geval, uit eene nevensgaande zeer zwaare Hoofdpyn, Koorts, Ylhoofdigheid, en ontstekenächtige roodheid der Oogen: van het laatste, uit het vooräfgaan deezer Toevallen, en opvolgende Huiveringen.

§ 174.

Weinig Hoofdwonden zyn niet verzeld van Bloedvliet. De eene nogthans, is zulks meerder dan de andere. De gevaarlykste van deeze zyn afhanglyk van de kwetfing der langwerpige boezem van het harde Hersfenvlies, en van die der Slaapslagäder. Het eerste geval is somwylen gered, alleen door droog Plukzel en een steunend Verband. In het laatste wordt de Bloedvliet gemaklyk te keer gegaan, door een Helper met één of meer zyner Vingeren te doen drukken op

den ftam der Slagader, terwyl de Heelmeester zelve, een Sponskegel legt op de opening van het Vat, de Wonde opvuld met fyn Haarlemmer Plukzel, dit alles bedekt met trapswyze Drukdoeken, en deezen op haare plaats bevestigt door het Knoopverband.

§ 175.

In dat foort van Hoofdwonden, waarin een gedeelte der bekleedzelen, van het Bekkeneel afgestroopt, by het Hoofd nederhangd, zonder eenige Toevallen van Schudding of Uitstorting, en, zonder kenmerk van Scheur, Breuk, of indrukking der Bekkeneelsbeenderen, afwyking der Naaden, en dergelyken; moet de gemaakte Lap, van alle onzuiverheden gereinigt, met de meest mooglyke nauwkeurigheid over het ontbloote Been uitgespreid, de nablyvende Wond met de drooge Hegting en los Plukzel voorzien, op de uitgestrektheid der Lap, genoegzaam dikke en groote Drukdoeken gelegd, en alles met een welsluitend Verband gesteund worden. De gantsche toefstel bevogtigt men van tyd tot tyd met witte Wyn, en laat dezelve zoo lang aanliggen, tot de hoeveelheid der door gedrongen Etter, ons verplicht hetzelfde te veranderen.

De Wonden van het Aangezicht.

§ 176.

*Vulnera
faciei.*

DE WONDEN VAN HET AANGEZIGT zyn betreklyk tot de Oogleden, de Oogen, de Ooren, den Neus, de Wangen, de Lippen, de Tong, en dergelyken.

§ 177.

*Vulnera
palpebra-
rum.*

DE WONDEN DER OOGLEDEN zyn, of loodregt of dwerssch, en gedeeltelyk of geheel doorgaande. Zy hangen af van fcherpe of van ftompe Werktuigen, zyn al of niet verzeld van Uitstorting van Bloed in het Vetvlies, en met of zonder kwetfing van den Oogbal. Van alle deeze verfcheidenheden is het, dat de behandeling deezer Wonden afhangt.

§ 178.

De loodlynige Wonden deezer Deelen, door een fcherp Werktuig toegebragt, en op zig zelfs bestaande, 't zy datze geheel of ten deele door derzelver zelfftandigheid heengaan, kunnen door middel der drooge Hegting, van een goed Verband onderfteund, en eene bestendige rust van het Deel, zeer gemaklyk geneezen

zen worden. Het is niet altoos hetzelfde met de doorgaande dwersche Wonden: want deeze, schoonze somwylen dus geheeld worden, eischen meermaalen de hulp der tusfchengeknoopte Hegting, die men egter hier altoos met veel behoedzaamheid moet aanleggen.

§ 179.

In dat foort deezer Wonden welk van kneuzende Werktuigen afhangt, moeten de lippen der Wond zagtelyk gesteund worden met de drooge Hegting, inmidels men tragt het uitgevaate Bloed op te losfen, door de noodige Hulpmiddelen. Dit laafte bewerkt zynde, behandeld men haar op gelyke wyze als de voorige.

§ 180.

Van welke plaatsmiddelen men ook ter oplossing van het uitgestorte Bloed, in deeze gevallen gebruik maake, moet men wel bedagt zyn, zig niet te bedienen van heete, en vooräl niet, van Balfemägtige of vette aanlegzels; vermits dezelve hier ligtelyk aanleiding geeven tot eene Roos, die het gantsche Aangezigt inneemt, en ik heb zien overslaan tot Belroos.

§ 181.

De OOGWONDEN zyn veelyds gevaarlyk, zoo wel wanneer menze beschouwd op zig zelfs, als met opzigt tot de doorgaans daarby koomende Ontfteking, of Veröttering van den Oogbal. *Vulnera ocularia.*

§ 182.

Gestooken en gefneden Wonden van den Oogbal, niet verder doorgaande dan tot in de voorfte Oogkamer, doen het waterägtig vogt uitvloeijen, maar verwekken hieröm geene Blindheid, en worden doorgaans met zeer weinig toefstel geneezen. De fluiting der Oogleden, het aanleggen van een Drukdoek in witte Wyn of Brandewyn en Water bevogtigt, en gesteund met een dubbel gevouwen smal ftrookje Linnen, dat men ter weërzyden aan de muts vast fpend, is alles wat hier toe verëifcht wordt.

§ 183.

Als deeze zelfde Wonden dieper doordringen, en het Druivenvlies, het Kristal, of Glasvogt beleedigen, verwekkenze doorgaans veelerhande nadeelige Toevallen, en wordenze niet zelden gevolgt van Blindheid. Het is hetzelfde wanneer de Oogvogten door de Wonde uitvloeijen, en de holte des Oogbals ontleedigt

wordt. In beide deeze gevallen naamlyk, kan men niets doen, dan de Toevallen zoo veel mooglyk zy, af keeren, of wegneemen, door de algemeene Midde-len, de Levenswys, en den aanleg van pynstillende, verkoelende, oplosfende, faamentrekkende, of weekmaakende Plaatsmiddelen, naa dat de nevensgaande omftandigheden zulks vorderen.

§ 184.

Gekneusde, gefcheurde, en gefchooten Wonden deezer Werktuigen, zyn ge-vaarlyker nog dan de voorige, hoe gering de Wond zelve ook fchynen mooge. Meestäl gaan dezelve gepaart met eene verzaamling van Bloed in de zogenaamde Oogkamers; fomwylen, van eene gantsche verwerring der Oogvogten; en altoos, van Ontfteking niet alleen, maar ook van Verëttering. Dezelfde behandeling die in de voorige Wonden is aangepreezen, moet ook in deeze gevolgt worden.

§ 185.

Sommige Oogwonden, befluiten eenigerhande vreemde Lighaamen in zig, welke de voornaame oorzaak zyn der nevensgaande Toevallen. Deeze derhal-ven, moet men op alle mooglyke wyzen tragten daar terftond uit te haalen, de-wyl, dit niet gefchiedende, alle andere middelen vrugtloos worden aangewend. Indien deeze vreemde Lighaamen, gedeeltens zyn van een yzeren Werktuig, en men dezelve niet op een der wyzen § 35. beschreeven, kan opruimen, moet men het voorbeeld volgen van HILDANUS, en hetzelve beproeven door den Zyl-steen.

§ 186.

*Vulnera
aurium.*

DE WONDEN DER OOREN, door fnydende Werktuigen toegebracht, ge-neezen doorgaans fpoedig, en zonder eenigen anderen toefstel, dan de drooge Hegting, alsze gering zyn; maar, zeer aanmerklyk zynde, verëisfchenze niet zelden eenige fteeken der Tuschengeknoopte. Het laafte is inzonderheid nood-zaaklyk, als byna het gantsche Buitenoor is afgefmeden, en niet dan voor een klein gedeelte, nog verëenigt blyft met de naastliggende Deelen.

§ 187.

Gekneusde Wonden deezer Deelen, verwekken dikmaalen eene aanmerklyke Ont-fteking, die zig uitbreid tot in den Gehoorweg, en by uitftek pynlyk is. In dit ge-val moet men den toevlugt neemen tot de Aderlaating, en zachte oplosfende aanlegzels.

§ 188.

§ 188.

Gefneden NEUSWONDEN, niet meer inneemende dan de algemeene Bekleed- *Vulnera*
zelen, zyn van geen het minste aanbelang, en vallen in dezelfde geneesaanwyzing *nasi.*
als die van andere Deelen. Geheel anders is het gelegen, wanneer een meer of
min aanmerklyk stuk daar van, voor het grootste gedeelte is afgesneden; want
alsdan is de drooge Hegting onbestaanbaar, en moet de tusschengeknoopte ver-
kooren worden.

§ 189.

Als een der Neusvleugels geheel is opgesneden, moet men het overëenstem-
mend Neusgat zagtelyk opvullen met een Steekwiek, ter verkreiging van een
genoegzaam steunpunt voor de drooge Hegting, welke men uitwendig aanlegt.

§ 190.

Gekneusde en geschooten Wonden van het bovenste deezes Deels, zyn by uit-
stek zorgelyk; uit hoofde niet alleen, van de daar doorgaans mede verzelde ver-
breeking der Neusbeenderen, en van een gedeelte des Zeefbeens; maar ook van
de verscheuring des Snotvlies, en eene schudding der Hersenen. Deeze Wonden
derhalven, moeten met alle mooglyke oplettenheid behandeld worden, en in
overëenkomst met de daar nevensgaande verschynselen. Een niet ongewoon ge-
volg derzelve, is eene Neusprop, en het verlies der bovenste Sponsbeenderen.

§ 191.

De WONDEN DER WANGEN, die alleen een gedeelte van de Bekleedzelen *Vulnera*
inneemen, geneezen gemaklyk, alsze door de drooge Hegting, van een welään- *buccarum.*
gelegd Verband ondersteund, voorzien worden. In de dwersche doorsnyding
deezes Deelen daarëntegen, moet men dat einde, welk naar den Liphoeck ge-
keerd is, verëenigen door de afgebrooken Hegting; om allen misstand, zoo veel
mooglyk zy, te verhoeden. Het overige der uitgestrektheid van deeze Wond,
kan insgelyks aan de drooge Hegting vertrouwd worden. Eene bestendige rust
van het gekwetste Deel, is ter nauwkeurige verëeniging deezes Wonden, by uit-
stek noodzaaklyk. Het spreken derhalven, lagchen, kauwen, en dergelyken,
moet zorgvuldig vermeid worden.

§ 192.

In Wonden van deeze soort, gepaart met eene kwetsing der STENONIAANSCHEN *Ductus*
SPEEK-

*Stenonia-
nus.*

SPEEKZELBUIS, vloeit het Speekzel, in de Oorklier afgescheiden, langs de Wangen; en kan 'er geene Geneezing verkreegen worden, ten zy men gebruik maake van eene dier behandelingen, welke wy by gelegenheid der Wangzweeren zullen voordraagen.

§ 193.

*Vulnera
labiorum.*

De loodlynige WONDEN DER LIPPEN, alszè zonder verlies zyn van zelfstandigheid, kan men door de drooge Hegting, en het verëenigend Verband, gemaklyk doen saamenheelen; maar, met verlies zynde van zelfstandigheid, schiet 'er niets over dan de omgewonden Hegting. Dwersche Lipwonden, geneezen veelal van zelve, dog eischten somwylen, door de drooge Hegting gesteund te worden.

§ 194.

*Vulnera
linguae.*

Geringe WONDEN DER TONG, kunnen met wat witte Wijn, en Roozenhoonig geneezen worden. Wanneer een gedeelte van dit Werktuig, byna geheel dwersch is doorgekliefd, moet men eenige steeken doen van de tusschengeknoopte Hegting, of de Tong steeken in het beurswys Werktuig van PIBRAC, dat van tyd tot tyd bevogtigt wordt, door iets van hetzelfde Hulpmiddel in den Mond te houden.

§ 195.

*Vulnera
menti.*

De KINWONDEN, behoorende tot den rang der gescheurde, zyn somwylen van dien aart, dat de Bekleedzelen en Spieren, van de Onderkaak afgescheiden, by wyze van een lap daarby nederhangen. Welk eene afgryslyke vertooning dusdanig eene Wonde ook maaken mooge, kan menze nogthans verëenigen door de drooge Hegting, gesteund door eenige opgelegde Drukdoeken, en den Kinband. Eenvoudige gesneden Wonden van dit Deel, worden op dezelfde wyze behandeld, en geneezen.

§ 196.

Wanneer een gedeelte der Onderlip, tegelyk met de Bekleedzelen van de Kin, een en dezelfde lap maaken, is de drooge Hegting alleen niet bestaanbaar, en moeten 'er twee steeken gedaan worden met de Tusschengeknoopte; één naamlyk aan ieder bovenhoek van den Lap, zoo na mooglyk by het roode van de Onderlip.

§ 197.

§ 197.

De slagaderlyke kwetsingen van het Aangezicht, zyn zeldzaam gevaarlyk; uit hoofde inzonderheid van de geringe middenlyn der vaten, en om datze meest alle vatbaar zyn voor drukking. De Slagaderlyke Neusbloeding egter, gelyk ook de Bloedstorting, afhanglyk van geöpende Tongslagaders, zyn veelal van dien aart, datze alle oplettenheid verdienen van den Heelmeester. Koude inspuitingen met de overgehaalde Brandewyn of Terpentyngeest, zyn in het eerste, en de aanleg van het Brandyzer, in het laatste geval, de voornaamste Hulpmiddelen.

§ 198.

Eene zeer goede manier, om de allersterktste Neusbloedingen te keer te gaan, is deeze. Men brengt een gewoon Waschkaarsje, aan welks eene einde een lange gewaschte zyden draad van genoegzaame sterkte, gehegt is, door de bloedende Neusholte, tot agter het slap hangend Verhemelte; haalt het einde dat zig aldaar vertoond, met den Vinger, of een Tang, door den Mond naar buiten, zoo dat het geheele kaarsje volge, en men de draad die daar aan gehegt is, kan los maaken. Men doet vervolgens de draad deezen zelfden weg volgen, tot dezelve, ter lengte voor het minst van 12 Duimen, buiten den Mond hangt. Ter deezer plaatse, dat is op de 11 of 12 Duim, verëenigt men met deeze, het midden van eenige Plukzeldraaden, welke de lengte hebben van omtrent 3 Duimen, en, byeen gevoegd zynde, zoo dik zyn als een Penneschaft. Deezen, door aan het einde des draads dat buiten den Neus uithangt te trekken, tot in de agterste opening der Neusholte gebragt zynde, vult men de voorste opening deezer zelfde holte, wel styf op, met een dikke dog korte Steekwiek, en verzeekerd de beide einden van den draad, na dezelve alvorens byeen gevoegd te hebben, op de nabuurige Wang, door een Kleefpleister. Wannecr de bloeding eenige Dagen is gestempt geweest, en het voorste Plukzel, door een uitsypelend Vogt, of Etter, los gemaakt wordt, doet men eerst dit naar buiten gaan, en haalt vervolgens het agterste, tegelyk met den gantschen draad, door den Mond buitenwaards.

De Halswonden.

§ 199.

De HALSWONDEN bepaalen zig alleen by de algemeene Bekleedzelen, of dringen door tot in de Spieren, de Lugtpyp, het Strottenhoofd, het Hoofd des *Vulnera Colli.*
F Slok-

Slokdarms, de uit- en inwendige Halsvaten, en dergelyken. Dit verschil, regeld het verschillend gewigt deezer Wonden; en maakt dat sommige gering, andere gevaarlyk, en sommige volstrekt doodelyk zyn.

§ 200.

De Wonden der algemeene Bekleedzelen van dit Deel, gelyk ook die der Spieren, zyn van niet veel aanbelang, en worden op dezelfde wyze, als de eenvoudige Wonden van andere Deelen geneezen. Wanneer nogthans één of meer Spieren dwersch zyn afgesneden, verëischt zulks eene byzondere oplettenheid in de Verbanden, als welke dus moeten ingerigt worden, dat de einden der doorgesneden Spieren elkander onmiddelyk kunnen aanraaken, opdat het Hoofd niet naar de tegengestelde zyde overhelle.

§ 201.

*Vulnera
tracheæ.*

De WONDEN DER LUCHTPYP, zyn of langwerpige, of dwersche. De laatste doorsnyden dezelve, ten deele, of geheel.

In het eerste geval is de geneezing niet zeer bezwaarlyk, en wordt door den aanleg van droog Plukzel, en het verëenigend Verband voltrokken.

In het tweede geval, voorziet men in de afwyking van de lippen der Wond, door de drooge Hegting niet alleen, maar ook door den verëenigten band der dwersche Halswonden, terwyl de Wond zelve gedekt wordt met droog Plukzel.

Het laatste geval is doodelyk, en erkend geenerhande Hulpmiddel.

§ 202.

*Vulnera
Oesophagi.*

De WONDEN VAN DEN SLOKDARM, bestaan zeldzaam op zig zelve, maar zyn doorgaans verzeld van de geheele doorsnyding der Lugtpyp, en zyn in dit geval doodelyk. Gestookten Wonden egter, aan de linker zyde van den Hals, kunnen de Lugtpyp onbeschadigt laten, en niettemin doordringen tot in den Slokdarm. Deeze Wonden kunnen door een streng vasten, en een houdend Verband geneezen worden.

§ 203.

*Vulnera
Laryngis.*

De WONDEN VAN HET STROTTENHOOFD, zyn in hetzelfde geval als die der Lugtpyp, en moeten op dezelfde wyze beoordeeld, op dezelfde manier behandeld worden.

§ 204.

§ 204.

In de WONDEN VAN HET HOOFD DES SLOKDARMS, zonder kwetsing van het Strottenhoofd, moet dezelfde behandeling plaats grijpen, als in de dwersche Wonden der Lugtpyp, met byvoeging slegts van een streng vasten.

*Vulnera
pharyngis.*

§ 205.

De WONDEN DER UITWENDIGE HALSVATEN zyn geneesbaar, door dien derzelver bloeding kan gestemp worden. Die der Slagäderen egter, zyn veel moeilyker te behandelen dan die der Aderen, en eischen somwylen, schoon niet altoos, de Onderschepping.

*Vulnera
vasorum
jugulari-
um exter-
norum.*

§ 206.

Wat betreft de WONDEN DER INWENDIGE HALSVATEN; deeze zyn, met betrekking tot de Slagäderen doodelyk, maar ten opsigte der Aderen, geneesbaar. Om de bloeding tegen te gaan deezer laatste, brengt men tegen de opening van het Vat, een Sponskegel, vult de Wond op met fyn Plukzel, bedekt dezelve voor het minst ter hoogte van 4 Duimen, met trapswyze Drukdoeken, en ondersteund alles met het Verband van DEIDIER, of eenig ander, op gelyke wyze werkende.

*Vulnera
vasorum
jugulari-
um inter-
norum.*

In de kwetsing der Uitwendige Halsslagader, en in 't algemeen, in alle Slagaderlyke Bloedingen welke aan den Hals voorvallen, kan men zig met veel vrugt bedienen van deezen zelfden toefstel.

§ 207.

Geschooten Wonden van het voorste gedeelte des Hals, neemen somwylen een meer of min aanmerklyk stuk weg van de overëenstemmende Oppervlakte der Lugtpyp. In dit geval, moet na het scheiden der korst, de Wond door drooge Verbanden, zoo ver zülks mooglyk is, geheeld, en het overblyvende, met het een of ander daar toe uitgedagt Werktuig, bestendig, en nauwkeurig gedeckt worden.

§ 208.

In alle andere Halswonden door Schietgeweer toegebracht, kan men niets uirigten, dan de Toevallen afweeren, of weg neemen, door de algemeene middelen, en weckmaakende aanlegzels. Het overige moet aan de Natuur bevoelen worden.

De Borstwonden.

§ 209.

*Vulnera
thoracis.*

De BORSTWONDEN neemen alleen de uiterlyke Deelen in, of dringen door tot in de Borstholte. De eerste sluiten niets byzonders in zig, en worden op de wyze der eenvoudige Wonden geneezen. Eene verkeerde of onoplettende behandeling egter, doet sommige deezer Wonden ontaarten in Pypzweeren, die alsdan zeer moeilyk geheeld worden.

§ 210.

*Vulnera
thoracis
penetrantia.*

De DOORGAANDE BORSTWONDEN zyn met of zonder kwetfing der Ingewanden; met of zonder uitstorting van Bloed in de Borstholte; en met of zonder verbreeking der Beenderen, welke dit Deel van rondsömme influiten.

§ 211.

By deeze Wonden kan men fomwylen met eene buigzaame Sonde, een verwydend Kaarsje, of het inspuiten van lauw Water, den doorgang ontdekken. Als de uiterlyke Wond klein is, verscheint 'er in den omtrek een Lugtgezwel, dat zig van tyd tot tyd verder uitbreid. Wanneerze groot is, wordt de vlam eener Kaars, voor de Wond gehouden, door de uit- en ingaande Lugt, by beurtwisseling, dan gints, dan herwaarts bewoogen.

§ 212.

Geene deezer Hulpmiddelen, geene deezer verschynfelen, egter, beslissen altoos met zekerheid, dat zulk eene Wonde doorgaat, of niet. Somwylen naamlyk, kan men by eene doorgaande Wonde, op geen der eerst beschreeven wyzen, den doorgang ontdekken; om dat de ingang der Wonde niet beïntwoord aan haare binnenste opening, door het verplaatzen der Spiervezelen welke het kwetsend Werktuig doorboord heeft. Een Lugtgezwel daarënboven, kan van geheel andere Oorzaaken afhangen, en is meermaalen het enkel gevolg geweest van een Pleister verband, met eene holle hand aangelegt. De beurtwisselende beweeging van de vlam eener Kaars eindelyk, wordt zelfs in het onderstelde geval niet altoos waargenoomen; zoo uit hoofde eener voorgemelde Spierverplaatzing, als om dat de Wond kan opgevuld zyn met Bloedklonters, of de ongekwetste Long, in den omtrek der Wond, aan het Borstvlies is vastgegroeid. Gelukkig is het

het in deeze omftandigheden, dat de kennis der enkele doorgang eener Borstwonde, van weinig belang is voor den Heelmeester, daarze uit dien hoofde alleenlyk, nimmer eenig gevaar influiten.

§ 213.

De kwetfing der Ingewanden, blykt uit de bekende diepte der Wonde; de hoedaanigheid van het uitvloeiend Vogt; de Natuur der verhinderde Werkingen; en de kenmerken eener innerlyke Ontfteking. Welk Deel intusfchen meer byzonderlyk beleedigt is, wordt uit de plaatzing der Wonde, derzelve rigtlyn, de hoedaanigheid van het uitvloeiend Vogt, en vooräl uit den aart der byzynde Toevallen afgeleid. Dus kend men by voorbeeld, eene kwetfing der Longen, aan eene zeer moeilyke, en als verftikkende Ademhaaling, gepaart met den uitvloed, of fpuwing, van een helder rood, en zeer fchuimend Bloed; die der groote Bloedvaten, aan eene afgebrooken Pols, koud Zweet, bleeke kleur, benauwdheid en flauwten; de Wonden van het Hart, aan dezelfde kenmerken, en meestäl eenen zeer fchielyken Dood; en die eindelyk van het Middenrif, aan eene korte, moeilyke, en zeer pynlyke Ademhaaling, eene Sardonifche Lagh, en dergelyken.

§ 214.

De tegenwoordigheid van eenig uitgestort Vogt in de Borstholte, kend men vooräl, uit de beweezen kwetfing van eenige Bloedvaten of Ingewanden; uit de uitvloeiing van eenigerhande Vogt door de Wond, by de inädeming; uit het gevoel eener drukkende Pyn in het Middenrif, als het Lighaam zig bevind in eenen opgerigten ftand; uit eene zeer moeilyke Ademhaaling; gelyk ook, uit de gedeeltelyke of geheele onmooglykheid om op de gezonde zyde te liggen; uit een bepaalde uitzetting der Borstholte aan de beleedigde zyde; en uit de voorwaards kromming van het Lighaam, in eenen ftanden of zittenden ftand.

§ 215.

Alle doorgaande Borstwonden, zyn gewigtig genoeg om alle onze oplettenheid te verdienen; dog inzonderheid zy, welke met Uitftorting, of eene kwetfing der Ingewanden gepaart gaan.

§ 216.

Wanneer het Middenshot, of de beide zyden der Borst, tegelyk doorboord

zyn, en de Wond grooter is dan de Strotspleet, volgt de Dood in zeer weinig oogenblikken, wanneer niet eene zeer spoedige hulp die afweerd.

§ 217.

Wonden die tot in de holligheden van het Hart doorgaan; dezulke, die of de groote Bloedvaten, of de Borstbuis inneemen; Longwonden met afsnyding van derzelver voornaamste Vaten; aanmerklyke kwetsingen van het Peesächtig Deel des Middenrifts; de afsnyding eindelyk der Zenuwen, welke naar dit Deel toegaan; moeten alle, als volstrekt Doodelyk beschouwd worden.

§ 218.

Zeer kleine Wonden van het Hart, van het spierächtig gedeelte des Middenrifts, en der Longen, zyn alle gevaarlyk, of worden ten minsten niet dan zeer zeldzaam geneezen, zonder eenig nablyvend ongemak. Hetzelfde is waar van de Wonden des Hartenzakje.

§ 219.

Doorgaande Borstwonden, waar by slegts eene geringe Uitstorting plaats heeft, moeten noch verwyd, noch opgevuld, maar met een droog en vlak Verband behandeld worden. Intusfchen tragt men het uitgevaate Bloed te doen opneemen, door herhaalde Aderlaatingen, Buikzuiveringen, verdunnende Geneesmiddelen, en dergelyken. De verwisfelingen van het Verband in dit geval, moeten zeer zeldzaam zyn, en geschieden met alle mooglyke vaardigheid. By elk derzelver, doet men den Lyder fterk inädemen, zoo ter ontlasting van het uitgestorte, als om het indringen der Buitenlugt te verhinderen.

§ 220.

Wanneer deeze zelfde Wonden, van eene groote uitstorting verzeld zyn, en de Natuur, het buitengevaate uitwerpt door de Lugtpyp, den Stoelgang, of de Piswegen; moeten deeze ontlastingen, op alle mooglyke wyzen, door een Geneeskundig beftier begunftigt worden.

§ 221.

Blyft de Natuur in dit laafte geval in gebreke om deeze ontlastingen te bewerken, en is de Wond te klein, of niet gunstig genoeg geplaatst, om het uitgestorte Bloed uit te werpen, moet men deeze door insnyding verwyden, of de

Ope-

Operatie doen der Etterborst. Een smal reepje Linnen, tusfchen de Lippen der Wonde, in beide deeze gevallen ingebracht, is genoeg om dezelve, zoo lang noodig is, open te houden; en het gebruik van Steekwieken en Canullen fchadelijk. Het beftendig liggen op de beleedigde zyde, bevordert heel zeer de ontlasting.

§ 222.

Wanneer het Bloed, door de Wond uitvloeijende, eene kwaade reuk heeft, en de Werktuigen des Heelmeesters aangrypt, is zulks een teken van verfterving, en de Dood des Lyders aanftaande.

§ 223.

Als Borstwonden verzeld gaan van eene kwetfing der Tufchenribbige Slagader, moet de Bloedvliet, hier van afhanglyk, gefluit worden door een Sponskegel, waar aan een fterke gewaschte draad is vastgemaakt, te brengen tegen de opening van het Vat, en deeze op zyne plaats te bevestigen, door het gebruik van het Druktuig des Heeren LOTTERY, fttaande het verloop van 24 Uuren.

§ 224.

Het gewoon Verband in alle deeze gevallen, is het *Verband des Ligbaams*, met den *Schouderband*, aangelegt over één of meer Drukdoeken.

§ 225.

Eene aanmerking van veel belang ten opzigte der Borstwonden is, dat een ftekend Werktuig byna dwersch boven een der Sleutelbeenderen ingedreeven, de Long kan kwetfen; en, indien zulks gefchied in de nabyheid der onderfte Rugwervelen, 'er eene beleediging der Nieren kan plaats grypen. Het eerfte geval wordt gekend uit de gewoone tekenen der Longwonden; het laafte inzonderheid, uit eene byzynde Bloedwatering.

De Buikwonden.

§ 226.

DE BUIKWONDEN bepaalen zig by de algemeene bekleedzelen en de Buikspieren, of dringen door tot in de holte van dit Ligbaamsdeel. De laafte zyn *Vulnera abdominis.* met of zonder uitftorting van Bloed in deeze holte; met of zonder uitvalling, en kwet-

kwetsing der Ingewanden; en met, of zonder beklemming en versterking van het uitgevallene, binnen de lippen der Wonde.

§ 227.

*Vulnera
abdominis
inpen-
etrantia.*

NIEF DOORGAANDE BUIKWONDEN zyn in hetzelfde geval als de eenvoudige Wonden van andere Deelen; en moeten, alsze naar de lengte van het Lighaam zig uitstrekken, door de drooge Hegting, en het verëenigend Verband; maar dwersch zynde, door deeze zelfde Hegting, en de geboogen ligging van het Lighaam, ten spoedigsten verëenigd worden.

§ 228.

Wonden egter van deeze soort, door een stekend Werktuig toegebracht, ter plaatze waar zig eenig peesächtig Uitbreidzel bevind, en vooräl in de uitgestrektheid der regte Buikspieren, moet men altoorens door insnyding verwyden, en alsdan kunnenze op gelyke wyze behandeld worden als de voorige. De Toevallen, welke deeze Wonden uit hoofde van eenig opgeslooten Vogt doorgaans opvolgen, maakt zulk eene verwyding noodzaaklyk.

§ 229.

*Vulnera
abdominis
pene-
trantia.*

DOORGAANDE BUIKWONDEN, niet verzeld van uitstorting, of, van eene kwetsing en uitvalling der Ingewanden, zyn veeläl voor dezelfde geneeswys vatbaar, maar moeten somwylen door de Buikhegting verëenigd worden.

§ 230.

Wanneer by deeze Wonden, eene uitstorting van Bloed in de Buiksholte plaats heeft, kan men wel op dezelfde wyze te werk gaan, maar moet men agt geeven, dat 'er aan den ondersten hoek der Wonde, eene opening overblyve, door dewelke het uitgestorte Bloed kan uitvloeijen. De Lyder daarënboven, moet zoo veel mooglyk zy op de Wonde liggen, om de ontlasting van dit Vogt te meerder te begunstigen.

§ 231.

Men kent zulk eene uitstorting, aan de blykbaare kwetsing van eenig Bloedvat; aan de kenmerken van gekwetste Ingewanden; aan de spanning van den Buik; en het ontlasten van Bloed door de Wonde, by elke beweeging der Ademhaling.

§ 232.

§ 232.

De kwetsing der Ingewanden, als dezelve niet door de Wonde uitkoomen, wordt inzonderheid gekend uit de beleedigde Werking der Deelen in de Wond betrokken, en de hier van afhangende tegennatuurlyke verschynzelen.

§ 233.

De MAAGWONDEN veroorzaaken Benauwtheid, Walging, Bloedbraaking, bloedige Afgangen, de Hik, Bleekheid, uitwendige Koude, inwendige Hitte, en eene ontlasting der genoomen Voedzelen door de Wonde. Deeze verschynzelen derhalven zyn de kenmerken der Maagwonden, by welke nog kunnen gevoegt worden, de plaats en loopstreek der Wonde zelfs, vergeleeken met de natuurlyke ligging van dit Ingewand, en deszelfs van elders bekende opvulling, of leedigheid.

*Vulnera
ventriculi.*

§ 234.

In de KWETSING DER DUNNE DARMEN, vind men meestäl dezelfde Toevallen. Uit deeze Wonden egter vloeid geen onveränderd Voedzel, maar eene meer of min volmaakte Chyl naar buiten. Men kan hetzelfde zeggen van die der dikke Darmen, hoewel alle verschynzelen, hier in eenen minderen graad plaats grypen.

*Vulnera
intestino-
rum tenui-
um.*

§ 235.

De Wonden der Lever, Milt, Nieren, Gal- en Pisblaas, die van het Al-vleesch, der Pisleiders, en groote Bloedvaten, kend men inzonderheid uit den aart van het Vogt, 't welk door de Wonde uitvloeit, vergeleeken met de plaats en bekende strekking der Wonde. In de Wonden der Nieren daarënboven, der Pisleiders, en der Pisblaas, moet men de bloederige Pis, door de natuurlyke wegen ontlast, als een ander kenteken aanmerken.

§ 236.

De kwetsing der inwendige groote Bloedvaten van de Maag, Darmen, Lever, Milt, Nieren, en dergelyken, zyn doodelyk. Men moet hetzelfde vaststellen van groote Maagwonden, gemaakt op eene plaats, waar de hand des Heelmeesters niet kan bykoomen, en van meer anderen.

§ 237.

De behandeling deezer Buikwonden, is naar het verschil derzelver verscheiden, en kan tot geene algemeene Regelen gebragt worden. De volgende byzonderheden moeten hierömtrent plaats hebben.

§ 238.

Als een gedeelte des Darmbuis, en van het Net, door de Wonde is uitgeweeken, en noch het eene, noch het andere ontaart is, spreid men een Drukdoek, in warme witte Wyn bevogtigt, over het Net, en doet dit, door een Helper een weinig terug houden, na dat men het alvorens, zoo veel mooglyk zy, zagtelyk ontwikkelt heeft. Men brengt vervolgens de Darmen, even dus ontwikkelt, met alle behoedzaamheid, door eene beurtwisselende drukking der beide Wysvingers, welkers Nagels wel zyn afgekort, binnenwaarts, en voltooid alles met de inbrenging van het Net. By deeze bewerking egter, moet men de holte van den Buik wel onderscheiden van de afwyking der Peesägtige Uitbreidzels van de Buikspieren, welke in het geval van Buikwonden somwylen plaats heeft, op dat men deeze niet aanzie voor gene, en de uitgeweeken Ingewanden, daarin brenge.

§ 239.

Wanneer het Net ligtelyk gekwetst is, moet men hetzelfde terstond, en ongeagt deeze kwetsing inbrengen. Is de kwetsing van meer aanbelang, en gepaart met de opening van eenig aanmerklyk Bloedvat, zoo behoort men dit te onderscheppen voor- en alëer de binnenbrenging van het Net beproefd wordt.

§ 240.

Kleine Wonden van den Darmbuis, beletten niet, dat het uitgeweeken gedeelte terstond wordt ingebragt. Als de Wond integendeel groot is, moet dezelve alvorens door de Peltershegting, of de Hegting met een handvatzel verëenigd worden.

§ 241.

Als het uitgevallen Net, binnen de Lippen der Wonde geklemd geweest zynde, verstorven is, moet men het verstorvene in de nabyheid van het gezonde, affnyden, hetzelfde alvorens een weinig hebbende uitgespreid, om de beleediging te verhoeden van andere Deelen, welke tegelyk mogten zyn uitgevallen. Eer
men

men in dit geval, het gezonde gedeelte van het Net inbrengt, moet men de verstorven rand bestryken met den Terpentyn geest, ten einde deszelfs afscheiding, zoo veel mooglyk zy, te begunstigen.

§ 242.

In eene gedeeltelyke Verfterving van den Darmbuis, wordt het verstorvene, als het eenigzints van aanbelang is, weggesneden, en de nablyvende opening voorzien met een der voorgenoemde Hegtingen. Neemt de verfterving den gantschen omtrek in van den uitgeweeken Darm, zoo moet men al het verstorvene wegneemen, en de beide einden des Darms aan elkander, of het bovenste einde, aan den rand der Buikwonde vasthegten.

§ 243.

By de kwetfing van alle andere Ingewanden, bestaat de geheele behandeling daarin, dat men de Lugt op alle mooglyke wyze afweere; eene strenge Eetregel voorschryve; en de dreigende of byzynde Toevallen, verhoede, of wegneeme. De geneezing naamlyk deezer Wonden, voor zoo veel ze vatbaar zyn voor dezelve, is inzonderheid het werk der Natuur, en erkend geen, of althans zeer weinig hulp van de Kunst.

§ 244.

Het houdend Verband van alle Buikwonden, is hetzelfde als dat der Borstwonden, en bestaat dus uit *het Verband des Ligbaams, met den Schouderband.*

De Wonden der Ledemaaten.

§ 245.

De WONDEN DER LEDEMAATEN zyn betreklyk tot de Bekleedzelen al leen, of tevens tot de Spieren, de Peezen, de Beenderen, de Zenuwen, de Bloedvaten, de Watervaten, of de Gewrigten. *Vulnera
extremi-
tatum.*

§ 246.

Veele deezer Wonden verschillen grootelyks, zoo ten opzigte van haare Natuur als Behandeling, en verdienen een weinig meer byzonder, als in de algemeene beschryving der Wonden geschied is, beschouwd te worden.

§ 247.

In eene dwersche en diepe Spierwonde, die altoos eene groote vanëenwyking der doorgesneden Vezelen veröorzaakt, moet men het Deel eene plaatsing geven, met de Werking der gekwetste Spier overeenkomstig, de Wond zelve dekken met droog Plukzel, en *het vereenigend Verband der dwersche Wonden*, aanleggen. Is deeze behandeling niet genoegzaam, en kan men hier door, de grond der Wonde niet zoo nauwkeurig aanëenvoegen als den ingang, dan moet men den toevlugt neemen tot de gepende Hegting.

§ 248.

Verscheiden Vezelen der Kuitspieren, kunnen by zekere beweegingen van een gescheurd worden, zonder dat 'er eene Wonde by is der Bekleedzelen. Men kend dit gebrek aan eene plaatslyke Pyn, groote moeilykheid om zig over eind te houden, en byzynde Bloedvlek, die egter niet altoos aanwezig is. Het wordt geneezen door de Aderlaating, de geboogen ligging van het Deel, en den aanleg van oplosfende Stovingen.

§ 249.

De Pees van ACHILLES, ondergaat somwylen eene gelyke verbreeking zyner faamenstellende Vezelen, als de Kuitspieren; en deeze verbreeking, is of gedeeltelyk, of geheel. In beide gevallen wordt het gebrek gekend aan een evenreedig verminderd vermoogen om de Voet te kunnen uitstrekken, eene plaatslyke Pyn, en eene ledige ruimte ter plaatse der beleediging. Het *Verband van PETIT*, de *Muil van MONRO*, de rust van het Deel, en het gebruik van oplosfende Stovingen, zyn in deeze gevallen, de voornaame Hulpmiddelen.

§ 250.

Als deeze verbreeking gepaart gaat, met eene Wonde der Bekleedzelen, moet dezelfde behandeling plaats grypen, en de Wond zelve gedekt worden met Plukzel, doordrongen met eenig Balsemägtig Hulpmiddel.

§ 251.

De Band der Knieschyf, hoe sterk dezelve ook zyn mooge, is voor eene gelyke verbreeking vatbaar. Eene ledige ruimte op de plaats der vanëenscheuring, de opklimming der Knieschyf, en de belemmerde uitstrekking van het Been, zyn in dit

dit geval, de gewoone kenmerken. De geneezing wordt verkreegen, door het Been bestendig te houden in eenen staat van uitstrekking, en de oplossing der uitstorting, welke veelmaalen daarby plaats heeft.

§ 252.

De WONDEN DER GEWRIGTEN, door scherpe Werktuigen toegebracht, eischen inzonderheid de rust van het beleedigd Deel, het gebruik der algemeene Geneesmiddelen, Balsemagtige aanlegzels, en eene, zoo veel mooglyk is, zeldzaame verbinding. *Vulnera articulo- rum.*

§ 253.

Geschooten of gescheurde Wonden deezer Deelen, welke by uitstek gevaarlyk zyn, moeten aanstonds, zoo veel het saamenstel des Deels zulks toelaat, met het Mes verwyd worden. De overige behandeling verschilt niet van het gene omtrent deeze Wonden in het algemeen is aangemerkt. Als deeze Wonden, het meeste gedeelte van een Gewrigt inneemen, eischenze niet zelden eene spoedige Afzetting.

§ 254.

Eenig gedeelte der Ledemaaten, door een houwend en zeer scherp Werktuig, byna geheel afgesneden, maar deszelfs voornaame Bloedvaten onbeschadigt zynde, moet niet terstond weggenoomen, maar met een behoorlyk Verband voorzien worden. Men heeft naamlyk voorbeelden, dat zoodaanige Wonden geneezen zyn, zonder eenig toeval, en zelfs met behoud, indien niet van alle, ten minsten van zeer veele Beweegingen.

§ 255.

Beantwoord deeze behandeling niet aan het oogmerk, of is een voornaam Deel zoo verre afgesneden dat 'er slegts een gedeelte der Bekleedzelen overblyft, dan moet men hetzelfde terstond geheel wegneemen, en de nablyvende Wond, als die der stomp van een afgezet Deel behandelen.

§ 256.

Wonden van deeze soort, afhanglyk van Schietgeweer, hoe gunstig dezelve in den eersten tyd ook moogen toefchynen, vorderen, met opzigt tot de voornaamste gedeelten der Ledemaaten, byna altoos de Afzetting; maar kunnen, ten aanzien der ondergeschikte Deelen, zonder deeze, somwylen geneezen worden.

52 HEDENDAAGSCHE ALGEMEENE OEFFENENDE HEELKUNDE.

Insnydingen, van stee tot stee gedaan in den omtrek van den Stomp, ter ontspanning der Bekleedzelen; zeer zagte balsemagtige aanlegzels op de vlakke van deeze; weekmaakende en verzagtende Stovingen, gelegd langs de gantsche uitgestrektheid van het overgebleeven Deel; en het gebruik van ontlastende, verkoelende, en pynstillende Hulpmiddelen, ter afweering of wegneeming van Toevallen; zyn in alle geneesbaare gevallen van deezen aart, onvermydelyk.



HEDENDAAGSCHE
ALGEMEENE OEFFENENDE
HEELKUNDE.

TWEEDE LEERSTUK

VERHANDELING
DER
ZWEERE N.

I N H O U D.

1 HOOFDDEEL. *De Zweeren in het algemeen.*

2 HOOFDDEEL. *De Zweeren in het byzonder.*

1 LID. *De gemeene beschryving der Zweeren.*

De eenvoudige Zweer.

— *spekkige Zweer.*

— *eeltägtige Zweer.*

— *drooge Zweer.*

— *vloeiende Zweer.*

— *rotte Zweer.*

— *voortknagende Zweer.*

— *holle Zweer.*

— *Pypzweer.*

— *scheurbuikige Zweer.*

— *kropzeerige Zweer.*

— *pokkige Zweer.*

— *kankerägtige Zweer.*

— *Wormzweeren.*

— *Zweer met Beenbederf.*

— — met sponsächtig *Vleesch.*

— — die in schyn gering, maar moeilyk te geneezen is.

— — met eenig ingeslooten vreemd *Lighaam.*

2 LID. *De byzondere beschryving der Zweeren.*

De Zweeren van het Hoofd.

— — — *den Hals.*

— — — *de Börst.*

— — — *den Buik.*

— — — *den omtrek des Bekkens.*

— — — *der Ledemaaten.*

3 HOOFDDEEL. *De Brandingen.*

HEDENDAAGSCHE

ALGEMEENE OEFFENENDE

HEELKUNDE.



TWEEDE LEERSTUK.

VERHANDELING DER ZWEEREN.

I. HOOFDDEEL.

De Zweeren in het Algemeen.

§ 257.

Een ZWEER, is eene scheiding des geheels in de zachte Deelen, met verlies van Zelfstandigheid, en uitvloeiing van Etter, of van eenig Etterächtig vogt. *Ulcus.*

§ 258.

Niet meer dan twee foorten van Zweeren zijn 'er, de goedäartige naamlyk, en de kwaadäartige. Ik zal de eerste den naam geeven van *Eenvoudige*, de laatste van *Saamengestelde*.

§ 259.

EENVOUDIG wordt een Zweer genoemd, alsze een goede grond heeft, welgestelde Etter voortbrengt, en zonder veel toefstel; op eene Eenvoudige wyze kan geneezen worden. *Ulcus simplex.*

H

§ 260.

§ 260.

De *grond der Zweer* zegt men goed te zyn, alsze gelykelyk verheeven, vast, niet glanzig, onpynlyk, en van eene bleek-roode kleur is.

§ 261.

Pus. De ETTER is welgesteld, wanneerze wit is, eene gematigde dikte heeft, geenerlye vreemde zelfstandigheden daarin gezien worden, en, of geheel reukloos, of ten minsten zonder stank is.

§ 262.

*Ulcus
Compositum.*

Een SAAMENGESTELDE ZWEER is, welke, of zeer bezwaarlyk, of geheel niet kan geneezen worden; 't zy uit hoofde eener ongesteltheid der Vogten, 't zy om eenigerhande plaatslyke wanördes. Dit soort van Zweeren, zyn niet zelden schandvlekken der Heelkunde, en weêrstreeven veelmaalen, alle poogingen des Heelmeesters.

§ 263.

Soorten deezer Zweeren zyn, de Spekkige, de Eeltägtige, de drooge, de vloeijende, de rotte, de voortknagende, de Holle, de Pypägtige, de Aderspat-tige, de Scheurbuikige, de Kropzeerige, de Pokkige, de Kankerägtige, en de Wormzweeren. De zweeren met Beenbederf, met Sponsächtig Vleesch, met ingeslooten vreemde Lighaamen, en dergelyken; gelyk ook dezulke, welke in schyn goedäartig, maar niettemin moeilyk geneezen worden, behooren insgelyks tot dezelfen.

§ 264.

Sommige deezer Zweeren ziet men, dat saamengesteld zyn uit hoofde eener nevensgaande Kwaadsappigheid, van dewelke zy, als van eene Oorzaak afhangen: andere, uit aanmerking van haare byzondere hoedaanigheden; en veele, uit kragt van eenigerlye plaatslyke wanördes.

§ 265.

De Zweeren, tot welk eene soort zy ook behooren, worden veröorzaakt door eene vooräfgaande Wonde of Ettergezwel, of door de werking van eenigerhande Scherppte, van buiten aangebragt, of in de Vogten huisvestende.

§ 266.

§ 266.

De kenmerken deezer Gebreken, zyn of algemeene, of byzondere. De eerste zyn uit de gegeeven Bepaaling blykbaar: de laatste verschillen, naar het verschil zelve der Zweeren, zoo even aangemerkt.

§ 267.

Het is inzonderheid de tweede soort van Kenmerken, op welke den Heelmeester moet oplettend zyn, om dat zyne gantsche behandeling hierop berust, en hy zonder deeze, nimmer kan slaagen in de geneezing.

§ 268.

Hoewel men reden heeft, om alles goeds te hoopen in de behandeling der Zweeren, door uiterlyke oorzaaken, in jonge en gezonde Lighaamen toegebracht; is derzelver geneezing zeer moeilyk, en somwylen zelfs onmooglyk, by Bejaarden, en in het geval van Kwaadsappigheid. Het laatste kan insgelyks gezegd worden van Zweeren met Beenbederf; van dezulken, welke van eenige opgestopte natuurlyke ontlasting afhangen; gelyk ook van die genen, welke aan de Beenen van hoogbejaarde, volsappige, of Waterzugtige Menschen plaats grypen. De geneezing van deezen zelfs, de mooglykheid daar van ondersteld zynde, is veelmaalen gevaarlyk, vooräl wanneer ze langen tyd bestaan hebben, en de Natuur om zoo te spreken, daar aan gewend is.

§ 269.

De algemeene geneezing der Zweeren, bevat als zoo veele byzondere vereischten, de VERËTTERING, de ZUIVERING, de VLEESCH-GROEIJING, en de VORMING VAN HET LIDTEKEN.

Suppuratio. Purificatio. Incarnatio. Cicatrificatio.

§ 270.

Aan de eerste en laatste deezer aanwyzingen, moet in alle Zweeren zonder onderscheid voldaan worden. De tweede is alleen betreklyk tot dezulken waarin eenige onzuiverheden plaats hebben, of eenig vreemd Lighaam zig ophoud, en moet niet toepaslyk gemaakt worden op anderen. De derde aanwyzing, die van sommige geheel verworpen wordt, is opzigtelyk alleen tot de holle Zweeren,

by welkers geneezing men zeekerlyk, iets dat naar vleeschgroeiing gelykt, waarneemt.

§ 271.

Hoedaanig, en door welke Middelen, aan deeze verëischten voldaan wordt, is het hier de plaats niet om van te spreken, daar het zeeker is, dat elk byzonder geval zyne byzonderheden insluit, en niet op eene zelfde wyze kan geneezen worden. De volgende Afdeeling, welke de byzondere beschryving der Zweeren insluit, zal ten aanzien van dit Onderwerp, alle noodige onderrigtingen geeven.

II. H O O F T D E E L.

De Zweeren in het byzonder.

§ 272.

De meeste der Zweeren, in de voorgaande Afdeeling opgeteld, vertoonenzig onverschillig op alle plaatsen van het Lighaam; andere bepaalen zig meer byzonder tot deeze of geene Deelen, en bieden, hoe overëenkomstig in sommige opzigten met de eersten, verschynzelen aan, welke zoo in haare beoordeeling als behandeling, alle onze oplettenheid vorderen.

Dit laatste verplicht ons, om dit Hooftdeel te splitsen in twee Leden, en elk derzelve in zoo veele Onderdeelingen, als met het getal zelve der Zweeren, overëenkomt.

In het *eerste* Lid, zal ik de Zweeren beschouwen, voor zoo veelze gemeen zyn aan alle, en in het *tweede*, voor zoo veel ze eigen zyn aan zekere Deelen. Ik zal het eerste den naam geeven van *gemeene*, het laatste, dien van *byzondere*. *Beschryving der Zweeren.*

E E R S T E L I D.

De gemeene Beschryving der ZWEEREN.

De eenvoudige Zweer.

§ 273.

*Ulcus
simplex.*

De EENVOUDIGE ZWEER, § 259. bepaald, is het gewoon gevolg eener eenvoudige Wonde, of van een eenvoudig Ettergezwel, door de

de Natuur of Konst geöpent, en niet verzeld van eenige toevallige omstandigheden.

§ 274.

De grond van zulk eene zweer, is of al, of niet, gelyk met de oppervlakte van de Huid des omtreks. In het laatste geval, maaktze of eene ondiepe holte beneden, of eene ligte verhevenheid boven deeze. Alle deeze veranderingen, hoe gering dezelve ook schynen moogen, hebben eenen zeer grooten invloed op hare behandeling, en moeten zorgvuldig in agt genoomen worden van den Heelmeester.

§ 275.

Als de grond der Zweer gelyk is met de buitenste oppervlakte van het Huidweeffel, kan men de geneezing verkrygen, alleen door den aanleg van droog Plukzel, van Plukzel met een faamenttrekkend Vogt doordrongen, en gedroogd; gelyk ook, van veelerhande zoogenaamde velmaakende Zalven, en Pleisters, door een welsluitend Verband bevestigd.

§ 276.

Wanneer de randen der Zweer, meer of min boven den grond verheeven zyn, en de Zweer derhalven eenigzints hol is, bediend men zig van Balfemächtige Hulpmiddelen, om de werking der Natuur, in het opvullen der holte, eenigzints tegemoet te koomen. Een der beste van deeze Hulpmiddelen, door my immer beproefd, is de *Edenburger Wondbalfem*, en kan ik deeze nauwlyks genoeg aanprijzen.

§ 277.

In Zweeren van deeze soort, welkers grond boven de oppervlakte der Huid ligtelyk verheven is, moet men dat gedeelte van dien grond, 't gene de randen der Zweer onmiddelyk aanraakt, dagelyks lugtig bestryken met den *bruinen onderaardschen Steen*, en alles dekken met droog Draadplukzel, een dikke Drukdoek, en een welsluitend Windzel. Men kan ook in dit geval gebruik maaken van de gewoone *Sparadrap*, of van eenige andere, bereid inzonderheid uit faamenttrekkende, en eenigzints zwaare Heelmiddelen.

§ 278.

Eene byzonderheid van veel aanbelang, omtrent de velmaaking deezer Zweeren is, dat, schoon dezelve meestäl beginnd van den Ontrek, en zig allengskens uitbreid naar het Middenpunt, 'er egter somwylen, eerst in het midden der Zweer, verscheiden Huidstippen gemaakt worden, welke men, als zoo veele beginzelen van het Lidteken moet aanmerken. Dit dezelve doorgaans de gedaante hebben van eeltägtige Lighaamtjes, en dikmaalen verkeerdelyk als onzuiverheden behandeld worden, is iets, 't welk mischien niet onnut is, hier by te voegen.

De spekkige Zweer.

§ 279.

*Ulcus
lardosum.*

SPEKAGTIG wordt een Zweer genoemd, als derzelve grond bezet is met eene witte, taaije, en als lymägtige Zelfstandigheid, welke zig op geenerlyë wyze daar van laat afwasfchen.

§ 280.

Zulk eene Zweer, wordt het meest gezien in Kwaadsappige en waterzugtige Voorwerpen. Ze is ook het gevolg van verwaarloozing, van het aanhoudend gebruik van vette Hulpmiddelen, en van eene pokkige ongesteltheit der Vogten.

§ 281.

De geneezing deezer Zweeren, is somwylen gemaklyk, somwylen moeilyk. Het verschil der Oorzaaken van welkeze afhangen, is de voornaame reeden deezer verscheidenheid.

§ 282.

In alle Spekkige Zweeren zonder onderscheid, is de Zuivering de eerste aanwyzing ter geneezing. Deeze geschied zynde, bevind zig dezelve, ten opzigte der Heelkundige behandeling, in het geval der Eenvoudige Zweeren.

§ 283.

*Purifica-
tio Ulce-
rum.*

Door de Zuivering der Zweeren in het algemeen, verstaat men, de Wegneming van alles wat zig daar in ophoud, en de Geneezing verhinderd. In het tegen-

genwoordig geval, betekend het byzonderlyk, de opruiming van die lymige Zelfstandigheid, welke wy gezegt hebben dat de oppervlakte van den grond bedekte.

§ 284.

Een der beste Hulpmiddelen, ter bereiking van dit Oogmerk, in alle gevallen welke met geene merklyke ongesteltheit der Vogten gepaard gaan, is de *Terpen-thyn-Geest*, met Plukzel aangelegt, en overdekt met de eenvoudige Gortpap. Een stukje drooge Spons, geduurende den Tyd van 24 of 48 Uuren, op de Zweer gelegd, en als dan weggenoomen, voldoet insgelyks by Uitslek.

§ 285.

Omtrent het gebruik van het eerstgemelde Hulpmiddel moet men aanmerken, dat hetzelfde, de gezonde Huid aanraakende, ontvellingen maakt; en het om deeze reeden, met behoedzaamheid, en zoo dat het niet vloeijen kan, moet aangewend worden.

§ 286.

By Menschen die uitermaaten gevoelig zyn, en van de geringste pyn in wanorde geraaken, kan men deezen Geest voorzigtig met een pinfeel aanbrengen, of met eenige weekmaakende Zalf vermengd, toedienen. In de laatste gedaante egter, doet ze veel minder dienst, dan als ze onvermengd gebruikt wordt, wanneer ze doorgaans, in den tyd van 3, 4 of 5 Dagen, al het Spekkige wegneemt.

§ 287.

Om de hergroeiing van het onzuivere te verhoeden, en de geneezing der Zweer te voltrekken, moeten de volgende Verbanden bestaan, uit Balsemächtige, of droogende Heelmiddelen, na dat de Zweer hol, vlak, of eenigzints verheeven is.

§ 288.

In Zweeren van deeze foort, afhanglyk, of onderhouden, van eene byzynde ongesteltheit der Vogten, is niets van eenige uitwerking, ten zy men de heerschende ongesteltheit, door een overéénkomstig Geneeskundig bestier wegneeme. Hoedaanig dit bestier in verscheiden gevallen van deezen aart zyn moet, zal ik in het vervolg aanwyzen.

De Eeltächtige Zweer.

§ 289.

*Ulcer a
Gallofa.*

Zweeren die breed zyn, eeltägtige randen hebben, en welkers omtrek verhard is, worden **EELTAGTIGE ZWEEREN** genoemd.

§ 290.

Van deezen Aart, zyn meestäl de veröuderde Zweeren aan de Beenen; inzonderheid wanneer dezelve te vroeg, of aanhoudend, met sterk droogende Midelen behandeld worden.

§ 291.

Eene ongesteltheid der Vogten, de blootstelling des gebreks aan eene koude Lugt, het misbruik van Steekwieken, en dergelyke; het verblyf zelfs van welgestelde Etter in eene Nabuurige holte, zyn de gewoone Oorzaaken deezer Zweeren.

§ 292.

Dat meest alle Eeltägtige Zweeren, welke ik behandeld hebbe, by Behoeftige Menschen, en Zeelieden plaats hadden, verdiend mischien eenige opmerking, voor zoo veel het schynd te bewyzen, datze alleen kunnen voortkomen uit het gebruik van slegte Voedzelen, en eene harde Levenswys.

§ 293.

Geene deezer Zweeren, zyn vatbaar voor geneezing, ten zy men alvorens de harde Kanten wegneeme, en hier door de Natuur in staat stelle, om door het toeschieten der Huid, van den Omtrek naar het Middenpunt, een Lidteken te maaken.

§ 294.

Zoo verschillend de Oorzaaken zyn deezer verharding, zoo verschillend is ook, haare geneezing. Algemeen genoomen, moet de heerschende ongesteltheid der Vogten, door haare eigen Geneesmiddelen verbeterd, de Nadeelige aandoeningen der Lugt verhoed, het gebruik van sterk droogende Plaatsmiddelen, of van drukkende Verbanden nagelaaten, de ingeslooten Etter ontlast, en gezonde Voedzelen gegeven worden; terwyl men Uitwendig gebruik maakt van Week-
maa-

maakende Hulpmiddelen, of met het Mes, door Bytmiddelen, en dergelyken, de harde kanten wegneeme.

§ 295.

Onder alle Weekmaakende Middelen, welke ik ter wegneeming van het Eelt, immer beproeft hebbe, heeft my altoos best voldaan, een mengzel van den *Bals Arcei*, met eene ruime hoeveelheid *Kamfer*, of *Spiegelbars*, waar van dagelyks een gedeelte op Plukzel gestreeken, aangelegt, en van eene weekmaakende Pap overdekt werdt.

§ 296.

Als de Verëelting is weggenoomen, en de Zweer zelve eene goede Etter voortbrengt, kan de Geneezing voltrokken worden op de wyze der eenvoudige Zweeren.

§ 297.

Gelyk 'er egter in alle deeze gevallen, en inzonderheid, in die welke van eene inwendige Oorzaak afhangen, eene zekere neiging tot hernieuwing van het Eelt over blyft, is het noodzaaklyk dat men eenige Weekmaakende Middelen voege by dezulken, welke ter heeling van de Zweer worden aangewend.

De Drooge zweer.

§ 298.

DROOGE ZWEEREN zyn, die of geheel geene, of immers zoo weinig Etter voortbrengen, dat daar door, de geneezing belct of vertraagd wordt.

*Ulcer
Sicca.*

§ 299.

Deeze soort van Zweeren hangt voornaamlyk af van drieërlye Oorzaaken. De eerste, is eene bykoomende Ontsteking: de tweede, gebrek van Levenskrachten: de derde, eenigerhande sterke ontlasting door de gewoone Wegen, of elders.

§ 300.

Agtervolgens het verschil deezer Oorzaaken, moet ook de behandeling verschillend geregeld worden. In het geval naamlyk van Ontsteking, bediend men

zig van de Aderlaating, buikzuivering, verkoelende Geneesmiddelen, eene dergelyke Leefregel, en Weekmaakende Pappen. In de verzwakking der Levenskrachten, koomen inzonderheid te pas de Koortsbast, eene voedende en verkwikkende Eetregel, en eenigzints prikkelende, en versterkende Plaatsmiddelen. De te sterke ontlastingen eindelyk, moeten door haare eigen Middelen beteugeld, en de Zweer als dan met Ettermaakende Middelen verbonden worden.

§ 301.

Zweeren van deezen aart, plaats hebbende by Oude Menschen, zyn meestal voorbooden van eenen naderenden Dood.

De Vloeiende Zweer.

§ 302.

*Ulceras
fluentia,
vel nimis
pus emit-
tentia.*

Zweeren, die binnen eenen gegeven tyd, eene grooter hoeveelheid Etter voortbrengen, dan met haare blykbaare uitgestrektheid bestaanbaar is, worden **VLOEIJENDE, OF TE VEEL VERETTERENDE ZWEEREN** geheeten.

§ 303.

Ik bepaale de ontlasting deezer Zweeren, tot die van Etter, om dezelve hier door te onderscheiden van de Rotte Zweeren, van sommige Zweeren met Beenbederf, en dergelyke, waarin van gelyke ontlastingen plaats hebben, niet evenreedig aan haare blykbaare uitgestrektheid, maar doorgaans van een Vogt, meer of min verschillend van Etter.

§ 304.

Deze Zweeren zyn het gewoon gevolg van zeer groote Wonden, aanmerklyke Kneuzingen, en zeer saamengestelde Beenbreuken, of Ontwrigtingen. In den Zomer, wordenze meer waargenoomen dan des Winters: meer in heete Landen, dan in koude. Zy veröorzaaken, Zwakheid, Flauwtens, Stuiptrekkingen, en den Dood.

§. 305.

De geneezing, die veeltids zeer bezwaarlyk is, wordt het best verkreegen door het toedienen van voedende Spyzen, door een ruim gebruik van den *Koortsbast*; en door de Zweer dagelyks te verbinden met den *Overgehaalden Brandwijn*, met

met het *Wondwater van Theden*, en dergelyken. Een of meer stukken drooge Spons, over het plukzel dat de Zweer dekt heen gelegd, om de uitvloeiende Etter op te florpen, verhinderen zoo wel de terugvloed des Etters, alsze de gesteltheid verbeteren van den Grond, die in dit geval, altoos bleek, en met Sponsächtig Vleesch bezet is.

§ 306.

Een byzonder soort van te sterk Etterende Zweeren, is het gevolg eener gescheiden Versterving by Oude Lieden. Deeze, alsze eenige aanmerklyke uitgebreidheid hebben, zyn meestäl doodelyk.

De Rotte Zweer.

§ 307.

ROTTE ZWEEREN, noemt men dezulken, die meer ongevoelig, dan pynlyk zyn, een bruine, loodverwige, of zwarte Grond hebben, een miskleurig, dun, en stinkend Vogt uitwerpen, zig van tyd tot tyd, naar alle kanten, en in de diepte uitbreiden, en meestäl van eenen blauwrooden Omtrek bepaald worden.

*Ulcers
Putrida.*

§ 308.

Veele deezer Gebreken hangen af van Verwaarloozing, andere van eene kwaade gesteltheid der Vogten, en eenige, van eene kwalyk behandelde Ontsteking, Roos, of hebbelyk Zugtgezwel.

§ 309.

Na het verschil deezer Oorzaaken, is de geneezing der voorbeschreeven Zweeren, gemaklyk, moeilyk, of onmooglyk; en moet ook de Behandeling, verschillend worden ingerigt.

§ 310.

Als de eerste Oorzaak plaats heeft, wordt de geneezing verkreegen, alleen door de Zweer, op de te vooren gemelde wyze, te zuiveren met den *Terpentyngeest*, en haar vervolgens, als eene Eenvoudige Zweer te verbinden.

§ 311.

In Zweeren, afhanglyk van de tweede Oorzaak, moet vooräl de heerschende

ongesteltheit der Vogten verbeterd worden, intusfchen men uitwendig gebruik maakt van dezelfde Behandeling. Gelyk deeze ongesteltheit der Vogten, byna in elk voorkoomend geval verschillend is, kan men daarömtrent geene algemeene Behandeling vaststellen, en moet deeze, na den aart zelve der Ongesteltheit, geregeld worden. By Behoeftigen egter, en Zeelieden, wier vogten veeläl bedorven zyn, uit hoofde der flegte Voedzelen welke zy gebruiken, kan men als eene algemeene Regel aanmerken, dezelve, na het toedienen van eenig Braak- en Purgeer-middel, inzonderheid te voeden met versche Groentens, welke voor dezulken van veel meerder dienst zyn, dan alle Geneesmiddelen.

§ 312.

Gebreken van deezen aart, veröorzaakt door eene kwalyk behandelde Roos, Ontsteking, of hebbelyk Zugtgezwel, zyn zeer moeilyk te geneezen, uit hoofde der zeer verregaande Verftikking van het Vetvlies welke daar doorgaans by plaats heeft. In de twee eerfte gevallen egter, bediend men zig met vrugt van Weekmakende Pappen, langs de meeste of geheele uitgestrektheid van het Deel aangelegt, terwyl de Zweer zelve gezuiverd wordt met den voorgemelden *Terpentyn geest*; en men inwendig toediene, verkoelende, en bederfweerende Geneesmiddelen. In het laatste geval moet men een ruim gebruik toestaan van den *Koortsbast*, vermengd met *Kamfer*, en de Zweer behandelen met gelyke Hulpmiddelen, in haare werking ondersteund door eenigzints prikkelende en bederf-
tegenstaande Stovingen. De Eetregel, in deeze omftandigheid, moet verwarmend, en verfterkend zyn. Het maatig gebruik van geestryke Wynen, is voordelig.

De Voortknaagende Zweer.

§ 313.

Een Zweer, die niettegenftaande alle mooglyke voorzorgen, en onder de beste behandeling, zig van tyd tot tyd verder uitftrekt, en de harde Deelen fomwyl-
Ulcus
Carrodens. len tegelyk verteerd met de Zagte, wordt EENE VOORTKNAAGENDE ZWEER genoemd.

§ 314.

Een pokkige, fcheurbuikige, of kropzeerige ongesteltheit der Vogten, is de gewoone oorzaak deezer Zweeren; die nogthans ook dikmaalen voorkoomen,
zon-

zonder dat men reeden heeft, iets dergelyks te vermoeden. Eene verwaarloosde, of kwalyk behandelde Roos daarënboven, heeft fomwylen aanleiding gegeven tot deeze.

§ 315.

De kenmerken deezer Gebreken, zyn gedeeltelyk in de bepaaling aangewezen, gedeeltelyk bestaan dezelve in wankleurige en hoekige Randen, een zeer roode of onzuivere Grond, verharde zwelling van den Omtrek, Jeukte, zeer groote pynlykheid op de minste aanraaking, of by de geringste vermeerdering van de natuurlyke warmte des Lighaams; en den uitvloed van een dun, fcherp, en veeltids geelkleurig Stinkvugt, dat alles wat het aanraakt, ontsteekt, of ontveld.

§ 316.

Geenerlye ftellige Geneeswys kan men omtrent deeze Zweeren aanwyzzen. Sommige luisteren best naar deeze, andere naar geene Hulpmiddelen. Dezulke welke men inzonderheid beproeven moet, zyn de *Aluminoſa*, het *Liquor Myrrhæ*, een zeer zagt mengzel van den *Geest van Koperrood*, of van *Zeezout*, met weegbree water, een afkookzel van de *Scheerling* of *Nagtschade*, de *Loodmiddelen*, en dergelyken. De Eetregel moet zagt zyn, en vooral bestaan uit Melkſpyzen of Groentens, niet, of althans zeer weinig bedeed met Speceryën. Open lyf moet gehouden worden, maar met middelen welke het Lighaam op geenerlye wyze verhitten. Ingevalle van een blykbaar Pokſmet, geeft men inwendig Kwikmiddelen; van eene Scheurbuikige of Kropzeerige ongeſteltheid der Vogten, de daar in dienſtige Geneesmiddelen,

§ 317.

In alle gevallen van deezen aart, moet men de uitwendige Middelen dikmaalen verwisfelen met andere, om dat de Natuur 'er ras aan gewend wordt, en zy als dan geene uitwerking altoos hebben. De afleiding der Vogten naar eene andere plaats, door eenige konſtige Verzweering, komt altoos in aanmerking.

De holle Zweer.

§ 318.

HOLLE ZWEEREN noemt men dezulken, die uitwendig van weinig belang ſchynen, maar in de diepte met één of meer *Etterboezems* gemeenſchap oeffenen. *Ulcera Cavernosa.*

§ 319.

Deeze Boezems zyn van verschillenden aart, en geplaatst, of onmiddelyk onder de Huid, in het Vetvlies; of in de tuschenruimten der Spieren; of zelfs in een der voornaame Holligheden van het Lighaam, in de Gewrigten, en dergelyken. Somwylen bevinden zig dezelve aan den boven- somwylen aan den benedekant der schynbaare Verzweering. Veelmaalen zynze eenvoudig, en bestaan op zig zelfs; somwylen zynze saamengesteld, en vermengt met eenige andere plaatslyke wanördes. Alle deeze verscheidenheden hebben eenen zeer grooten invloed op haare behandeling, die inzonderheid hier na moet worden ingerigt.

§ 320.

Als Oorzaaken deezer Zweeren moet men beschouwen, het verblyf des Etters in een niet tydig genoeg geöpent Ettergezwel; de ongunstige plaatzing van den grond eener Verzweering ten opzigte van de ontlasting des Etters; en de scherpte der Stof van sommige Verzweeringen, niet intoombaar door eenigerlye Hulpmidelen.

§ 321.

Van welk eene Oorzaak, de Etterboezems ook afhangen, altoos zyn dezelve moeilyk te behandelen; vooräl wanneerze zig uitstrekken langs den loop der Peezen, der Zenuwen, der Bloedvaten, van het Beenvlies, en dergelyken.

§ 322.

Eene grooter ontlasting van Etter, als de schynbaare uitgestrektheid der Zweer mede brengt; het gevoel van spanning in den Omtrek; de moeilykheid der Geneezing; de aanhouding der Toevallen; en het zien eener uitvloeijing van Etter, uit eenig punt van den grond der Zweer, of uit deszelfs zeer kleinen ingang, na voorgaande drukking van den gespannen Omtrek, zyn de gewoone kenmerken deezer Zweeren.

§ 323.

Van de diepte, en loopstreek der Etterholtens, oordeeld men, door het onderzoek met het Tentyzer: van de Deelen welke zy aanraaken, of langs welke zy zig uitstrekken, uit de Ontleedkundige kennis van derzelve plaatzing.

§ 324.

§ 324.

Vier verschillende Behandelingen, koomen ter geneezing deezer Zweeren in aanmerking. De eerste is het gebruik van het *Uitdryvend Verband*, na dat alle ingeslooten Etter nauwkeurig is uitgedrukt: de tweede, het doen eener *Tegenöpening*: de derde, de geheele *opsnyding der Etterholte*: de vierde, het *verwyden van den ingang der Verzwearing*.

§ 325.

De eerste Behandeling is vooräl van nut als de Etterholte zig bevind onmiddelyk onder de Bekleedzelen, 't zy boven, 't zy beneden de blykbaare Verzwearing. De tweede, als de grond des Boezems zeer verre beneden, ter zyden, of juist tegen over, den ingang der Zweer geplaatst is. De derde, wanneer de Holte, of Holtens, meer of min oppervlakkig gelegen zyn, en geene voornaame Bloedvaten, Zenuwen, of dergelyken, dezelve verbieden. De laatste, als de grond des Boezems beantwoord aan het midden der dikte van een der Lede-maaten; of zig bevind in eene der voornaame holligheden van het Lighaam; van de Borst by voorbeeld, van den Buik, van het Bekken, en dergelyken. Deeze kan geschieden, of door het Mes, of door Bytmiddelen; onder welke laatste, de *Onderäardsche Steen* den voorrang heeft.

De Pypzweer.

§ 326.

Een PYPZWEER, verschilt inzonderheid daarin van de holle Zweer, dat der-zelver binnenste oppervlakte, door veröudering ontäart is, zonder daarom, ge-lyk de Ouden dagten, eeltächtig te zyn.

*Ulcus fis-
tulofum.
Fistula.*

§ 327.

De Kenmerken, Oorzaaken, en Gevolgen deezer Zweeren, zyn na genoeg gelyk aan die der voorgaande. Men kan hetzelfde zeggen van de Behandeling; met byvoeging alleen, dat een uitdryvend Verband, de tegenöpening, en het verwyden van den ingang der Zweer, hier in niet voldoen kunnen, en deszelfs gantsche uitgestrektheid moet open gelegd worden.

§ 328.

§ 328.

Eene meer byzondere Beschryving deezer Gebreken, behoord tot de *Verhandeling der plaatslyke Zweeren*, welke wy in het vervolg zullen mededeelen.

De Scheurbuikige Zweer.

§ 329.

*Ulcera
scorbutica.*

Zweeren, afhanglyk van, of onderhouden door, eene Scheurbuikige ongesteltheid der Vogten, worden SCHEURBUIKIGE ZWEEREN genoemd.

§ 330.

Deeze Zweeren hebben meestäl een bruine of loodverwige Omtrek, en een dergelyke Grond; bloeden ligtelyk op de minste aanraaking; zyn veelmaalen bezet met een sponsächtig Vleesch, dat van het eene Verband tot het andere, zig verheft boven haare randen, en ligtelyk met den Vinger verbrooken wordt; laaten een dun, scherp, stinkend, en geelkleurig Vogt uitvloeijen; en gaan doorgaans verzeld van schietende Pynen door de gantsche uitgestrektheid van het aangedaane Deel.

§ 331.

Verärmdede ledigloopers, Menschen die een stilzittend leeven leiden, zy, die een al te overvloedig gebruik maaken van sterk gezoute, gerookte, of bedorven Voedzelen, zyn de meest gewoone onderwerpen deezer Zweeren.

§ 332.

Derzelver Geneezing is meer afhanglyk van die der Ziekte, van welke zy de gevolgen zyn, dan van eenigerlye plaatslyke Behandeling. Men regele derhalven de eerste agtervolgens de voorschriften der Geneeskunde. De laatste bestaat inzonderheid, in het gebruik van weekmaakende Middelen als de Zweer droog staat en zeer pynlyk is; en van Balsemächtige, of Droogende, wanneerze eene groote veelheid Vogt uitwerpt. Een *uitdruyend Verband*, als de plaats der Zweer zulks toelaat, is van de uiterste aangelegenheid.

§ 333.

Zweeren van deezen aart, waar by eene aanmerklyke rotting plaats heeft, moe-

moeten door den *Terpentyn Geest* gezuivert worden, voor en alëer men gebruik maakt van de gemelde plaatsmiddelen. Dezulke, welke uit hoofde van het aan gedaane Deel, eene byzondere Behandeling vorderen, zullen in het vervolg beschreeven worden.

De Kropzeerige Zweer.

§ 334.

KROPZEERIGE ZWEEREN zyn dezulke, welke van een doorgebrooken Kliergezwel van dien naam, afhangen; of onderhouden worden door eene Krop- *Ulceræ Scrofulosa.* zeerige ongesteltheid der Vogten.

§ 335.

Het eerste soort deezer Zweeren, ziet men inzonderheid aan den omtrek van den Hals, en behoord dus niet tot het onderwerp deezer Onderdeeling. Het tweede soort, vertoond zig onverschillig op alle plaatzen van het Lighaam.

§ 336.

By Kinderen worden deeze Zweeren meestäl gekend aan de nevensgaande verschynzelen eener Kropzeerige gesteltheid; aan een bleek-kleurig aangezigt by voorbeeld, een korte Hals, eene breede Onderkaak, een zwak Gezigt, traanende Oogen, een druipende Neus, een vogtige Mond, dikke Lippen, een harde Buik, Zeerhoofdigheid, en dergelyken. By Bejaarden moet men inzonderheid daar van oordeelen, uit het gene in de Jeugd heeft plaats gehadt, gevoegd by de Natuur des Gezwels welk is voorgegaan, de omgewelfde loodkleurige kanten der Zweer zelve, den uitvloed van eenen kwalyk gestelden Etter, een blauw-rooden Omtrek, en zeer kleine byzynde Zweertjes aan de randen der Oogleeden.

§ 337.

Alle uitwendige Behandeling is in deeze Gebreken nutloos, ten zy dezelve door een Geneeskundig bestier ondersteund worde. Men bediene zig derhalven inwendig van het verdikte aftrekzel der Scheerling met de zoete Kwik, en Koortsbast; van vaste Loogzouten; van het Zeewater; en dergelyken. Uitwendig dienen vooräl, Zuiverende, Balfemächtige, en Bederfweerende Plaatsmiddelen, zoo in de gedaante van Zalven, als Stovingen. Als de kanten der Zweer, meer dan gemeen verhard zyn, overdekt men deeze met de *Heemstzalf* en *Kamfer*, of *Spie-*

gelbars. Zyn 'er verharde Waterklieren in den Omtrek of elders, zoo moet men deeze behandelen met eene oplosfende Pleister, zoo veel mooglyk zy vermengt met den neêrgedrupten *Wynsteen. olie.*

De Pokkige Zweer.

§ 338.

*Ulcera
venerea,*

Zweeren, afhanglyk van eene venerifche besmetting der Vogten, worden **POKKIGE ZWEEREN** genoemd.

§ 339.

De aanwezigheid van dit Smet, besluit men vooräl uit de nog tegenwoordige, of voorgegaane venerifche Gebreken, van welk eenen aart dezelve ook zyn moogen; uit de onmooglykheid der geneezing van de Zweer, door eenige der gewoone Hulpmiddelen; en eindelyk, uit de afwezigheid der Kenmerken van eene Scheurbuikige, Kropzeerige, of andere Ongefteltheid der Vogten.

§ 340.

Alle deeze Zweeren zyn fpekächtig; of hebben, alsze zuiver fchynen, een grond die buitengemeen effen en glanzig is. Het Vogt welk zy uitwerpen, is den meesten tyd, eenigzints geelverwig, en Slymig. Ze zyn, over het geheel genoomen, niet zeer pynlyk. Somwylen egter, zynze zulks in den hoogften graad; en byzonderlyk, alsze zig bevinden aan de einden der Vingeren, of op plaatzen, welke deezen in gevoeligheid meer of min evenaaren. De voornaamfte egter, zyn byzynde Nagtpynen in het Hoofd en de Ledemaaten, Beenknobbels, korstägtige Huidzweeren, eene hardnekkige roosägtige Ontfteking van de Keel, en dergelyken.

§ 341.

De natuurlyke Deelen, het Voorhoofd, de Keel, de Bovenlip, het gewrigt des Elboogs, de einden der Vingeren, de Scheenen, en dergelyken, zyn de meest gewoone zitplaatzen deezer Zweeren. By Vrouwen, die besmette Kinderen zoogen, bespeurd men dezelve dikmaalen aan den Tepel.

§ 342.

Ter geneezing deezer Zweeren, is niets vermoogend dan de Kwikmiddelen,
in.

inwendig gegeven, met of zonder de Houtdranken; en uitwendig aangelegt, onder de gedaante van Zalven, of by wyze van Badingen, Berookingen, en dergelyken, na de omstandigheden van plaats zulks vorderen.

De Kankeragtige Zweer.

§ 343.

Door KANKERAGTIGE ZWEEREN, verftaa ik niet zoo zeer dezulken, welke het gevolg zyn van een geöpent Kreeftgezwel, dan wel, die in Kwaadaartigheid deezen naby koomen, en even zoo moeilyk, om niet te zeggen, even zoo onmooglyk, door uit- of inwendige Middelen geholpen worden. *Ulceracancrofa.*

§ 344.

Twee foorten deezer Zweeren zyn 'er. De eerfte behooren alleen tot het Huidweefzel; de laafte ftrekken zig tevens uit tot het Vetvlies. Men kan gene, den naam geeven van *Kankeragtige Huidzweeren*; en deeze, die van *Kankeragtige Zweeren des Vetvlies*.

§ 345.

De KANKERAGTIGE HUIDZWEEREN, zyn doorgaans het gevolg van eene ontvelde Wrat, of van een blauwrood Huidknobbeltje, dat op het uiterlyk aanzien van weinig belang fchynt. Zy verteeren allengskens de Huid des Omtreks, in eene zeer groote uitgebreidheid. *Ulceracancrofa cutis.*

§ 346.

De KANKERAGTIGE ZWEEREN VAN HET VETVLIES, zyn altoos bezet met een sponsagtig Uitwas, dat uitermaate pynlyk, finkend, loodkleurig, en zeer verheven is, eene groote hoeveelheid dun Vogt uitwerpt, en veelmaalen aan merklyke Bloedvloeiingen veroorzaakt. *Ulceracancrofa membrane adiposa.*

§ 347.

Gelyk beide deeze foorten van Zweeren, eene onbekende Scherpte der Vogten ten gronde hebben, moet men de Geneezing beproeven door het inwendig gebruik der Scheerling; en uitwendig aanwenden den Geest van Koperrood of van Zeezout, genoeg verflapt met Weegbreewater; van eene fmelting van Loodzout in Kalkwater; van het verdikte uittrekzel der Scheerling in het laatstgemelde Water opge-

lost; gelyk ook van de afkookzels der Scheerling, of van den *Koortsbast*, bedeed met *Loodzuiker*, *Aluin*, en dergelyken. De vernieling van het Uitwas, door het poeijer van *Wit vierkruid*, of den bytenden *Kamfer-olie*, gevolgt van den aanleg eener Pap van geele Wortelen, zegt men, dat veelmaalen eene gewenschte uitwerking gehadt heeft.

§ 348.

De Wratten, en Knobbelgezwelletjes, van welke wy gezegd hebben dat het eerste foort deezer Zweeren doorgaans afhingen, vroegtydig by hunnen grond wordende uitgesneden, voorkomt men veelal derzelver gevolgen.

De Wormzweeren.

§ 349.

*Ulcer
verminosa.*

Zweeren, welke eenige Maaden of Wormen influiten, zeer pynlyk of jeukend zyn, een kwalyk gestelde grond hebben, en veel stank van zig afgeeven, worden **WORMZWEEREN** genoemd.

§ 350.

Deeze Zweeren zyn doorgaans het gevolg van Wonden, by welke eene groote Verëtering plaats grypt, en die om deeze reeden, dikmaalen aan de Lugt moeten bloot gesteld worden. Des Zomers, en in warme Landen, zynze zeer gemeenzaam, vooral in Legers, en Ziekenhuizen. Des Winters, en in koude Lugtstreeken, zal menze zeldzaam waarneemen.

§ 351.

Men brengt dezelve in den staat eener eenvoudige Zweer, doorze eenige Dagen te bestrooijen met het *Poeijer van Alsem*, of te waschen met den *Terpentyn Geest*. Dit is alles, waarin haare Behandeling verschilt van die der Eenvoudige Zweeren.

De Zweer met Beenbederf.

§ 352.

*Ulcus
cariosum.*

Deeze Naam geeft men aan dat soort van Zweeren, in welkers grond eenig bedorven Beendeel aanwezig is.

§ 353.

§ 353.

Wonden, tot op het Been toe doorgaande, of in deszelfs Zelfftandigheid indringende; verzaamlingen van Etter, onmiddelyk op deszelfs buitenfte oppervlakte, in de Mergholte, of in de netwyze Zelfftandigheden der Beenderen; zyn de meest gewoone oorzaaken deezer Zweeren. Als afgelegen Oorzaaken derzelver, moet men inzonderheid beschouwen, de Ontstekingen van het uit- en inwendig Been-vlies; en eene Kropzeerige, Scheurbuikige, of Pokkige ongesteltheit der Vogten.

§ 354.

Als het bedorven gedeelte des Beens bloot ligt, kan men deszelfs ontäarting gemaklyk kennen, uit de veränderde Kleur, Vastheid, of effenheid der Oppervlakte. Wanneer het integendeel, gelyk meestäl plaats heeft, met sponsächtig Vleesch bedekt is, of door middel van afzonderlyke Etterholtens met den blykbaaren Grond der Zweer gemeenschap oeffent, moet men alleen daar van oordeelen, uit het onderzoek met het Tentyzer, uit de zeer byzondere reuk van den Etter welke de Zweer uitwerpt, uit deszelfs miskleurigheid en veelheid, uit een zwart beslag van de aangelegde stukken des Verbands, en uit de zeer moeilyke, onmooglyke, of onbestendige geneezing der Zweer zelve.

§ 355.

Somwylen zyn geene deezer Kenmerken aanwezig, terwyl nogthans de beder-ving van het Been zeeker is. In dit geval is de blykbaare Zweer geheel niet aanmerklyk, en wordt de ongesteltheit van het Been aangewezen, door eene kleine blaaswyze, en tepelächtige Verhevenheid, welke eene groote veelheid waterächtig Vogt uitwerpt.

§ 356.

Geene deezer Zweeren is voor eene bestendige Geneezing vatbaar, dan, na het bedorvene alvorens is afgescheiden van het Levendige.

§ 357.

Deeze afscheiding, die men de AFSCHILFERING VAN HET BEEN noemt, geschied veeltyds in de gedaante van kleine plaatjes, somwylen onmerkbaar, en dikmaalen by aanmerklyk groote Beenstukken. De verschillende natuur der Beenderen, en de meer of minder uitgestrektheid van het Beenbederf, zyn de voornaame oorzaaken deezer verscheidenheid.

§ 358.

Om deeze afscheiding te begunstigen, moet men het sponsächtig Vleesch, indien dit 'er by is, op alle mooglyke wyze t'onder brengen; dat is te zeggen, met het Mes, of door Bytmiddelen wegneemen; en vervolgens gebruik maaken van eenige dier Middelen, welke wy, by gelegenheid van het Beenbederf, in *het Leerstuk der Beenziekten*, zullen aanwyzen.

§ 359.

In Zweeren van deeze soort, welke alleen door middel van één of meer Etterboezems, met het bedorven Been gemeenschap oeffenen, is de opsnijding van deeze het eerste Hulpmiddel. Hetzelfde is waar in dat soort deezer Zweeren, welk zig uitwendig voordoet in de gedaante eener blaaswyze verhevenheid, en van eene sterke lekkings verzeld is, als merendeels van dezelfde Natuur zynde.

De Zwer met Sponsagtig Vleesch.

§ 360.

*Ulceras
fungosa.*

Zweeren, welkers Grond, door middel van een sponsächtig, slap, bleek, zeer rood, ligt bloedend, glanzig, of ligt verrottend Vleesch zig verheft boven het oppervlak des Omtreks, worden ZWEEREN MET SPONSAGTIG VLEESCH geheeten.

§ 361.

Als Oorzaaken deezer Zweeren moet men beschouwen, het gebruik van vette Heelmiddelen, flappe Verbanden, eene koortsächtige Ongeesteltheid, zugtige Zwelling van het aangedaane Deel, of van het gantsche Lighaam, het bestendig gebruik van zeer voedende Spyzen, of geestryke Dranken, eene kwaade gesteltheit der Vogten, en dergelyken.

§ 362.

Wellsluitende Verbanden, het gebruik van saamentrekkende en zachte Bytmiddelen, de wegsnyding van het sponsächtig Vleesch, deszelfs Afbinding, en het toedienen van Buikzuiverende, en soortlyke Geneesmiddelen, koomen ter geneezing deezer Zweeren, inzonderheid in aanmerking.

§ 363.

§ 363.

De drooge Spons derhalven, Plukzel in Aluin-water nat gemaakt en gedroogd, de rauwe of gebrande Aluin, het blauw of wit Koperrood, het poeijer van Zevenboom, de groene onderaardsche Steen, en het *Engelsch Bytmiddel*, zyn, ter behandeling deezer Zweeren, de voornaamste plaatsmiddelen. Het poeijer van *Wit vierkruid*, de bytende Kamferolie, en de Boter van Spiesglas, kunnen, in gevallen waar deeze te kort schieten, beproefd worden.

De Zweer, die in schyn gering, maar moeilyk te geneezen is.

§ 364.

Onder deezen Naam, begryp ik alle die Zweeren, by welke de Verëtering, Zuivering, en Vleeschgroeiing, behoorlyk geschied is, maar, waarin het Lid-teken geheel niet, of immers met zeer veel moeite gemaakt wordt.

*Ulcus,
quod visus
facile vide-
tur, sed,
difficile
curatur.*

§ 365.

Meest alle Zweeren zonder onderscheid, dog vooräl dezulke welke een groot verlies van Zelfstandigheid in de Huid gemaakt hebben, bevinden zig op het laatst der behandeling, in het geval van deezen. Men kan hetzelfde zeggen van die genen, welke plaats grypen in Deelen, over welken de Huid meer dan gemeen gespannen is; gelyk ook, van die den omtrek der Gewrigten, of eenig gedeelte van deeze, inneemen.

§ 366.

De Oorzaak hier van moet gezogt worden, gedeeltelyk in de gesteltheit van den Grond der Zweer zelve, gedeeltelyk in den staat der Bekleedzelen.

§ 367.

De gesteltheit van den Grond der Zweer, belemmerd de geneezing, als deszelfs Vleeschgraantjes te slap of te vast van saamenhang zyn, en dus te veel, of te weinig Vogt doorlaaten.

§ 368.

De staat der Bekleedzelen doet hetzelfde, door niet genoeg te naderen naar het Middenpunt der Verzweering; 't zy uit hoofde van deszelfs natuurlyke strakheid, 't zy uit kragt van een zeer groot verlies van Zelfstandigheid.

§ 369.

§ 369.

Als de Grond der Zweer gevuld is met Vleeschgraantjes welke te slap zyn van Zelfstandigheid, en de Zweer diensvolgens eene grooter hoeveelheid van Etter geeft, als evenreedig is aan haare waare uitgestrektheid, moet de geneezing voltooid worden, door Opflorpemde, Saamentrekkende, en eenigzints Zwaare Heelmiddelen, in haare werking ondersteund van welsluitende Verbanden. Het poeijer van de *Kalmynsteen*, van *Aluin*, het *Loodwit*, het *Goudglit*, het *Kalkwater*, de *Geest van Koperrood*, met Water verslapt, gemeene *Stopverw*, en de *velmaakende Zalf* van SCHLIGTING, zyn onder deeze Hulpmiddelen de voornaamsten. Van veel nut ook in dit geval, is de drooge Spons, over eenige losse plukzeldraaden heen gelegd, de gemeene Sparadrap, en dergelyken.

§ 370.

Wanneer deeze zelfde Vleeschgraantjes te vast zyn, en de Zweer meer of minder droog staat, moet men de Velmaakende Middelen vermengen met Weekmaakende, of deeze laatsten afzonderlyk aanleggen. In dit geval dienen vooräl, de *Koningszalf*, de *Bals Arcaei*, het *Ung. althææ*, en dergelyken. Met de gemeene Gortpap alleen, nauwlyks lauw aangelegt, gelukt het dikmaalen, dusdanige Zweeren in eenen zeer korten tyd te geneezen.

§ 371.

Indien eindelyk, de onrekbaarheid der Bekleedzelen, of derzelver groot verlies van Zelfstandigheid, de oorzaak is van het agterblyven des Lidtekens, moet de oppervlakte der Zweer zelve, uitgedroogt, en dus als eene nieuwe Huid daar op gemaakt worden. Onder zoo veelerlye Hulpmiddelen als hier toe gemeenlyk worden aangepreezen, hebbe ik altoos den meesten dienst gehad van den *bruinen Onderaardschen Steen*, hier en daar, op de oppervlakte der Zweer, met eene luttige hand aangebragt.

De Zweer met eenig ingeslooten vreemd Lighaam.

§ 372.

Tot de Klasse van deeze, brenge ik alleen die Zweeren, in dewelke eenigerhanden Lighaam, eenigerlye Zelfstandigheid, geheel niet vermengd met, nóg behorende tot, het verzworenen Deel, is opgeslooten.

§ 373.

Ulcus in quo aliquod alienorum corporis inclusum est.

§ 373.

Deeze Zelfstandigheden worden in ons Lighaam zelve gemaakt, of van buiten aangebragt, en zyn of levenlooze, of Levende. Stukken Hout, gedeeltens van Klederen, Kogels, Beensplinters, Niersteen, Steenen der Galblaas naar elders afgevoerd, de West-Indische *Dracunculus*, en dergelyke, zyn hier van voorbeelden. Wormen ook, in den Darmbuis uitgebroeid, doorgezwolgen onverteerbare Lighaamen van verscheidenerlye soort, maaken somwylen Verzweringen aan den omtrek der Buiksholte, welke gelykelyk moeten gebragt worden tot deeze.

§ 374.

De meeste deezer Zweeren, moeten uit het gene is voorafgegaan gekend worden. Haare geneezing, algemeen genoomen, is zeer moeilyk; en moet, naar de verscheidenheid der Oorzaak, en de verschillende Natuur van het Deel worden ingerigt.

§ 375.

Geene algemeene Voorschriften derhalven, kunnen ten deezen opzigte gegeven worden. Men moet anders handelen in deeze, anders in geene omstandigheden. In het vervolg van dit Werk, zullen by verscheiden gelegenheden, hier omtrent de noodige onderrigtingen gegeven worden.

T W E E D E D E E L I D.

De byzondere beschryving der Zweeren.

§ 376.

De Zweeren van het Hoofd, van den Hals, van de Borst, van den Buik, van den Omtrek des Bekkens, en der Ledemaaten, zyn de voornaame Onderwerpen deezer Afdeeling. Alle deeze, zullen we in even zoo veele Onderdeelingen, of liever, onder een gelyk getal van Opschriften voordraagen.

De Zweeren van het Hoofd.

§ 377.

Tot deeze behooren, voor zoo veel ons tegenwoordig bestek aangaat, de stinkende Neuszweer, de Wang-pyp-zweer, de Pyp-zweer der Higmoriaan-
L sche

sche holte, de Zweeren van den Geoorweg, de Zweer die agter het buitenoor plaats grypt, de Kaakpyp-zweer, de Zweeren der Lippen, en de Waterkanker.

§ 378.

Ozena. De STINKENDE NEUSZWEER, die altoos de binnenste oppervlakte der Neusholten beslaat, is doorgaans verzeld van Beenbederf, en afhanglyk, of van eene Kankerächtige, of vaneene Pokkige ongesteltheit der Vogten. In het eerste geval moetze te keer gegaan worden, door het In- en Uitwendig gebruik van de *Scheerling*; in het tweede, door dat van *Kwikmiddelen*.

§ 379.

*Fistula
bucca.*

De WANG-PYPZWEER, is meestäl oorspronglyk uit eene toevallige opening der Speekzelbuis van STENO, verwekt eene geduurige ontlasting van het Speekzel buitenwaards, vooräl by de Kauwing, en wordt dikmaalen geneezen, alleen door eene Korst te maaken met het *Engelsch Bytmiddel*, of den *Groenen Onderaardschen Steen*, en deeze, zoo lang mooglyk is, droog te houden met een weinig droog plukzel, en een Engelsche Gompleister. In gevallen waar in deeze behandeling niet voldoet aan het Oogmerk, moet men den toevlugt neemen tot één dier Kunstbewerkingen, welke wy in het vervolg zullen voorstellen.

§ 380.

*Fistula
Antra
Higmorei.*

De PYPZWEER DER HIGMORIAANSCHER HOLTE, is het gewoon gevolg eener verzeering van het Slymvlies welk de binnenste oppervlakte deezer Holte bekleed, of van eenig bederf der bovenste Maaltanden. Dit gebrek ondersteld altoos Beenbederf van de Wanden deezer Holte, en vertoond zig aan eenig gedeelte van het Tandvleesch, of aan de buitenste oppervlakte van de Wang. Het wordt geneezen, door de middenste Kies der Bovenkaak, aan de ongestelde zyde uit te trekken; door den grond der Tandkas, tot in de holte te doorbooren; en, door zig van deeze opening te bedienen tot het inspuiten van Zuiverende, en Balfemächtige hulpmiddelen. Als het bederf van één der Tandden, dergelyk eene Pypzweer verzeld, en deeze op het Oog kenbaar is, of zig ontdekt door het gevoel van Pyn, als de Tand zagtelyk met een hard Lighaam geslaagen wordt, moet deeze bedorven Tand, by voorkeur getrokken worden, het zy het de middenste is, of eene andere.

§ 381.

§ 381.

De ZWEEREN VAN DEN GEHOORWEG, zyn fomwylen eenvoudig, en fomtyds verzeld van Beenbederf. De Natuur van den Uitvloeijenden Etter inzonderheid, ftelt ons in ftaat om van het een en ander te oordeelen. In het eerfte geval, verkrygt men de Geneezing gemaklyk, door het by brengen van Witte Wyn, en Roozenhoonig. In het laafte, wordt hier toe verëifcht, een aftrekzel van *Myrrhe* in *Brandewyn*, de *Geest van Mastik*, en dergelyken. Uit deeze Zweeren groeit veelmaalen een Sponsächtig Vleefch, 't welk verteerd moet worden met zachte Bytmiddelen, of Uitgetrokken op de wyze der Neusproppen.

*Ulcerata
meatu
Auditorii.*

§ 382.

Zweeren, onmiddelyk agter het Buitenöör plaats grypende, zyn doorgaans afhanglyk van een Ettergezwel, dat van zelfs, of niet vroegtydig genoeg met het Mes geöpent is; en bestaan nauwlyks, zonder een meer of min bederf van het Slaapbeen. Altoos zyn dezelve van zeer langen duur ten opzigte der geneezing. Veelmaalen zelfs, is deeze onmooglyk, en het geval doodelyk. Eene ruime ontblooting van het ongestelde Been, door infnyding, en het gebruik van Hulpmiddelen, welke by gelegenheid van het Beenbederf zullen aangewezen worden, is alles wat men in deeze omftandigheden kan aanwenden.

§ 383.

De KAAK-PYPZWEER, is meest betreklyk tot de dekkende deelen der Onderkaak. Zy is fomwylen oorspronglyk uit een bedorven Tand alleenlyk: fomwylen, uit het bederf van eenig gedeelte des Kaakbeens zelve, na een voorgaand Ettergezwel, en behoudens den gezonden ftaat der Tand en. In het eerfte geval, is het Uittrekken der ongestelde Tand, het voornaame hulpmiddel. In het laafte koomen in aanmerking, de Verwyding der Zweer door het Snymen, en het opvolgend gebruik der gewoone middelen voor het Beenbederf.

*Fistula
Maxilla-
ris.*

§ 384.

De ZWEEREN DER LIPPEN, zyn eenvoudig, of faamengefteld. De eerften neemen haaren oorsprong doorgaans, van eene affcheuring des *Epitheliums*, en geneezen veeläl door het gebruik van Roozenhonig, vermengd met eene zeer kleine hoeveelheid *Wit Koperrood*, *Japansche Aarde*, en dergelyken. De laafte zyn afhanglyk van eene Pokkige, Scheurbuikige, of Kankerächtige ongestelt-

*Ulcerata
labiorum.*

heid der Vogten, en moeten behandeld worden, in overéénkomst met haare Oorzaak, door foortelyke Geneesmiddelen.

§ 385.

Geene Zweeren mischien zyn 'er, welke den Heelmeester zoo dikmaalen misleiden dan deeze. Somwylen naamlyk, hebbenze het aanzien eener zeer goedaartige Verzweering, en weêrstreeven nogthans allerleye Hulpmiddelen. In andere gevallen daarëntegen, heeft de Zweer een afgryslyk aanzien, voorspeld het uiterste gevaar, en wordt egter geneezen zonder veel toefstel. De Saamengestelt-heden van welke wy gesproken hebben, geeven hier toe aanleiding.

§ 386.

Om eenig meerder Licht aan dit Onderwerp te geeven, en niet zoo dikmaalen mis te tasten in de beöordeeling deezer Zweeren, kunnen mooglyk de volgende Aanmerkingen van nut zyn.

1. De *Pokkige Lipzweeren*, bespeurd men den meesten tyd in de Bovenlip, en zyn doorgaans verzeld van eenige der gewoone verschynzelen van een aanwezig Poksmet.

2. De welbeweezen *Kanker Zweeren* deezer Deelen, bepaalen zig veeläl by de Onderlip, of overschreiden ten minsten nauwlyks, de Liphoecken. Ze zyn den meestentyd zeer pynlyk, hoolächtig, met harde omgewelfde en hoekige kanten bezet, vervuld somwylen met sponsächtig Vleesch, en gaan gepaart met eene verharde Zwelling van de Lip zelve, en der naastgelegen Klieren.

3. De *schynbaar geringe, maar inderdaad Kankerächtige Lipzweeren*, zyn doorgaans vlak, somwylen met wat weelig Vleesch bezet, niet zeer uitgebreid noch pynlyk, omzet met een nauwlyks merkbaar wit en eeltächtig Randje, zonder verharding van de Lip of byliggende Klieren, maar dikmaalen verzeld van zekere oogenbliklyke pynen, welke zig door de overéénstemmende Wang, tot in het Oor uitbreiden. Deeze, en de voorige, volgen veelyds op een Lipbarst, een Wrat, een klein hard gezwelletje der Lippen, of op eene afscheuring des *Epithelium*. Beide soorten ook zyn zeer zeldzaam by Vrouwen, verdraagen hoe genaamd, geenerlye scherpe Plaatsmiddelen, en zyn, in eenen volstrekten zin, tot nog toe ongeneeslyk.

4. De *Scheurbuikige Lipzweer*, heeft de gewoone kenmerken der Scheurbuikige Zweeren in het algemeen, en verdraagt niet flegts, maar wordt zelfs geneezen, door een mengzel van den *scherpen Geest des Zeexouts*, en *Stroop van Viöolen* of

Rooszen.

Roozenhonig. Vrouwen zyn aan deeze Zweeren zoo wel, en zelfs meer onderworpen, dan Mannen.

5. De eenvoudige *Lipzweer*, by gebrek van eene goede behandeling ontäart in een sponsächtig Uitwas, wordt wel meer of min onvatbaar voor het geneezend vermoogen van Plaatsmiddelen, maar kan niettemin, met het Mes worden weggenoomen. By deeze, die ten onregte dikmaalen als Kankerächtig beschouwd wordt, is de omtrek der zweer niet met eene eeltächtige Rand bezet, de Lip in allen deele zagt en natuurlyk, en ontdekt men geenerhande zwelling der naastliggende Klieren, pynlyke scheuten door het Zydelyke gedeelte van het Aangezicht, noch eenig kenmerk van Poksmet, of Scheurbuikige ongesteltheid der Vogten. Scherpe Plaatsmiddelen, in de Kankerächtige Zweeren zoo onverdraaglyk, kunnen in deeze zonder nadeel beproefd worden. Meermaalen zelfs, hebbe ik dezelve door het gebruik van voorgemelden *Geest des Zeezouts*, zonder eenig byvoegzel, gebragt in den staat eener vlakke Zweer, waaraan niets meer ter heeling over bleef, dan de vorming van het Lidteken. De Uitsnyding egter, bleef altoos noodzaaklyk, uit hoofde eener nieuwe hergroeiing van Sponsächtig Vleesch; en is nimmer in gebreke gebleeven, de geneezing te beslissen.

§. 387.

De WATERKANKER behoord tot de klasfe der Rotte Zweeren, is betreklyk alleen tot de omringende Deelen van den Mond, en heeft veeläl ten gronde eene Scheurbuikige ongesteltheid der Vogten. Zy vertoond zig doorgaans in de gedaante eener Koudvurige Verzwearing, die zeer pynlyk is, en een bloederig Stinkvogt uitwerpt. By Bejaarden is ze uitermaaten gevaarlyk: by Kinderen, is ze zulks minder. Het vermoogendst uitwendig middel in dit geval, is de *Geest van Zeezout*, vermengd met de *Stroop van Viöolen*. Inwendig moet men vooräl gebruik maaken van den *Koortsbast*, 't zy alleen, 't zy vermengd met de gewoone Tegenfcheurbuikige Geneesmiddelen, of het Vitriööl zuur. De hoeveelheid deezer Geest, ten opzigte van die der Stroop van Viöolen, behoord bepaald te worden, naar evenreedigheid der fchynbaare kwaadäartigheid van de Verzwearing zelve, en kan van 5 tot 20, en zelfs tot 30 Druppelen, of een Dragma, op een Once, opklimmen. Het mengzel wordt eenige reizen Daags, door een Pinceel, of Plukzelkwastje aangebragt, terwyl men in de tusschentyden gebruik maakt van eene Mondspoeling, bereid uit 6 Oncen *Witte Wyn*, 20 druppelen *Geest van Zeezout*, en 1 Once *Stroop van Viöolen* of *Roozenhoonig*.

*Cancer
Aquosus.
Noma.*

§ 388.

*Ulcera
venerea
palati.*

De POKKIGE ZWEEREN VAN HET VERHEMELTE, en naastliggende Deelen, verschillen ten opzichte haarer kenmerken, en behandeling, in geenen deele van de overige. Zy veröorzaaken dikmaalen, een bederf van de Verhemeltens deelen der Opperkaaksbeenderen, en van de Verhemeltens beenderen zelve, waar uit, na de scheiding des bedorvene, eene opening overblyft, welke met de holtens des Neus gemeenschap oeffent. Deeze opening, al het overige geneezen zynde, moet geslooten worden door zeeker Werktuig, bekend onder den naam van *Stopper des Verbemelte*.

*Ulcera
colli.*

De Zweeren van den Hals.

§ 389.

Deeze, voor zoo veelze de uitwendige Deelen inneemen, behooren meestal tot het soort der Kropzweeren, en worden op gelyke wyze als wy hier omtrent hebben voorgesteld, geneezen. Dezulke integendeel, welke inwendig in de Keel geplaatst zyn, onderstellen veelmaalen een aanwezig Poksmet, en vorderen derhalven, het gebruik van Kwikmiddelen. De laatste soort deezer Zweeren, zyn altoos bezet met eene witte, taaije, en vastkleevende Stof, die zig niet door Water laat afspoelen, en hebben eenen roosägtigen of ontsteken omtrek.

De Zweeren van de Borst.

§ 390.

*Ulcera
thoracis.*

De ZWEEREN VAN DE BORST, bepaalen zig alleen by de uitwendige Deelen, of dringen door tot in de Borstholte. Beiden kunnen zyn, met, of zonder Beenbederf van het Borstbeen en der Ribben; en met of zonder eenige Kankeragtige, Kropzeerige, of Pokkige ongesteltheit der Vogten. In het eene zoo wel als in het andere geval, is de geneezing zeer moeilyk, en somwylen zelfs onmoglyk. Alsze van eenen Pypzweeragtigen aart zyn, en gemeenschap oeffenen met een Etterzak van het Borstvlies, het Middenschot, of der Longen, moetenze wanneer niets zulks verbied, door insnyding verwyd worden, en den Lyder onderworpen aan het gebruik van zagte *Balsamica*, en Melkspyzen. In het tweede deezer gevallen zelfs is men somwylen genoodzaakt, om te besluiten tot de doorbooring des Borstbeen.

De

*De Zweeren van den Buik.**Ulcera
abdomina-
lis.*

§ 391.

Deeze behooren veelal tot de klasfe der Pypzweeren, en zyn afhanglyk van eene verzaamling van Etter in het celwys weeffel van het Buikvlies. Haare geneezing vordert, de verwyding der Zweer door infnyding, een drukkend Verband, en het onderfteunen van de kragten des Lyders, die doorgaans in deeze gevallen zeer gering zyn, door het gebruik van zagte Voedzelen, en den Koortsbast.

§ 392.

Sommige deezer Zweeren oeffenen gemeenfchap met den Darmbuis, andere met de Galblaas. De eerften veroorzaaken eene ontlasting der Chyl of van Drekstof, en fomwylen van Wormen. De laatften zyn doorgaans afhanglyk van Galfteenen, welke, na eene voorgaande Ontfteking en vasthegting der Galblaas met het Buikvlies, zig eenen weg baanen naar buiten. In beide deeze gevallen, is de geneezing zeer bezwaarlyk, en kan niet verkreegen worden, dan door het aanwenden van Hulpmiddelen, van welken het hier de plaats niet is, te fpreken.

§ 393.

Als een byzonder foort deezer Zweeren, moet men aanmerken, die de Bekleedzelen van zeer groote Navel of Buikbreuken inneemen, en door de verdunning van deezen, gelegenheid geeven tot openberfting, en uitvalling der Ingewanden. Deezen naamlyk eifchen, ter verhoeding van dit Toeval, eene beftendige horifontaale ligging, een fluitend Verband, en eene zeer fchraale Eetregel.

*De Zweeren van den omtrek des Bekkens.**Ulcera
ambitus
pelvis.*

§ 394.

Tot de Rangfchikking van deezen moeten gebragt worden, de Pypzweeren van den Aars, die des Bilnaais, en de Pokkige, of Kankeragtige Zweeren der uiterlyke Teeldeelen.

§ 395.

De PYPZWEEREN VAN DEN AARS, vertoonen zig altoos in den omtrek *Fistula* *ani.* deezes Deels, en zyn, of volkoomen in eenen volftrekten zin, of onvolkoomen inwendig, of onvolkoomen uitwendig.

§ 396.

§ 396.

*Fistula
ani com-
pleta.*

Een *volstrekt* VOLKOOVEN AARSFISTEL, heeft eene opening in den Endeldarm, en eene andere in het een of ander gedeelte van den omtrek des Aars.

§ 397.

*Fistula
ani incom-
pleta in-
terna.*

Een ONVOLKOOVEN INWENDIGE, opent zig alleen in den Endeldarm, en vertoont uitwendig niets dan eene verharde Zwelling, of liever, eene Zwelling, die in derzelver midden meer of min zagt, maar in den omtrek verhard is.

§ 398.

*Fistula
ani incom-
pleta exter-
na.*

Een ONVOLKOOVEN UITWENDIGE, is uiterlyk zichtbaar, maar oeffent geene gemeenschap met de holte des Endeldarms.

§ 399.

De eerste wordt gekend aan den doorgang van het Tentyzer, of van eenig ingespooten Vogt tot in de holte des Endeldarms, en de ontlasting van Drekstof, door de uiterlyke opening der Pypzweer. De tweede, aan eene ontlasting van Etter door den Endeldarm, gevoegd by eene roode vlek, verharding, of Ettergezwel in eenig gedeelte van den omtrek des Aars. De laatste, aan het doorgaan van het Tentyzer tot aan de buitenste oppervlakte des Endeldarms, en het niet uitwerpen van eenige Drekstof door de opening der Pypzweer.

§ 400.

Alle deeze Zweeren worden geneezen, alleen door de Kunstbewerking, van dewelke wy, by gelegenheid van dit Leerstuk, nader spreken zullen.

§ 401.

Zweeren van deezen aart, afhanglyk van eenige blykbaare ongesteltheit der Vogten, of vergezeld van eenigerlye Borstziekte, zyn ongeneeslyk, of strekken althans meer ten voordeele dan tot nadeel des Lyders, die in deeze omstandigheden, nimmer aan de Kunstbewerking moet onderworpen worden.

§ 402.

*Fistula
perinei.*

De PYPZWEEREN DES BILNAADS, zyn doorgaans afhanglyk van eene indringing der Pis in het Vetvlies, veroorzaakt door eene opening van den Hals des

des Blaas, of van den Pisweg. Eene belemmerde, of geheel belette Pislöozing, door eenigerhande vernauwing van den Pisweg, of eene verharde Zwelling van deszelfs Sponsbol, is de gewoone oorzaak deezer doorbooring van den Pisbuis.

§ 403.

In de meeste gevallen, gaan deeze Zweeren vergezeld van verscheiden verhardingen in het Vetsvies, gemaakt door het Wynsteenagtige van de Pis, daarin verzaameld. Haare geneezing is altoos moeilyk, en kan niet verkreegen worden dan door het verwyden van den Pisweg, door middel van Kaarsjes, en de opsfnyding zoo wel, als verëttering der Pypzweeren. By eene andere gelegenheid, zullenwe het saamenstel en gebruik deezer Kaarsjes aanwyzen; en moeten nu alleen aanmerken, dat deeze vernauwingen niet altoos het gevolg zyn van Poksmet, gelyk sommige voorwenden; maar dikmaalen haaren oorsprong ontleenen van eene Scheurbuikige ongesteltheit der Vogten, van het Graveel, en dergelyken.

§ 404.

De POKKIGE ZWEEREN DER UITERLYKE TEELDEELEN, worden op dezelfde wyze gekend en behandeld als die van andere Deelen. Zy zyn somtyds toevallig, somwylen oorspronglyk; dat is te zeggen, datze dan eens de Venusziekte opvolgen, dan eens dezelve voorafgaan. In het eerste geval zynze moeilyker te geneezen dan in het laatste. In beide gevallen is een mengzel van de levendige Kwik en Varkens reuzel, een der beste Plaatsmiddelen.

*Ulcerata
venerea
partum ge-
nitalia.*

§ 405.

De KANKERAGTIGE ZWEEREN DEEZER ZELFDE DEELEN, beginnen veeltyds by Mannen, aan de Voorhuid; by Vrouwen, aan de Lippen der Schamelheid. Ze zyn somtyds bezet met een sponsagtig Uitwas; somwylen hebbenze veel gelykheid met eene rotte Verzweering. In het eene geval, zoo wel als in het andere, zynze by uitsitek gevaarlyk; maaken in korten tyd aanmerklyke Voortgangen; en veröorzaaken meestentyds den Dood. De bereidzelen der Scheerling, inwendig gegeeven, en genoeg verzagte Loodmiddelen, uitwendig toegediend, is alles wat men in deeze gebreken kan aanwenden.

*Ulcerata
cancrofa
earundem
partium.*

*Ulcerum
membrorum.*

De Zweren der Ledemaaten.

§ 406.

Deeze zyn betreklyk tot beide foorten van Ledemaaten in 't gemeen, of tot de benedenfte in 't byzonder. Tot de eerften behooren voornaamlyk de *Pypzweeren der Gewrigten*; tot de laaften, de *Wolfzweeren*, de *Zweer met Aderfpaten*, en de *Scheurbuikige Huidzweeren der Enklauwen*.

§ 407.

*Fistula
Articularis.*

De PYPZWEEREN DER GEWRIGTEN, zyn doorgaans het gevolg van gestookten of gefchooten Wonden, en fomwylen ook van een Ettergezwel in de nabuurschap des Gewrigts, welks ingeslooten stof, de Beursband doorboord hebbende, zig uitstort in de tusfchenruimte der famengeleede Beenderen. Deeze Zweeren gaan veelyds gepaart met Beenbederf, laaten het Lidvogt bestendig uitvloeijen, en zyn altoos zeer moeilyk te geneezen. Haare behandeling bestaat in het voorzigtig verwyden van den ingang der Zweer door eene insnyding; en het gebruik van vloeibaare Balsemagtige en bederfweerende Hulpmiddelen.

§ 408.

De meeste Zweeren deezer foort, geneezen niet dan met Gewrigts verstyving; 't gene de Heelmeester derhalven, altoos voorspellen moet. Als 'er eenig gering Beenbederf by is, of de Kraakbeenige Korst der faamengeleede Beenhoofden slegts is aangegreepen, is deeze uitkomst ontwyfelbaar. In een hooger graad van Beenbederf, is de Afzetting des Deels het eenig Hulpmiddel.

§ 409.

Lupus.

De WOLFZWEER behoord tot de Klasse der Voortknaagende Zweeren, welkers kenmerken, Oorzaaken, gevolgen, en behandeling, van §. 313. tot 317. beschreeven zyn. Als deeze Zweeren aan de boven binnezyde van den Dyë plaats grypen, zyn ze ten uiterste gevaarlyk niet alleen, maar den meestentyd doodelyk.

§ 410.

*Ulcus
Varicosum*

De ZWEER MET ADERSPATTEN, ziet men vooräl aan de Beenen der Zwangeren, van hun die eene verharde Lever hebben, of een Gezwel 't welk de Stam der Aderlyke Vaten van het Been, meer of min toedrukt. Men kend de-
zelve

zelve aan eene Knoopwyze verwyding der oppervlakkige Aderen van den omtrek, en het ontlasten van eenen kwalyk gestelden Etter.

§ 411.

Droogende Heelmiddelen, een Uitdryvend Verband, rust van het Deel, herhaalde Buikzuiveringen buiten het geval van Zwangerheid, en het toedienen van Geneesmiddelen, overéénkomstig met de blykbaare oorzaak des Gebreks, is alles wat men ter geneezing deezer Zweeren kan aanwenden.

§ 412.

Hoedaanig de Aderpatten zelve, naar eisch haarer byzondere Omstandigheden moeten behandeld worden, zal ik in het *Leerstuk der Gezwellen* aanwyzen.

§ 413.

De SCHEURBUIKIGE HUIDZWEEREN DER ENKLAUWEN, zyn zeer pynlyk, ondiep, hebben binnen eenen bepaalden omtrek zeer veele kleine Ho-^{Ulcers}len, laten doorgaans eene geringe veelheid van een geelächtig, dun, en stinkend ^{Scorbuti-}Vogt uitvloeijen, en zyn omringt van eenen blauwrooden, Ontsteken, of lood-^{ca Cutis}ververwigen Omtrek. ^{malleorum}

§ 414.

Zy worden, hoewel zeer moeilyk, geneezen door het gebruik van tegenscheur-
buikige Geneesmiddelen, verkoelende en zagtelyk droogende aanlegzels, som-
wylen vermengd met verdoovende Hulpmiddelen, een uitdryvend Verband, en
eene aanhoudende Horizontaale plaatzing van het Deel.

§ 415.

Het gebruik van welsluitende Rygkousen, gemaakt van stevig Linnen of
Hondsleder, is in dit geval, en in alle andere Zweeren der Beenen, van eene
zugtige Zwelling vergezeld, zeer aan te pryzen; vooräl by Menschen die ver-
plicht zyn zig zelve te behandelen, of versteeken zyn van Heelmeesters, gewoon
een uitdryvend Verband aan te leggen.

III. H O O F T D E E L.

De Brandingen.

§ 416.

Ambusio. **B**RANDING is eene scheiding des geheels, door eenig daadlyk of vermoogend Vuur aangebragt, meestal verzeld met verlies van Zelfstandigheid, en altoos, met eene brandende Pyn, Ontsteking, Blynen, of Korsten.

§ 417.

Wy neemen hier het woord **B**RANDING, in zyne volle betekenis, en met uitfluiting dier geringe aandoening van eenige Vuurstof, welke van de meeste Schryvers, als de eerste trap van dit gebrek beschouwd is, en alleen door den aanleg van koud Water, Karnemelk, Water en Azyn, of van zelve, geneezen wordt.

§ 418.

Alle branding is niet gelyk aan zig zelve, maar verschild, zoo ten opzigte haarer Oorzaak, als ten aanzien der Deelen welke zy inneemt.

§ 419.

Sommige brandingen naamlyk, zyn afhanglyk van het Huislyk Vuur, andere van den Blikzem, van gloeiende Metaalen, van kookende Vloeistoffen, van Vogten uit hunnen eigen aart brandend, van het Buskruid, en dergelyken. Veelmaalen bepaalen zig de uitwerkzels van deezen by het Huidweefzel, somwylen dringen dezelve door tot in het Lighaam der Spieren, zeldzaam, vernielenze alle zagte Deelen niet alleen, maar ook de Beenderen.

§ 420.

Dat de kenmerken, gevolgen, en behandeling der Brandingen, zig naar deeze omstandigheden regelen, en daar aan gelyk zyn moeten, is van zelfs blykbaar, en verdiend nauwlyks eenige opheldering. Misschien egter zal het niet geheel onnut zyn aan te merken, dat de Brandingen, afhanglyk van gloeiende Metaalen, van den Blikzem, van kookende Oliën, en van Vogten uit hunnen eigen aart

aart brandend, doorgaans meer vernieling maaken, en schadelyker gevolgen hebben, dan anderen: dat de brandingen van het Huidweefzel, algemeen genoomen, weinig; die der Peezen, Zenuwen, voornaame Bloedvaten en Beenderen, het grootste gevaar insluiten: dat de uitgebreide Brandingen van de omvangende Deelen der Borst- en Buiksholten veelmaalen doodelyk zyn: en eindelyk; dat de Brandingen der Ingewanden, van welk eene soort die ook zyn moogen, geheel geene hoop ter geneezing, overlaaten.

§ 421.

De algemeene behandeling der Brandingen, is dezelfde als die der Ontsteking; en bestaat vooräl, in eene koele Levenswys, en het gebruik van verkoelende en Verdunnende Geneesmiddelen, gepaart met Verslappende, en Pynstillende aanlegzels.

§ 422.

De byzondere Behandeling, moet in alle gevallen overéén koomen, met de verschillende trappen der Branding, zoo wel, als met den byzonderen aart der Deelen, welke dezelve inneemt.

§ 423.

In de Oppervlakkige Brandingen van het Huidweefzel, die eenigzints aanmerkelyk zyn, moet men de opgekoomen blynen terstond met eene Schaar doorknippen, en het Deel losjes omwikkelen met doeken, nat gemaakt in *Lyn-Olie*, in een zeer slymig afkookzel van den *Heemstwortel*, of, in eene met veel Olie verdunde *Heemstzalf*. Als dergelyk eene Branding het Aangezicht aantast, bediend men zig enkel van lauwe Zoete- of Karnemelk, van Melk en Water, of van het voorgemelde Afkookzel, met vermyding van alles wat meerder Olieächtig is, en hier gelegenheid geeft, tot eene Roosächtige Ontsteking. De volgende Verbanden moeten bestaan uit Hulpmiddelen, geheel, of immers zoo na mooglyk gelyk aan deezen: uit eene Zalf naamlyk, van versch geperste zoete Amandel Olie en Was; uit de eenvoudige *Heemstzalf*, uit deeze, voor de helft vermengd met het *Ung. album simplex*, en dergelyken. Het *Ung. Dev. Cærul.* dat by verscheiden Heelmeesters, hier toe zeer in gebruik is, hebbe ik dikmaalen gezien, dat veel pyn veroorzaakte, en men om die reeden verpligt was, weder naa te laten. Ik hebbe hetzelfde somwylen waargenoomen van het *Ung. Nutritum*, en meer andere. Misschien is den Ouderdom, en de hier van afhangende scherpte der Olie,

door de Kruidmengers ter saamenstelling deezer Zalven gebruikt, hiervan de oorzaak.

§ 424.

Als de Branding de gantsche zelfstandigheid der Huid, voor een meer of min aanzienlyk gedeelte, in eene doode Korst ontäart heeft, komt vooräl in aanmerking het gebruik van lauwe Pappen, bereid uit enkel Weekmaakende Middelen, zonder eenige byvoeging. Wanneer de spanning en Ontsteking genoeg geweeken is, en de Natuur de afscheiding begint te bewerken der doode Korst, kan men deeze dagelyksch bestryken met den *Terpenthyn Geest*, of bedekken, met de *Heemstzalf*, bedeed met deezen zelfden *Geest*, in de hoeveelheid van 2 of 3 Dragmen, op een Once. Ter zelfder tyd, dog niet eerder, mag men ook de Pap aanzetten met de Kamillebloemen, met de Kruis- en Munt, en dergelyken. De inkervingen, van sommige Schryvers zoo zeer aangepreezen, om aan een verbeeld scherp Vogt uitgang te geeven, hebbe ik in deeze omstandigheden, nimmer noodzaaklyk gevonden. Goed egter is het, dat men ter verhaasting der geheele afscheiding, elk gedeelte der doode Korst, dat los is, met de Schaar wegneeme.

§ 425.

Brandingen, doorgaande tot in het Lighaam der Spieren, gelyk ook dezulke welke tot het Beengestel doordringen, maar bepaald zyn in omtrek, of althans geene groote uitgebreidheid hebben, nog aanmerklyke Bloedvaten, of Zenuwen vernielen, moeten in allen Deele op dezelfde wyze behandeld worden.

§ 426.

In den hoogsten trap van Branding, die het gantsche saamenstel van een Deel vernield, kan men in den eersten tyd niets doen, dan de dreigende Toevallen verhoeden door de Aderlaating, eene verkoelende Eetregel, dergelyke Geneesmiddelen, en den aanleg van zeer zagte weekmaakende Pappen. Naderhand, wanneer de Natuur de scheiding bewerkt van het vernielde, moet men de kragten des Lyders ondersteunen, door het toedienen van voedende Spyzen, en den Koortsbast; en eindelyk, na dat alle zagte Deelen gescheiden zyn, de afzetting des Deels, op de Wyze als in de Verstervingen zal geleerd worden, ter hand nemen. Men begrypt ligtelyk, dat hier alleen gedoelt wort op de Verbranding van eenig aanzienlyk gedeelte der Ledemaaten, als alleen vatbaar zynde voor de Afzetting. In alle andere gevallen is deeze trap van Verbranding doodelyk, of kan men ten minsten, niet meer, dan de algemeene Hulpmiddelen aanwenden. H E.

HEDENDAAGSCHE
ALGEMEENE OEFFENENDE
HEELKUNDE.

DERDE LEERSTUK
VERHANDELING
DER
GEZWELLEN.

I N H O U D.

1 HOOFTDEEL. *De Gezwellen in het algemeen.*

2 HOOFTDEEL. *De haastige Gezwellen.*

1 KLASSE. *De Ontstekingen*

De Ontsteking.

Het ontsteken Gezwel.

De Bloedvin.

De Kool.

De Vorstbuilen.

De Keelontsteking.

Het ontsteken Gezwel des Tandvleesch.

De ontsteking der Oorklier.

De ontsteking der Borsten.

De Lieschbuil.

De Oxelbuil.

De ontsteking der Ballen.

De ontsteking der Voorhuid.

De ontsteking van het Roedenhoofd.

De Vyt.

2 KLASSE. *De Roos.*

3 KLASSE. *De Ettergezwellen.*

Het Ettergezwel.

De nederzettingen van Etter.

De Etterborst.

4 KLASSE. *De Verstervingen.*

3 HOOFTDEEL. *De langduurige Gezwellen.*

1 KLASSE. *De harde Gezwellen.*

Het Knoestgezwel.

De Kanker.

De Krop-klier gezwellen.

Het Kropgezwel.

De

I N H O U D.

De Knobbel Gezwellen.

2 KLASSE. *De Beursgezwellen.*

Het Papgezwel.

— *Honiggezwel.*

— *Boongezwel.*

De Peesknoop.

— *Zenuwknoop.*

Het Vorschgezwel.

De Lipknoop.

3 KLASSE. *Het Vetgezwel.*

4 KLASSE. *Het Spekgezwel.*

5 KLASSE. *De Bloedgezwellen.*

De Bloedvlek.

— *Slagäderbreuk.*

— *Aderspat.*

6 KLASSE. *De Watergezwellen.*

Het Zugtgezwel.

— *Wyegezwel.*

— *Watergezwel.*

De algemeene Waterzugt.

Het Waterhoofd.

— *Watergezwel des Ruggraads.*

De Borstwaterzugt.

Het Buikwater.

De Waterzugt in een beslooten zak.

— *Waterzugt der Gewrigten.*

7. KLASSE. *De Vleeschgezwellen.*

Het Vleeschgezwel.

— *Hoornächtig uitwas.*

De Neusprop.

— *Vleeschagtige Uitwasfen van het Tandvleesch.*

N

De

4 N H O U D.

De Vleeschprop der Vrouwlyke Teeldeelen.

Het Sponsgezwel der Gewrigten.

8. KLASSE. *Het Lugtgezwel.*

9. KLASSE. *De aardächtige Gezwellen.*

Het Kalkgezwel van eene onbekende Oorzaak.

De Kalkknobbels der figtige.

— *Tongsteen.*

10. KLASSE. *Het Galgezwel.*

11. KLASSE. *De Pisgezwellen.*

12. KLASSE. *De Zoggezwellen.*

Het Zoggezwel der Borsten.

De Zogsverplaatsingen.

13. KLASSE. *De Onwaare Breuken.*

De Water-navelbreuk.

— *Bloed-navelbreuk.*

— *Etter-navelbreuk.*

— *Vleesch-navelbreuk.*

— *Ader-navelbreuk.*

— *Vet-navelbreuk.*

— *Waterbreuk des Balzaks enz.*

— *Bloedbreuk des Balzaks.*

— *Zaadbreuk.*

— *Vleeschbreuk.*

— *Etterbreuk van den Bal, en des Balzaks.*

— *Vetbreuk.*

— *Aderbreuk.*

— *Breuk, gemaakt door Waterblaasjes.*

14. KLASSE. *De Werktuiglyke Gezwellen.*

De Vergrooting der Oorklier.

— — — — *Amandelen.*

Het Bal-Lieschgezwel.

15. KLASSE. *De koude Verzweeringen.*

HE.

H E D E N D A A G S C H E

ALGEMEENE OEFFENENDE

H E E L K U N D E.

DERDE LEERSTUK.

VERHANDELING DER GEZWELLEN.

I. H O O F T D E E L.

De Gezwellen in het Algemeen.

§ 427.

Een GEZWEL is eene tegennatuurlyke vermeerdering van de eige uitgestrekt- *Tumor,*
heid eens Deels, gepaart met vermindering, of geheele vernietiging van deszelfs
natuurlyke werkingen.

§ 428.

Alle Gezwellen, tot welk eene soort zy ook moogen betrokken worden, be-
hooren, of tot de harde, of tot de **zachte** Deelen, en, het is onmooglyk, eenig
Gezwel te begrypen, dat niet in een deezer beide zyne Zitplaats heeft.

N 2

§ 429.

§ 429.

De Gezwellen der harde Deelen, behooren niet tot ons Oogmerk. Deeze worden in de Verhandeling van de Ziekten der Beenderen voorgedraagen, en het is daarin, dat men zig aangaande dezelve onderrigten moet.

§ 430.

De byna algemeene Zitplaats der Gezwellen is het Celwyze Weefzel, onder welk eenen Naam ik tevens begrype, het Vetvlies.

§ 431.

De gemeene Teken en der Gezwellen, zyn uit de gegeven bepaaling deezer Ziekte blykbaar. Geen Gezwel naamlyk is 'er, 't welk zig niet door eene vermeerdering van de natuurlyke grootte der Deelen, vergezeld van eene vermin derde of vernietigde Werking, kenbaar maakt.

§. 432.

Onder de Oorzaaken der Gezwellen, zyn eenige *Naatſte*, andere *Afgelegene*.
Cauſa. NAATSTE OORZAAK wordt die genoemd, welke eenig Gezwel op eene on-
proxima. middelyke wyze voortbrengt, en onafſcheidelyk met hetzelfde verknogt is. Eene
Cauſa AFGELEGEN OORZAAK is, die niet anders een Gezwel maakt, dan door be-
Remota. hulp eener naatſte Oorzaak, welke gelyktydig medewerkt.

§ 433.

Sommige deezer Oorzaaken zyn uitwendig, andere inwendig. De eerſten moeten meeftal als bepaalende worden aangemerkt, dat is te zeggen, niet anders doende, dan een Gezwel eerder op de eene plaats, dan op de andere, en meer in het een, dan in het ander Deel voortbrengen. De laaſten zyn weezenlyk; en men kan zelfs zeggen, dat zonder deeze, nimmer eenig Gezwel zal plaats grypen.

§ 434.

Onder de inwendige Oorzaaken, zyn eenige betreklyk tot de Vaſte, andere tot de Vloeibaare Deelen, ſommige, tot beiden te gelyk.

§ 435.

Die der Vaſte Deelen behooren, of tot de vermeerdering en vermindering van

van dezelfver veerkragt, of tot de verbreeking van derzelfver Saamenhang. Alle deeze veranderingen kunnen veelerhande Gezwellen voortbrengen.

§ 436.

Die Oorzaaken, welke alleen tot de Vloeibaare Deelen behoorende, als zuivere Vogtöorzaaken moeten worden aangemerkt, zyn betreklyk, of tot de veranderde Hoeveelheid, of tot de gebreklyke Hoedaanigheid derzelfver, of tot de afdwaaling van plaats.

§ 437.

De hoeveelheid der Vogten is aan eene tweevoudige verandering onderworpen, eene vermindering naamlyk, en vermeerdering. De laatste komt ten opzigte der Gezwellen alleen in aanmerking, en is eene zeer gewoone Oorzaak derzelve, vooräl derzulken, welke onder de haastige gerekend worden.

§ 438.

De gebrekkige hoedaanigheid der Vogten, bestaat in derzelfver Verdikking, Verdunning, Scherptheit van allerlei Aart, en dergelyke; die verschillende Gezwellen voortbrengen, agtervolgens de verscheiden Natuur der Vogten zelve, welke deeze veranderingen ondergaan hebben.

§ 439.

De afdwaaling van Plaats, is eene zeer gewoone oorzaak der gezwellen. Alle Vogten immers, welkers Deeltjes eene grooter middenlyn hebben; dan de middenlyn is van het Vat, in het welke zy by toeval indringen, kunnen niet nalaten, daar in Verstoppen te maaken, welke van opzwellingen agtervolgt worden.

§ 440.

Dat de gebrekkige Hoedaanigheid, en tegennatuurlyke Hoeveelheid der Vloeibaare, gepaart met eene veranderde gesteltheit der vaste Deelen, geschikt zy, om Gezwellen te doen voortkoomen, is gemaklyk te begrypen, wanneer men aanmerkt, dat in dit geval de Oorzaaken vermenigvuldigt worden, en 'er deswegen, sterker uitwerkingen te verwachten zyn, dan wanneer slegts één deezer Veranderingen, op zig zelfs voorhanden is.

441.

Onder de uitwendige Oorzaaken der Gezwellen, behooren inzonderheid, uit-
N 3 ter.

terlyke geweldige aandoeningen, te sterk fluitende omgelegde bindzels, de aandoening van kwaadaartige zelfstandigheden, de beet of steek van venynige Dieren, en het misbruik van de zoogenaamde niet natuurlyke dingen.

§ 442.

Tumores humerales. Alle Gezwellen der zachte Deelen, bestaan, of uit eene ophooping van Vogten, of, uit eene ontäarting van het weefzel der Deelen. Beiden worden gemeenlyk onder den naam van VOGTGEZWELLEN begreepen. In het laatste geval echter, schynd het my toe, dat deeze benaaming zeer onëigen is, vermits 'er alsdan geene ophooping van Vogt, in den gewoonen zin van dit Woord genoomen, plaats heeft; maar alleen eenen verhinderden, of althans veranderden omloop derzelve door de Vaten.

§ 443.

Ik zegge niets van de Tyden, eindwyzen, en behandeling der Gezwellen in het algemeen; om dat alle deeze byzonderheden, met betrekking tot verschillende Gezwellen, verscheiden zyn, en niet zeer gevoeglyk, tot algemeene Regelen kunnen gebragt worden.

§ 444.

Alle Gezwellen der zachte Deelen, kan men in twee soorten, de *Haaftige*, naamlyk, en de *Langduurige*, onderscheiden.

§ 445.

Tumores acuti. Door HAASTIGE GEZWELLEN verstaai ik dezulken, welke alle mooglyke veranderingen voor dewelkeze vatbaar zyn, in eenen korten Tyd doorloopen. Hier onder behooren allerlye soorten van Ontstekingen, de Roos, het Ettergezwel, en de Verstervingen. Het is dit zelfde soort van Gezwellen, welke van veele Heelkundigen onder den naam van HEETE GEZWELLEN beschreeven zyn.

Tumores inflammatorii.

§ 446.

Tumores Chronici. LANGDUURIGE GEZWELLEN zyn, welke, in tegenstelling der Haaftige, alle hunne mooglyke veranderingen, of nimmer, of ten minsten niet, dan in eenen zeer uitgestrekten Tyd, afloopen. Van deezen aart zyn de Harde Gezwellen, de Watergezwellen, de Bloedgezwellen, de Beursgezwellen, de Vleeschgezwellen, de Aardgezwellen, het Lugtgezwel, het Galgezwel, de Zoggezwellen, de Pisgezwellen, de Onwaare Breuken, de Werktuiglyke Gezwellen, en de Koude Verzweeringen.

§ 447.

§ 447.

Alle deeze, dat is te zeggen, de Haastige zoo wel als de Langduurige Gezwellen, zullenwe in twee Hooftdeelen, onder hunne byzondere Klasfen, nader voordraagen.

II. H O O F T D E E L.

De Haastige Gezwellen.

§ 448.

Tot het Geslagt van deezen hebbenwe gezegd dat gebragt wierden, de *Ontstekingen* van allerlye Aart, de *Roos*, het *Ettergezwel*, en de *Verstervingen*. Wy moeten nu aanwyzen, welk de ondergeschikte soorten zyn van deezen, en elk derzelve in het byzonder, dat is, in hunne aart, oorzaaken, kenmerken, gevolgen, en behandeling, onderzoeken.

I. K L A S S E.

De Ontstekingen.

§ 449.

Onder deeze Klasse begrypenwe, de *Ontsteking* zelve, het *Ontsteken Gezwel*, de *Bloedvin*, de *Vorstbuilen*, de *Kool*, de *Keelontsteking*, het *ontsteken Gezwel des Tandvleesch*, het *ontsteken Gezwel der Oorklier*, de *ontsteking der Borsten*, die *der Lieszen*, des *Oxels*, der *Ballen*, der *Voorhuid*, en de *Vyt*.

De Ontsteking.

§ 450.

ONTSTEKING is eene roode, brandende, gespannen, en niet nauwkeurig omschreeven Zwellling van eenig Deel, meestäl verzeld van eenen vermeerderden Omloop; dat is te zeggen, van eene heete Koortsägtige beweeging des Bloeds, door het gantsche Vaatgestel. *Inflam-
matio.*

§ 451.

§ 451.

De Verftopping der uitterfte einden van de flagäderen, fteld BoERHAVE, de verwyding van deeze, ftellen anderen, de waare natuur te zyn der Ontfteking. Wy vinden ons verpligt, het laafte gevoelen te omhelzen, om dat men in verfche Ontftekingen, door het Mes geöpent, eene uitftorting van Bloed aantreft, in de Vakjes van het Celwyze Weefzel.

§ 452.

Ingevolge deezer Befpiegeling, moet men als naafte Oorzaaken deezer Ziekte befchouwen, eene prikkeling der Zenuwen, door het beleedigd Deel verspreid; en hier mede ftemmen ook nauwkeurig overéén, de meer afgelegen Oorzaaken der Ontfteking, en derzelver oploffing, door het gebruik alleen, van zuiver flapmaakende Aanlegzels, en van ontlaftende, zoo wel, als beweegingmaatigende Geneesmiddelen.

§ 453.

De prikkelende Vermoogens, inzonderheid gefchikt om eene Ontfteking voort te brengen, zyn of Uit- of Inwendige. Tot de eerften behooren, de Wonden, Kneuzingen, Beenbreuken, Ontwrigtingen, Brandingen, Scherpe Zelfftandigheden op de Huid toegepaf, eene zeer koude of heete Lugt, en dergelyken. Tot de laaften worden betrokken, allerlye ontäartingen van den Vogthoop, van welk eenen aart dezelve ook zyn moogen.

§ 454.

De Oploffing, Verzweering, en Verfterving, zyn de gewoone uitgangen der Ontfteking, daar fommige nog, hoewel ten onregten, het Knoeftgezwel byvoegen.

§ 455.

De eerfte Uitgang wordt voorfpeeld uit de vermindering der foort onderfcheidende Verfchynzelen van de Ontfteking, in de Bepaaling gemeld: de tweede, uit eene trapswyze vermeerdering van deeze: de derde uit derzelver fchielyke aanwafch tot dien trap, dat de Hitte in Koude, de Pyn in Ongevoeligheid, de Roodheid in Miskleurigheid, en de Spanning in Weekheid veränderd.

§ 456.

Ter Geneezing der Ontfteking, beproeft men altoos eerst de *Oploffing*, en deeze niet mooglyk zynde, de *Verëttering*.

§ 457.

§ 457.

Herhaalde Aderlaatingen, verkoelende Buikzuiveringen, dergelyke Geneesmiddelen, eene koele en zachte Eetregel, slapmaakende en verkoelende Aanlegzels, het gebruik zelfs van zachte Rustverwekkende Middelen na voorgaande genoegzame Ontlastingen, koomen ter bereiking van het eerste oogmerk, inzonderheid in aanmerking.

§ 458.

Hoedaanig aan het tweede Oogmerk voldaan wordt, zal by gelegenheid dat wy spreekken van het Ettergezwel, nader getoond worden.

§ 459.

Dat men in geringe Ontstekingen van het Huidweefzel, die veelyds van zelve verdwynen, het alleen op voorgemelde uiterlyke Aanlegzels kan laten aankoomen, is iets dat ik niet voorby kan hier aan te merken, om alle noodlooze omflag, zoo veel mooglyk zy te verhoeden.

Het Ontsteken Gezwel.

§ 460.

Een Gezwel dat hard, donkerrood, heet, kloppend, pynlyk, meer of min verheeven, en nauwkeurig in zynen omtrek bepaald is, wordt een ONTSTEKEN *Phlegmone.* GEZWEL genoemd.

§ 461.

De Zitplaats deezer Ontsteking is het Vetvlies: derzelver Oorzaaken zyn meest al inwendig: en, aan beide deeze byzonderheden moet men het toeschryven, datze doorgaans niet geneezen word, dan langs den weg van Verëttering.

§ 462.

De behandeling derhalven van het Ettergezwel, welke wy hierna beschryven zullen, moet ook in dit geval plaats grypen, met byvoeging alleen van die Geneesmiddelen, welke de van elders bekende ongesteltheit der Vogten kunnen wegneemen.

De Bloedvin.

§. 463.

Furunculus.

Een BLOEDVIN, is een hard, blauwrood, zeer pynlyk, en ontsteken Gezwel, zelden grooter dan een Duivenëi, en altoos overgaande tot Verëtering.

§. 464.

Deszelfs oorspronglyke Zitplaats is onzeeker, schoon sommige daar toe betrekken, de smeerkliertjes van het Huidweefzel.

§. 465.

Doorbreekende, ontlastze altoos eene bloederige Etter, en bevat in verscheiden kleine hooien, zekere vezelagtige Zelfstandigheid, waar aan men den naam geeft van KERN.

§. 466.

Veele Menschen zyn by uitstek aan dezelve onderhevig, en in dit geval is het waarschynlyk, dat eene byzondere scherpte des Bloeds plaats heeft.

§. 467.

Sterke weekmaakende Middelen, met prikkelende vermengt, zyn in dit gebrek de beste. In het geval, zoo even gemeld, hebbe ik dikmaalen zeer goede uitwerkzelen gezien, van de Zwavelbloemen, in de hoeveelheid van twee Dragmen, dagelyksch toegediend.

*Carbunculus.**De Kool.*

§. 468.

Onder deezen Naam begrypt men een Gezwel, dat gedeeltelyk behoord tot de Klasse der Ontsteking, gedeeltelyk tot die der Verfterving, en de kenmerken draagt van beiden. Van eene onbepaalde uitgebreidheid zynde, is het nogthans nauwkeurig omschreeven, zeer Pynlyk, en heeft eene loodverwige Oppervlakte, hier en daar bezet met verscheiden kleine, en byna zwarte verhevenheden.

§. 469.

Het Vetvlies is in dit gebrek altoos verftikt, en somwylen zelfs zoodaanig, dat,

dat, als het van zelfs doorgebrooken, of met het Mes geöpent is, men, na deszelfs zuivering, de omgelegen Spieren, als ten netsten ontleed waarneemt.

§ 470.

Het is zeer gemeen in Pesttyden, wordt alsdan verzeld van de gewoone kenmerken der Pestziekte, en draagd den Naam van *PESTKOOL*. In dit geval, zynze veelal scheidend, en worden het meest gezien, in den omtrek van het Oor, in de Lieschen, onder de Oxels, en dergelyken. *Anthrax*

§ 471.

In alle andere gevallen, gaat het doorgaans gepaart met eene zieklyke gesteldheid, en zeer groot verval van Levenskrachten.

§ 472.

Ieder zwartächtige verhevenheid, welke wy in deszelfs Oppervlakte hebben aangemerkt, oeffent by zyne, van zelfs gebeurende doorbraak, gemeenschap met eene evenreedige Holte, vervuld met verstikt Vetvlies. Dit heeft gelegenheid gegeven tot den Naam van *Negenöög*, door sommigen daar aan toegeëigend.

§ 473.

De meest pynlyke, grootste, en gevaarlykste deezer Gezwellen, hebbe ik altoos gezien aan den omtrek van den Hals, vooräl, aan deszelfs agterste gedeelte.

§ 474.

Haare behandeling bestaat, in het toedienen van den Koortsbast met Kamfer; het gebruik der meest weekmaakende Pappen, eene opvolgende, ruime, diepe, en somwylen kruiswyze insnyding; en de zuivering der Verzwearing, door den Terpentyn Geest, met Plukzel aangelegt, en overdekt van eene eenvoudige Gortpap.

§ 475.

In de waare *Pestkool*, moet men inwendig gebruik maaken van de Hulpmidde-len, door verscheiden Geneeskundigen daar in voorgeschreeven, en uitwendig dezelfde behandeling aanwenden.

De Vorstbuilen.

§ 476.

Harde, roode, glimmende, en zeer jeukende Huidknobbels, van verschillende grootte, door Koude veroorzaakt, worden **VORSTBUILEN** genoemd.

§ 477.

De meest gewoone Zitplaatsen van deeze, zyn de Vingers, de Handen, de Teenen en de Hielen. Kinderen zyn voor dezelve meerder bloot gesteld dan Volwasfenen. Aan sommige Menschen schynenze zelfs heilzaam te zyn voor de Gezondheid.

§ 478.

Het beste behoedmiddel voor dezelve, is, zig zorgvuldig te wagten voor schielyke veranderingen van Koude en Warmte; en voorgemelde Deelen, by het naderen van den Winter, vroegtydig voor de aandoeningen der Lugt te beveiligen.

§ 479.

Ter oplossing deezer Knobbels, onmiddelyk na haare verschyning, moet het aangedaane Deel met koud Water of Sneeuw gewaschen worden, en vervolgens gesmeerd met een mengzel van de Laurier Olie, Veneetsche Terpentyn, en een weinig Kamfer.

§ 480.

Alsze doorbreken, behandeld men de Verzweering dagelyks met Raapölie, Was, en eene zeer kleine hoeveelheid Terpentyn Geest; met de Heemstzalf, en deezen zelfden Geest; en, by Menschen die geene vette of prikkelende Middelen op de Huid verdraagen kunnen, met de blauwe Bescherm pleister, of dergelyken.

De Keelontsteking.

§ 481.

Onder den naam van **KEELÖNTSTEKING**, begrypt men in 't algemeen, alle die Ziekten, welken de Slikking of Ademhaaling belemmeren, en hunne zitplaats hebben in de Amandelen, het Verhemelte, het Hoofd des Slokdarms, of het Strottenhoofd.

§ 482.

§ 482.

In het byzonder wordt daar door verstaan, eene heete, brandende, en gespannen Zwelling van één of meer deezer Deelen, vergezeld van eene verhinderde Doorzwelging, en aanhoudende Koorts. In deezen zin alleenlyk is het, dat wy het woord *Keelontsteking*, ter deezer plaatze willen genoomen hebben.

§ 483.

De Keel-ontsteking is zichtbaar, of onzichtbaar; met, of zonder Zwelling der uitwendige Deelen van den Hals; en, of Roosächtig, of waarlyk ontsteken.

§ 484.

In het eerste geval is de zitplaats der Ziekte in het Verhemelte, de Amandelen, of het bovenste gedeelte van het Hoofd des Slokdarms. In het tweede, in het Strottenhoofd, of het benedenste van het Hoofd der voorgemelde Buis. In het derde neemtze tevens het Vetvlies in tusfchen de Halspieren. In het vierde isze bepaald aan de inwendige Deelen. In het vyfde beruſtze alleenlyk in het binnenſte Bekleedzel van voorgemelde Deelen, is geelrood van kleur, ſtekend, en verzeld van eene algemeene vermoeidheid, huiveringen, en eene wel Koortsächtige dog kleine Polsſlag. In het laaſte geval, dringtze meerder door in de Zelfſtandigheid dier Deelen, en heeft alle kenmerken der Ontſteking, in de algemeene bepaaling deezer Ziekte, § 450. beſchreeven.

§ 485.

De zichtbaare waare Keel-ontſteking, gaat veelmaalen over tot Verëttering. De Onzichtbaare, vooräl die van het Strottenhoofd, veröorzaakt ſomwylen eene dooddreigende Verſtikking. In de Roosächtige, is de geneezing gemaklyk, alsze van den beginne af, wel behandeld wordt. De Keel-ontſteking van het eerste ſoort, gepaart met zwelling der uitwendige Deelen van den Hals, verwekt ſomtyds uitwendige Verzweeringen, die meer of minder moeilyk zyn, naar maate van haare uitgebretheid. Die van het tweede ſoort, in hetzelfde geval zynde, heeft zeldzaam gelyke uitkomſt. De Roosächtige Keelontſteking, verwaarloosd, of kwalyk behandeld zynde, wordt niet zelden gevolgt van Verſterving.

§ 486.

In beide ſoorten van waare Keel ontſteking, moet men de oploſſing beproeven

door dezelfde Hulpmiddelen, welke voor die der Ontstekingen in het algemeen, zyn aangepreezen; met byvoeging van zachte oplosfende Gorgeldranken, inspuitingen, den aanleg van Bloedzuigers, drooge Koppen in den Nek, en dergelyken.

§ 487.

In de Roosächtige Keel ontsteking is eene enkele lating, vroegtydig gedaan, dikmaalen beslissend; en koomen voor het overige te pas, verkoelende Buikzuiveringen, doorwaassende Geneesmiddelen, en Gorgeldranken, bereid uit een afkookzel of aftrekzel van Vlierbloemen, Salpeter, en Stroop van Moerbeziën. Azyn en Water met Honig verzagt; Vlieräzyn op gelyke wyze vermengd; en meer andere soortgelyke Hulpmiddelen, kunnen insgelyks tot Gorgeldranken gegeven worden.

§ 488.

Als eene zichtbaare waare Keel ontsteking overgaat tot Verëtering, moeten de Gorgeldranken enkel weekmaakend zyn, en vooräl bestaan uit een afkookzel van Vygen in zoete Melk. De Verëtering volkoomen zynde, kan men somwylen de doorbraak aan de Natuur beveelen; en is men somtyds verplicht, om de Etterzak te openen met de *Pharyngotomus*. Het zoo even gemelde Afkookzel, of eenig ander Middel van gelyken aart, is ter behandeling der nablyvende Verzwering, genoegzaam.

§ 489.

Keelöntstekingen van allerlyë aart, tot die hoogte gekoomen, dat de Ademhaaling byna geheel onderdrukt wordt, eischten de Strotfnede.

§ 490.

Eene Versterving, volgende op eene Roosächtige Keelöntsteking, moet inwendig behandeld worden met de Koortsbast en Kamfer; uitwendig met den Geest van Zeezout, en Stroop van Viöolen of Roozenhoonig, en dergelyken.

§ 491.

Verscheiden soortelyke Hulpmiddelen, van tyd tot tyd aangepreezen ter geneezing van allerlye soorten van Keelöntsteking zonder onderscheid, zynwe met stilzwygen voorby gegaan, omdat ons oogmerk niet is te spreken van Hulpmiddelen, wier vermoogen wy niet genoeg hebben leeren kennen door eigen Onder-

vin-

vindingen, of die van de meest beroemde Genees- en Heelkundigen van onzen Leeflyd.

Het ontsteken Gezwel des Tandvleesch.

Parulis.

§ 492.

Wat hier door verstaan wordt is van zelfs kenbaar. Meestäl geeft eene bedorven Tand daar toe aanleiding. Somwylen egter, bestaat het onafhangelyk van deeze.

§ 493.

In beide gevallen gaat het doorgaans over tot Veröttering, en is zelden vatbaar voor Oplosfing. In het laafte geval is de Geneezing dikmaalen moeiliker dan in het eerfte, uit hoofde inzonderheid van deszelfs oorzaaken.

§ 494.

Het uitwendig gebruik van weekmaakende Pappen; Mondspoelingen van denzelfden aart; het aanleggen van doorgespuwen Vygen; zyn in elk deezer gevallen de befte Hulpmiddelen ter bevordering der Veröttering.

§ 495.

Doorgebrooken, of met het Lancet geöpent zynde, voltrekt men de Geneezing met witte Wyn en Roozenhoonig, of met dit mengzel, bedield met een weinig *Tinct. Myrrhæ*. In het eerfte geval intusfchen, wordt de heeling zeldzaam verkreegen, of is althans zeldzaam bestendig, zonder dat de bedorven Tand wordt uitgetrokken.

De Ontfteking der Oorklier.

Parotis.

§ 496.

De Natuur, plaats, en werking der Oorklier, is uit de Ontleedkunde bekend, en hier door begrypt men ligtelyk, de plaats, omfchryving, en verschynzelen der Ontfteking, welke dit Deel inneemt.

§ 497.

Somwylen bestaat dezelve op zig zelfs, en geniet het Onderwerp waarinze
VOOR-

voorkomt, eene anderzints volkoomen gezondheid. In andere gevallen isze afhankelijk van eene heete Koortsächtige Ziekte, en diend tot scheiding van deeze. Men moet deeze verscheidenheid wel in agt neemen, als de voornaame Regelmaat zynde haarer Behandeling.

§ 498.

In het eerste geval naamlyk, is het niet slegts geoorloofd, maar zelfs noodzaaklyk, dat men de oplossing beproeve door het aanwenden dier Hulpmiddelen, welke wy ter oplossing der Ontstekingen in het algemeen, § 457, hebben aangewezen.

§ 499.

In het laatste daarëntegen, moet men de Verëtering zoo veel mooglyk zy bevorderen door weekmaakende en te gelyk prikkelende Pappen, met vermyding van alles wat onder den naam van ontlastende, verkoelende, afleidende, of Rustverwekkende Middelen bekend is.

§ 500.

In het eene geval, zoo wel als in het andere, is het openen des Gezwels, voor en alëer de Verëtering volkoomen is, schadelyk. In het eerste is het onverschillig op hoedaanig eene wyze dezelve gedaan wordt. In het laatste geeft men daar toe den voorrang aan Bytmiddelen.

Inflam-
matio
Mammæ.

De ontsteking der Borsten.

§ 501.

Kraamvrouwen zyn aan dit gebrek inzonderheid onderworpen, en vooräl zy, die zig zelve niet behoorlyk in agt neemen, of het zoogen haarer Kinderen overlaaten aan anderen.

§ 502.

Deeze Ontsteking bepaald zig alleen by het Huidweefzel, of breid zig uit tot het Vetvlies, en in de Mamschyf. De eerste soort is Roosächtig, en wordt veelal, en ligtelyk geneezen door den weg van oplossing. De twee laatste soorten zyn waare Ontstekingen, en eindigen den meesten tyd, door Verzweering.

§ 503.

In alle egter moet de geneezing door oplossing, volgens § 457. beproefd worden,

den, en deeze niet slagende, bewerkt men zoo haast doenlyk de Verëttering. Wy zullen in de beschryving van het Ettergezwel, de middelen hier toe dienstig, aanwyzen; en moeten nu alleen aanmerken, dat de sterkste van deezen, in dit geval de beste zyn, om dat 'er by eene onvolleedige Verzweering, doorgaans Verhardingen overblyven, welken zeer moeilyk zyn te overwinnen.

§ 504.

Algemeen genoomen, is eene vroegtydige opening deezer Verzweeringen schadelijk, en moet, zoo veel mooglyk zy, vermeid worden. Dit is vooräl waar, aangaande die van de Mamschyf. Dezulken, welke agter dit Deel, in het Vlies plaats grypen, moet men op allerlye wyzen tragten te bepaalen naar onderen, langs welk eenen weg zy met het meeste voordeel kunnen ontlast worden.

§ 505.

Sommige deezer Ontstekingen maaken een Ettergezwel, dat zeer nauwkeurig in zynen omtrek bepaald is, in de nabyheid van den Tepel. Men moet dit van zelfs laten doorbreeken, dewyl zulks meestäl geschied met eene opening, groot genoeg om eene vreijs ontlasting toetestaan aan den ingeslooten Etter.

§ 506.

De Verhardingen, na voorgaande Verzweeringen in de Mamschyf agtergebleeven, worden mischien met niets beter opgelost, dan met eene dik gesmeerde Pleister van de een of ander der weekmaakende Zalven, meer of min bedeed met de nedergedrupte Wynsteen-olie.

De Lieschbuil.

§ 507.

Een ontsteken Gezwel der Lieschen, onäfhanglyk van eene verplaatzing der Buksingewanden, word een LIESCHBUIL genoemd.

*Buboin-
guinalis.*

§ 508.

Dit gebrek bestaat zeldzaam op zig zelve, maar is veeläl afhanglyk van eene nederzetting der stof van eenigerlye heete Ziekte, en van Venusmet.

§ 509.

In het eerste geval moet men op alle mooglyke wyze de Verëtering bevorderen, door sterk weekmaakende en eenigzints prikkelende Pappen. In het laatste bewerkt men zoo haast doenlyk, de oplossing, door de Aderlaating, mercuriaale dog niet zeer verhittende Purgeermiddelen, den aanleg der Kwikpleister, en dergelyken.

§ 510.

De opening deezer Gezwellen, alsze tot rypheid gebragt, of in wêerwil van alle onze poogingen ter oplossing, van zelfs gekoomen zyn, geschied beter met het Bytmiddel, dan met het Mes; om dat op de eerste wyze een voordeelig verlies van zelfstandigheid gemaakt wordt, en op de laatste eene belemmerde binnenwaardsche omkrulling van de randen der insnyding.

De Oxelbuit.

*Bubo
axillaris.*

§ 511.

Dit gebrek is ten opzichte van deszelfs natuur en oorzaaken, vry gelyk aan het voorige; dog veel zeldzaamer afhanglyk van Venusfmet.

§ 512.

Als het onafhangelijk is van eene heete Ziekte, kan de oplossing beproefd worden, en slaagt dezelve veelmaalen gelukkig. In het tegengestelde Geval, is de Verëtering volstrekt noodzaaklyk, en moet ten spoedigste bevordert worden.

De Ontsteking der Ballen.

*Inflam-
matio
Testiculi.*

§ 513.

Gestookten Wonden, Kneuzingen, Venusfmet, het gebruik van Ettermaakende Kaarsjes in de behandeling der Ziekten van den Pisweg, zyn de meest gewoone Oorzaaken van dit gebrek, dat doorgaans verzeld is van Koorts, Lendenpyn, en dergelyken.

§ 514.

Deszelfs geneezing moet altoos beproefd worden door oplossing, waar toe, in het derde geval, Mercuriäale Buikzuiveringen, en oplofende Stovingen met de
Gomäg-

Gomächtige Kwik bedeed; in de twee eerste gevallen, de gewoone hulpmiddelen ter oplossing der ontstekingen in het algemeen; en in het laatste geval, het nalaaten van het gebruik der Kaarsjes voor eenige Dagen, en eene verkoelende Levenswys, vooral in aanmerking koomen.

§ 515.

Als deeze ontsteking, in weêrwil van alle onze voorzorgen, overgaat tot Verëtering, zyn weekmaakende Pappen de beste Plaatsmiddelen, en moeten alle onlastende Middelen worden nagelaaten. De Opening des Etterboezems, geschiede in dit geval met het Mes, nooit door Bytmiddelen; en men behandle de verzeuring, met zeer zagte en eenigzints Balsëmächtige Heelmiddelen. Als 'er Venusmet mede vergezeld gaat, moeten deeze middelen bedeed worden met eenig Kwikbereidzel; en inwendig, deeze en de Houtdranken, gegeven worden.

De ontsteking der Voorhuid.

§ 516.

De ONTSTEKING DER VOORHUID, is somwylen afhanglyk van de gemeene oorzaaken der Ontsteking, maar meestal van Venusmet; en is in het laatste geval, doorgaans verzeld van een Druiper of Sjankers. *Inflam-
matio.
Praeputii.*

§ 517.

In beide omstandigheden, klimtze somtyds tot zulke eene hoogte, dat de Glans geheel niet kan ontdekt worden, en 'er zelfs, eene zeer belemmerde Pisloozing plaats grypt.

§ 518.

Badingen van het Deel in Slapmaakende en oplofende Vogten; Omflagen of Pappen van gelyken aart; de Aderlaating; Verkoelende Buikzuiveringen; dergelyke, en verdunnende Geneesmiddelen; bewerken doorgaans de oplossing deezer Ontsteking, afhanglyk van de eerstgemelde Oorzaaken.

§ 519.

De Venerische Ontsteking van dit Deel, eischt Mercuriäale Purgeermiddelen; bereidzelen van deeze Mynstof, vermengt met de Houtdranken, of anderen; oplofende Stovingen met Kwik bedeed, en veelvuldige badingen in Melk en Water, waar in een weinig Zoete Kwik is opgelost.

§ 520.

Wanneer de eerste foort deezer Ziekte zoo verre gaat, datze Verfterving, of eene geheele opstopping der Pis dreigt; en de laatste tot eene zelfde hoogte opklimt, of gepaart gaat met Sjankers aan de binnenste oppervlakte der Voorhuid, of aan het hoofd der Roede, is de opfnyding van het eerstgemelde Deel, het voornaame hulpmiddel.

*Inflam-
matio
glandis.*

De Ontsteking van het Hoofd der Roede.

§ 521.

Deeze is fomtyds afhanglyk van eene toevallige terugtrekking der Voorhuid; fomwylen is ze oorspronglyk, en heeft deeze zelfde terugtrekking ten gevolge. In beide gevallen, draagtze den naam van de verändering der Voorhuid, die als een Kraag maakt, rondöm het begin van het Roedenhoofd.

§ 522.

Tot het eerste geval, geeven verscheiden Oorzaaken aanleiding. Het laatste, is het meest gewoon gevolg eener onzuivere Byflaap.

§ 523.

In beide gevallen zonder onderscheid, moet men aanstonds gebruik maaken van de Aderlaating, verkoelende Purgeermiddelen, eene Koele en Verdunnende Eetregel, dergelyke Geneesmiddelen, en Slapmaakende Badingen, Stovingen, Pappen en dergelyke. De teruggetrokken Voorhuid, brengt men, zoo draa de gelegenheid zulks toelaat, met de Vingeren voorwaards.

§ 524.

In Omstandigheden, waarin het laatste onmooglyk blyft, 't zy uit hoofde van de zeer groote spanning der teruggetrokken Voorhuid, 't zy uit kragt der zwelling van het Roedenhoofd; en het laatstgemelde Deel gevaar loopt om te vallen in Verfterving; zyn de langwerpige doorkervingen der klemmende Voorhuid, onvermydelyk. Dat het woord *langwerpig*, hier betreklyk gemaakt wordt tot de natuurlyke strekking der Roede, is iets, 't welk men wel moet aanmerken.

§ 525.

§ 525.

De pokkige Ontsteking deezer soort, zoo veel vermindert zynde, dat de Voorhuid weder over het Roedenhoofd kan gebragt worden, en de ontlasting der Pis, te vooren veelal belemmerd, vry is, moet men ter volkoomen geneezing brengen, door Kwikmiddelen, zoo Uit- als Inwendig toegediend.

De Vyt.

§ 526.

Alle Ontstekingen, aan eenig gedeelte der Vingeren, maar vooral aan derzelver einden plaats grypende, worden onder den naam van V Y T begreepen.

§ 527.

De Zitplaats deezer Ziekte is verschillend, en dus ook, derzelver kenmerken, gevolgen, en behandeling.

§ 528.

In sommige gevallen bepaald zig dezelve geheel tot het Huidweefzel, en eindigt doorgaans in eene blaar, met Etter gevuld, en van eene onbepaalde Uitgebreidheid. Dit soort is het minst pynlyk van allen, bestaat veelal den omtrek van den Nagel, breid zig somwylen uit tot onder denzelven, wordt in zyne eerste opkomst dikmaal te keer gegaan door het gebruik eener genoeg verslapte Azyn van Goudglid, en, in zynen staat zynde, geneezen, door het wegnippen der Blaar, den aanleg van droog Plukzel, en het trapswys afnyden van den gedeeltelyk losgemaakten Nagel. Sommige Heelmeeesters, geeven aan dit gebrek den naam van *Reduvia*.

§ 529.

Een tweede soort van Vyt, is betreklyk tot het Vetvlies, voor zoo veel dit, onmiddelyk onder de Huid gelegen is. Deeze ontsteking is veel pynlyker dan de vorige, en maakt eene verheven Zwelling, die niet slegts den Vinger, maar somwylen zelfs de Hand, voor een meer of min aanmerklyk gedeelte inneemd. Zeldzaam is dezelve vatbaar voor Oplossing; doorgaans gaatze over tot Verzwearing. Zy wordt best behandeld met weekmaakende Pappen; met het doen eener tydige en ruime insnyding; en met de Verzwearing te verbinden met zachte balsemagtige Hulpmiddelen.

§ 530.

Het derde soort deezer Ziekte, heeft zyne Zitplaats in de schede der Peezen, is zeer pynlyk, weinig verheeven, en maakt dikmaalen Etterholten, welke zig tot in den Handpalm uitstrekken. De Pyn, aan dit gebrek eigen, is niet slegts plaatslyk, maar doet zig tevens gevoelen langs den gantſchen Onderarm, die, zoo wel als de Hand, veelmaalen gezwollen en ontſteken is. Eene ſchielyk gedaane en ruime inſnyding, die tot in den Peeskooker doordringt, is in dit geval het voornaame Hulpmiddel. De verbanden moeten beſtaan uit *Balsamica*, met byvoeging van weekmaakende Pappen, gelegd over alles wat ontſteken, of gezwollen is.

§ 531.

Het laaſte soort van Vyt, is opzigtelyk tot het Beenvlies, uitermaaten pynlyk, maakt geene merklyke Zwelling, en wordt doorgaans gevolgt van Beenbederf. Men moet in deeze omſtandigheid, de oorspronglyk pynlyke plaats, zoo ſpoedig als immer mooglyk is ruim opſnyden, en daar by het Mes ſtoutelyk tot op het Been toe doordrukken. De Verbanden kunnen gelyk zyn aan die der twee voorige ſoorten, en moeten nimmer geſchieden met eene ſterke opvulling. Als dit gebrek het uiterſte einde eens Vingers inneemt, en reeds verzelde is van Beenbederf, wordt meeeſtentyds het laaſte Kootje geheel afgeſcheiden, en verkort de Vinger naar evenreedigheid. Op alle andere plaatſen, gebeurt zulks niet altoos, en beſpeurd men veelmaalen, ſlegts eene geringe afſchilfering.

§ 532.

Eene aanmerking van veel gewigt omtrent alle Soorten deezer Ziekte is; dat, hoedaanig derzelver verwoeſtingen, met betrekking tot den Vinger ook zyn mooge, men zig nimmer moet verhaaſten met de Afzetting; om dat, zelfs de meeeſt wanhoopende gevallen van deezen aart, onder eene oplettende en regelmaatige behandeling, dikmaalen geneezen zyn, behoudens de geheelheid van het Deel, en deſelfs meeeſte, indien niet alle beweegingen. Dit is miſſchien een voorregt, byzonder eigen aan de Vingeren, en 't geene tot nog toe my buiten de noodzaaklykheid geſteld heeft, om ooit deeze Konſtbewerking te verrigten, in weerwil van het verbaazend aantal deezer Gebreken, door my behandeld.

2. K L A S S E.

De Roos.

§ 533.

De Roos, is eene Uitgebreide, bleekroode, heete, Jeukende of stekende, *Erysipelas*, en niet zeer verheeven Zwelling, die als ze met de Vingeren gedrukt wordt, haare roodheid verliest, maar na het ophouden der drukking, dezelve oogenbliklyk herneemt.

§ 534.

Deeze Ziekte is somwylen verzeld met Ontsteking, somwylen met een Zugtgezwel, en wordt in het eerste geval genoemd, *Roos met Ontsteking*, in het laatste, *Roos met Zugtgezwel*.

§ 535.

De meest gewoone Zitplaatsen der Roos, zyn het Aangezigt, en de Beenen; alle andere Deelen egter, zyn daar van niet geheel uitgeslooten.

§ 536.

De Roos is Oorspronglyk, of Toevallig: dat is, op zig zelfs bestaande, of gevolgt op eenigerhande Ziekte, of uiterlyke beleediging. In het eerste geval, wordtze veelal veröorzaakt, door eene verhinderde of belette Doorwaasfeming; in het laatste, van eene, naar de Huid gevoerde scherpte, geringe beleediging der Huidzenuwen door uitwendig aangebragte prikkelende Vermoogens, en dergelyken.

§ 537.

Somwylen is deeze Ziekte *Hebbelyk*, en als eigen aan byzondere Voorwerpen: zomtyds is ze *Epidemisch*, en treft in een zelfden tyd verscheiden Ondeelige. De *Goedäartige*, die gemaklyk geneezen wordt; de *Kwaadäartige*, die zeer veele onheilen veröorzaakt; de *Belroos*, waar in veele, met scherp Vogt vervulde kleine Blaasjes gezien worden; het *Springvuur*, dat eere aanéenschakeling is van donker Roode, Jeukende, brandende, en zeer pynlyke blyntjes; en de *Gordelroos*, die van denzelfden aart is, maar zig tot den omtrek van den Buik bepaald, kunnen by alle deeze foorten, nog gevoegd worden.

§ 538.

§ 538.

Geene deezer foorten fluit eenig merklyk gevaar in zig, zoo lang ze by de Uiterlyke Deelen bepaald blyven. Het gevaar neemt toe, wanneer door eenigerlye oorzaak, de Roosstof gevoerd wordt naar de inwendige Deelen; en wordt dringend, als zulks plotslyk geschied naar de Hersenen, de Longen, de Maag, of de Darmen.

§ 539.

De eerste verplaatsing, die eene Ontsteking der Hersenen veröorzaakt, besluit men dat plaats heeft, wanneer, na het verdwynen der uiterlyke verschynzelen §. 535. gemeld, de Zieken klaagen over ondraaglyke Hoofdpynen, de Oogen ontsteken, en Ylhoofdigheid, Stuiptrekkingen, of dergelyke te voorschyn koomen. De tweede is kenbaar aan eene moeilyke en benauwde Ademhaaling, zeer groote beklemtheid van de Borst, en onöphoudelyk Hoesten. De laatste wordt aangewezen, door Walging, Braaking, Ontsteken Kolykpynen, en wat dergelyken meer zyn.

§ 540.

De Roos, plaatslyk bepaald blyvende, eindigt meestäl, onder eene regelmaatige behandeling, door Oplosfing. Somwylén egter, wordtze gevolgt van Veröttering, Verfterving, of Verharding. De anderzints gezonde of Zieklyke gesteltheit des Lyders, deszelfs Ouderdom, Levenswys, en kragten, gevoegd by de verschillende Oorzaaken der Ziekte, en de meer of min goede Geneeswys, welke men heeft aangewend, zyn de voornaame Oorzaaken deezer verschillende veränderingen. De onderscheiden Natuur van het aangedaane Deel daarénboven, en deszelfs verschillende afstand van het middenpunt des Omloops, bepaalen insgelyks deeze uitkomsten.

§ 541.

Eene eenvoudige Roos, in een anderzints gezond Lighaam, door eene verhinderde Doorwaasseming voortgebragt, wordt ligtelyk geneezen door eene koele Ketregel, een verkoelend Laxeermiddel, het veelvuldig drinken van een Waterägtig aftrekzel van Vlierbloemen met Salpeter, en zig wat meer dan gewoon te beveiligen, voor de aandoening eener koude Lugt, Togt, Nevel, en dergelyken.

§ 542.

In een zelfde soort van Roos, afhanglyk van eenigerlye prikkelende Vermoo-
gens

gens op de Huid toegepast, voldoet men somwylen, met het aangetaste Deel te zuiveren door Wasfching, en een omslag van Vlieräzyn, met Water in eene zekere maate verflapt.

§ 543.

Wanneer de Roos oorspronglyk is uit eene fcherpte, in de Vogten bevat en naar de Huid gevoerd, koomen vooräl in aanmerking, verzagtende, verdunnende, en doorwaasfemende Geneesmiddelen; en op het laaft der behandeling, eenige herhaalde dog niet zeer fterke noch verhittende Buikzuiveringen. Matrasjes, met Vlierbloemen en een weinig Kamfer gevuld, kunnen in dit geval, uitwendig gebruikt worden.

§ 544.

In de hebbelyke Roos, die veeläl van gelyke oorzaak afhangt, dienen dezelfde Hulpmiddelen; en ter verhoeding van nieuwe aanvallen, een langduurig gebruik der verdikte Uittrekzels van de Sarsaparil-wortel en het Guajac-hout, met eene kleine hoeveelheid zoete Kwik. De Bloem van Zwavel, dagelyks in de hoeveelheid van twee Dragmen gegeven, voldoet ook fomwylen zeer wel aan dit Oogmerk. Als deeze foort, gelyk dikmaalen het geval is, van eene te zeer broeiende Levenswys, en het veelvuldig gebruik van warme waterägtige Dranken afhangt, moet men het een en ander traspwys nalaaten, en eene koeler Leefwys, koude en verfterkende Dranken, in de plaats fteflen.

§ 545.

De Belroos, die meefstal gezien wordt in het Aangezigt, wordt beft behandeld, met het toedienen van zagte en verkoelende Laxeermiddelen; met het Aftrekzel §. 541. befchreeven; met het doorknippen der Blynen als ze zig niet van zelfs openen; met beftrooijingen met het Roos-Poeijer van MYNSICHT, of eenig ander van gelyken aart; en met de opkoomende korften nu en dan te betten met een Spons, nat gemaakt in lauwe Karnemelk, waarin men wat Vlierbloemen heeft afgekookt.

§ 546.

In het Springvuur, dat fomwylen zeer hardnekkig is, moet men inwendig gebruik maaken van dezelfde Geneesmiddelen, als §. 541. zyn aangepreezen; en uitwendig, van eene met Water verflapte Azyn van Goudglit, van Melkroom, vermengd met eenig opflorpend Poeijer, of van het Ung. Nutrit, bedeed met eene zekere hoeveelheid loodzuiker.

Q

§ 547.

§ 547.

De Gordelroos, is voor dezelfde behandeling vatbaar, en vordert geene byzondere Geneeswyze.

§ 548.

Als de Roos saamengesteld is met Ontsteking, 't gene men uit de saamenlopende verschynzelen van beide Ziekten afleid, is de Aderlaating onmybaar, en moet men verkoelende, verdunnende, en doorwaasfemende Geneesmiddelen voorschryven. Uitwendig gebruikt men in dit geval, slapmaakende Pappen of Stovingen, bedeed met Vlierbloemen.

§ 549.

Indien, en Roos, en Zugtgezwel saamenloopen, moet men veelmaalen den Buik zuiveren, wel met verkoelende, dog tevens met werkzaame Laxeermiddelen, en het lydend Deel behandelen, met versterkende en Oplosfende Stovingen.

§ 550.

In alle foorten van Roos zonder onderscheid, waar by de Pols vol en snel, en de dorst zeer groot is, kan de Aderlaating niet ontbeerd worden, en moet zelfs alle andere hulpmiddelen voorafgaan. Hetzelfde is waar, als de huiveringen zeer groot zyn, de Borst beklemd is, en de Roosstof niet genoeg naar de Huid gevoerd wordt.

§ 551.

Hoedaaig men in het geval eener terug gedreeven Roos, zyne behandeling moet inrigten, behoord tot de Onderwerpen der Geneeskunde, waar van het hier de plaats niet is te spreken. De Overgangen deezer Ziekte, in Verzwearing, Verfterving, en dergelyken, zullen ten aanzien hunner Geneeswyze, in de twee naastvolgende Onderdeelingen beschouwd worden.

3. K L A S S E.

De Ettergezwellen.

§ 552.

De Gezwellen tot deeze Klasse behoorende, zyn het *Ettergezwel* zelve, de *nederzettingen van Etter*, en de *Etterborst*.

Het

Het Ettergezwel.

§ 553.

Het E T T E R G E Z W E L is eene meer of min bepaalde, en omschreeven Zwelling, *Abscessus.* gevolgt op eene plaatslyke Ontsteking, of Ontsteken Gezwel, en gemaakt door eene verzaamling van Etter, in het Vetvlies.

§ 554.

E T T E R wordt genoemd, eene witte, eenigzints lymige, meer of min gebonden, riek- en smaaklooze Vloeistof, bestaande in zyn saamenstel, uit Wye, *Pus.* Olie, Water, verbrooken Vetcellen, dergelyke Vaten van verschillenden Aart, en meer andere ongelykslagtige Deelen.

§ 555.

Men voorspeld de vorming van een Ettergezwel, wanneer de gewoone verschynzelen der Ontsteking, §. 450. opgeteld, in weêrwil van alle poogingen ter oplossing, bestendig toeneemen, en de Pyn meerder kloppend, meer tot een zeeker punt bepaald wordt.

§ 556.

Dat de Etter bereid, en het Ettergezwel tot den staat van Rypheid gekoomen is, wordt voornaamlyk aangewezen, door eene meer of min duidelyke Vogtgol- ving, welke men waarneemt, als het Gezwel met twee tegenöver elkander ge- stelde Vingeren, beurtelings gedrukt wordt; door de zagtheid, witheid, en on- pynlykheid van deszelfs toppunt; door het verminderen van de bekende verschyn- zelen der Ontsteking; en door het ontvellen van het meest verheeven gedeelte der Zwelling.

§ 557.

De behandeling van het Ettergezwel, bepaald zig geheelyk, tot het bevorderen der Ettermaaking, de Ontlasting van den ingeslooten Etter, en de heeling der nablyvende Verzweering.

§ 558.

De Ettermaaking wordt bevorderd, door het gebruik van enkel weekmakende Pappen, en eene Aderlaating, als de Lyder jong, sterk, volbloedig, en de Ontsteking uitermaaten hevig is. In de tegengestelde omstandigheden, geschied

zulks best, door het vermeiden van allerlei Ontlastingen, eene opwekkende en eenigzints verwarmende Levenswys, en het gebruik van Pappen, voor een gedeelte weekmaakende, voor een gedeelte prikkelende. De beste Pap in het eerste geval, is, die bereid wordt uit Gort, gekookt in Karnemelk; in het laatste, die uit ditzelfde bereidzel, Hooning, onder de Asch gebrade Uijens, Zuurdeeg, en dergelyke wordt saamgesteld.

§ 559.

De Ontlasting van den ingeslooten Etter, geschied somtyds door de Natuur, en moet meermaalen door de Konst bewerkt worden. De volkoomen rypheid van het ettergezwel, bepaald in meest alle gevallen zonder onderscheid, het tydstip, waarin den Heelmeester zulks bewerken moet. Het Brandmiddel, het Lancet, het Snymes, zyn de voornaame werktuigen van welken men hier toe gebruik maakt. De keuze derzelve, in gegeven gevallen; de manier hunner aanwending; en de Regelen welke daar by moeten in agt genoomen worden; zullen we in het Leerstuk der Heelkundige kunstbewerkingen aanwyzen.

§ 560.

Omtrent de heeling der nablyvende Verzweering, kan ik niets anders aanmerken, dan het gene ik hieromtrent gezegt hebbe in de Beschryving der eenvoudige Zweeren, §. 273. en vervolgens.

§ 561.

Dat men egter, in de eerste Dagen na het doorbreken of openen der Ettergezwellen, en vooräl, wanneerze met verhardingen in den omtrek vergezeld zyn, met het gebruik van weekmaakende Pappen moet blyven aanhouden; en in zeer groote verëtteringen, de Koortsbast moet gegeven worden, is mischien niet onnut hier by te voegen.

De nederzettingen van Etter.

§. 562.

Verzaamelingen van Etter, of ten minsten van een Vogt, hieraan zeer gelykvormig, op eene schielyke wyze, zonder plaatslyke Ontsteking, dog meestäl na eene Koortsächtige Ziekte, in een anderzints gezond Deel voort gebragt, wordt eene nederzetting genoemd van Etter.

*Metastasis
puris.*

§ 463.

§ 563.

Somwylen zyn deeze verzaamlingen bepaald, en maaken eene Zwellling, in zee-
kere maate omschreeven: meermaalen neemenze de gantsche uitgestrektheid in van
een Deel, en doen hetzelfde in zynen gantschen omtrek uitzetten.

§ 564.

Het voorafgaan eener Koortsächtige Ziekte; eene zeer schielyke, niet ontste-
ken, Roosächtige, of Zugtige, maar gespannen Zwellling; en eene meer of min
blykbaare Vogtgolwing, zyn derzelver foort onderscheidende kenmerken.

§ 565.

Haare meest gewoone Zitplaatsen zyn, de omtrek der Borstholte, het ge-
wrigt des Elboogs, het Kniegewrigt, de Dye, en het Been. Alsze een gantsch
Deel inneemen, verbreekenze alle Cellen van het Vetvlies, en scheiden de Huid
van de onderliggende Spieren, en deezen zelfs van elkanderen.

§ 566.

Het gebruik eener weekmaakende Pap, zoo lang de kenmerken der Verzaam-
ling nog eenigzints duister zyn; en de ontlasting des Etters door eene insnyding,
zoo haast dezelve een genoegzaame trap van blykbaarheid gekreegen hebben; zyn
in deeze gevallen de eenige hulpmiddelen.

§ 567.

Dat tot het getal deezer kenmerken nog moet gebragt worden, eene zee-
kere *Pateuse*, dat is, indrukbaare, dog zig schielyk herstellende en eenigzints weêr-
streevende Zwellling der Bekleedzelen; en tot dat van derzelver oorzaaken, vooräl
aan de benedenste Ledemaaten, eene scheefwording des Ruggraats, en Verzwee-
ring van sommige der Buksingewanden, is iets, 't gene ik niet voorby kan, hier
aan te merken.

De Etterborst.

§ 568.

Alle verzaamling van Etter, binnen de bepaaling der Borstholte, wordt den
Naam gegeven van ETTERBORST.

Empyema.

§ 569.

Deeze verzaamling kan plaats grypen, in een der zakken van het Borstvlies; in de verdubbeling van het Middenschot; of in het celwyze weefzel dat het eerstgemelde Vlies verëenigd met de omvangende Deelen der Borstholte.

§ 570.

Een Longöntsteking, of Zydewee, tot verëtering overgegaan; eene zeer zware en verzworeen Keelöntsteking; groote en uitgebreide Ettergezwollen aan den Hals, welkers tydige opening verzuimd is; zeer saamengestelde Breuken, of Beenbederf van het Borstbeen en der Ribben; nederzettingen van Etter zelfs, ingevolge eener algemeene heete Koortsächtige Ziekte; zyn de gewoone oorzaken dezer Verzaamlingen.

§ 571.

Tot derzelver aanweezen besluit men uit de kennis der Ziekten welke zyn voorafgegaan, vergeleeken met eene, op deezen gevolgde, moeilyke Ademhaaling, Hoest, Sluipkoorts, bloozende Koonen, gloeiing der Handpalmen, moeilyke of onmooglyke ligging op deeze of geene zyde, en wat dergelyke meer zyn.

§ 572.

In welk eene zyde de verzaamling van het eerste soort § 569. plaats heeft; wordt gekend, aan een zeeker gevoel van zwaarte op het Middenrif aan de zieke zyde, in eenen opgerigten stand van het Lighaam; aan eene zeer benauwde en als verstikkende Ademhaaling, als de Lyder ligt op de gezonde zyde; en somwylen ook, aan eene uitwaarts puiling der Ribben aan de zyde der verzaamling, gevoegd by de bekende zitplaats der plaatslyke Ziekten, welken zyn voorgegaan.

§ 573.

De plaats der Verzaamlingen van het tweede soort, kend men gedeeltelyk uit een bepaald en omschreeven Ettergezwel aan de buitenste oppervlakte van deeze of geene Borstholte, welk in dit geval dikmaalen gezien wordt.

§ 574.

In het derde soort, van geene uiterlyke beleediging afhanglyk, ligt den Lyder gemaklyker op den Rug, dan op een der zyden; en is, in eenen staanden stand, het

het Lighaam voorwaards over gekromd. Als 'er verbreking by is van het Borstbeen, voegen zig de kenmerken hier van, by de zoo even gemelde verschynzelen, en kan men met minder gevaar van dwaaling, een besluit opmaaken.

§ 575.

De Natuur zelve, geneeft somwylen ieder deezer verzaamlingen, door de Etter op te neemen, en uit te werpen door de Lugtpyp, de Piswegen, of den Stoelgang. Dit niet geschiedende, moet men dezelve ontlasten door de Borstöpening in de twee eerste gevallen; en door de doorbooring des Borstbeens, in het laatste. Indien in het tweede geval, de Etter door de Tusschenribbige Spieren is heen gedrongen, en een Gezwel maakt naar buiten, is de opening hier van meestäl voldoende.

§ 576.

Eene zachte en voedende Eetregel, het gebruik van *Balsamica* en den Koortsbast, een bestendig liggen op de zieke zyde, en meer losse dan opvullende Verbanden, maaken het geheel beslag der volgende behandeling.

4. K L A S S E.

De Verstervingen.

§ 577.

VERSTERVING beteekend in den striktsten zin van het Woord, eene geheele uitblusfing des Levens van eenig gegeven Deel, en volstreckte berooving van alle deszelfs zintuiglyke en willekeurige Werkingen. *Mortificatio.*

§ 578.

Somwylen egter, bediend men zig van dit Woord, om daar mede uit te drukken dien staat van een Deel, waarin deszelfs Saamenstel slegts gedeeltelyk dusdaanig eene verändering ondergaan heeft, en nog verscheiden Deelen, ongeschonden gebleeven zyn.

§ 579.

De Woorden H E E T. en K O U D V U U R, aan de een en ander deezer Ziekten, als Naamwoorden toegeëigend, hebben wel het voorregt eener algemeene aanneeming, maar drukken het soort onderscheidend verschil van beide gevallen, op verre

*Gangraena
et Sphacelus.*

verre na, zoo klaar niet uit, dan die van *geheele en gedeeltelyke Verfterving*, van welke sommige zig bediend hebben, en die wy ook zullen aanneemen.

§ 580.

Beide deeze foorten van Verftervingen, zyn van eenen *vogtigen of droogen Aart*, dat is te zeggen, met, of zonder ontlasting van eenig Vogt; met Zagtheid, of met Uitdrooging der verftorven Deelen.

§ 581.

Te sterke, en te zwakke Levensbeweegingen; onderscheppingen van den Omloop des Bloeds door de Vaten; en Scherptens van verschillenden aart, met de Vogten vermengd; moeten, onder de naaste Oorzaaken deezer Ziekten, als de voornaamsten worden aangemerkt.

§ 582.

Tot de afgelegene Oorzaaken behooren, zeer hevige Ontstekingen; de Roos in eenen hoogen graad plaats grypende; zeer aanmerklyke Zugtgezwellen; eene algemeene Waterzugt; zekere foorten van Ontwrigtingen en Beenbreuken; de Verplettering; sterk fluitende Bindzels; de Beet of Steek van Venynige Dieren; eene scherpe, en meer of min aanhoudende Koude; het daadelyk en Vermoogend Vuur; Zenuwkwetsingen; eene bepaalde, en lang aanhoudende Drukking; zeer groote verzwakking der levenskrachten, door Ziekte of Ouderdom; het misbruik van schadelyke Voedzelen; zekere foorten van Scheurbuik; Rotziekten van verschillenden aart; en dergelyken.

§ 583.

Een, tot nog toe onbekend foort deezer Oorzaaken, in zyne uitwerkzelen vry gelyk aan eene verzwakking der Levenskrachten, maakt zeeker byzonder foort van Verfterving, door den beroemden POTT, onder den Naam van *Gangrena sui Generis* beschreeven.

§ 584.

De kenmerken deezer Ziekten, zyn niet minder verschillend dan derzelver foorten, en men kan byna zeggen, dan derzelver Oorzaaken.

§ 585.

Die der geheele Verfterving, bestaan in eene volstrekte vernietiging van alle gevoel en beweging, gepaart met eene geelwitte of zwarte miskleurigheid.

§ 586.

§ 586.

Die der gedeeltelyke Verfterving zyn; eene vermindering van gevoel en beweging, zwaarte, blyven met een geelverwig vogt gevuld; eene door deezen gedekte dood witte of zwarte Huid, en dergelyken.

§ 587.

Onder de Teken en der *drooge Verfterving*, behooren vooräl, het gebrek van Vogtsöntlasting en uitdrooging, §. 580. gemeld; en ook, dat daar by geheel geene rotte en stinkende Reuk wordt waargenoomen.

§ 588.

Tot die der *Vogtige Verfterving*, betreft men inzonderheid de stank, en eene zeer groote ontlasting van een dun, geelverwig, en scherp Rotvogt.

§ 589.

Van welk eene Oorzaak de Verftervingen afhangen, moet alleen uit Omstandigheden, dezelve vergezellende, of vooräfgestaan zynde, beslooten worden. Die egter, welke afhangt van verzwakte levenskrachten, en Ouderdom, begint doorgaans aan de einden der Teenen, somwylen ook aan die der Vingeren, met eene zekere ongevoeligheid, hardheid, en miskeurigheid, welken zig allengskens verder uitbreiden.

§ 590.

Het soort van Verfterving, door POTT beschreeven, en 't gene wy gezegt hebben, dat van eene, als nog onbekende Oorzaak afhangt; begint doorgaans met geheel geen, of althans zeer weinig gevoel van Pyn, aan het einde van een der kleine Teenen; aan welkers zydeleyke en vooräl binnenste Gedeelte, men als dan eenegeringe, 't zy blauwächtige, 't zy zwarte Vlek, waarneemt. Somwylen egter, is het in dit zelfde Tydstip, inzonderheid des Nagts, den Lyder zeer ongemaklyk, en wel, in de Teen of Teenen niet alleen, maar ook in den gantschen Voet en de Enklauw. Deszelfs voortgang verschilt in verschillende Voorwerpen, en in verschillende omstandigheden. Dan eens, naamlyk, vorderd het langzaam van den eenen Teen tot den anderen, en van daar, tot den Voet en Enklauw, terwyl het in andere schieyk toeneemt, en uitermaaten pynlyk is. Als het den Voet aantast, wordt deszelfs bovenste gedeelte het eerst aangedaan, en

verschynt 'er eene miskleurige Zwelling, in haare oppervlakte fomwylen bezet met blynen.

§ 591.

Dat eene Ontsteking, Zugtgezwel, en dergelyken, tot Verfterving zal overgaan, voorfpeld men, uit derzelver fteeds klimmende verfchynzelen, en het agter blyven der tekenen van Oploffing en Verëttering.

§ 592.

De Gevolgen der Verfterving zyn verfchillend. Derzelver foorten, Oorzaaken en plaatzing, bepaalen inzonderheid deeze verfcheidenheden. Eene gedeeltelyke Verfterving, ftrekt zig zeldzaam verder uit, dan tot in het Vetvlies: eene geheele, dringt zelfs door tot in de Beenderen. Verftervingen, gevolgt op Ontsteking, Roos, Zugtgezwellen, en dergelyken, zyn doorgaans in het geval der eerfte: die van Ouderdom, fcherpe Koude, en Verbryzelingen afhangen, in dat der laafte. Van ditzelfde gevolg is ook veelyds de Verfterving van POTT; die, welke door zeer zwaare Brandingen veröorzaakt wordt; en de gevolgen van Rotziekten. Verftervingen in den omtrek van het Hyligbeen, door eene langduurige drukking in fommige Ziekten voortgebragt, verwekken veelyds Beenbederf.

§ 593.

Ter behandeling der Verftervingen, moeten derzelver foorten, oorzaaken, en beleedigde Deelen, wel in agt genoomen worden.

§ 594.

Eene *geheele verfterving*, erkend nauwlyks eenig ander hulpmiddel dan de afzetting; en deeze onmooglyk zynde, is ze veelmaalen doodelyk. In enkele gevallen egter, bewerkt de Natuur alleen de affcheiding van het verftorvene, en wordt de nablyvende Verzweering door eene regelmaatige behandeling geneezen. In alle gevallen van deezen aart waar de Geneezing kan gehoopt worden, moet men derhalven, de poogingen der Natuur begunftigen, door het in en uitwendig gebruik van verfterkende en bederf tegenftaande Geneesmiddelen.

§ 595.

In eene *gedeeltelyke Verfterving*, behoord men ter beteugeling van derzelver voortgang, inzonderheid te raadpleegen met den ftaat der kragten van het Leeven,

ven, en de natuur der Koorts daar by tegenwoordig; welke beiden door den Pols worden aangewezen. Zyn de eersten groot, en behoord de laatste tot het soort der Heete, dan is de Aderlaating onvermydelyk, en moeten 'er verdunnen- de en verkoelende Geneesmiddelen gegeven worden. Uitwendig dienen in dee- ze omstandigheden, slapmaakende en verkoelende Pappen, bereid inzonderheid, uit Gort, en Zuuring, gekookt in Wye of eenigzints zuur geworden Karnemelk. Wanneer daarëntegen de Levenskragten gering zyn, en de Koorts van eenen sleependen aart is, zyn een sterk gebruik van den Koortsbast, een voedende en opwekkende Eetregel, en Wynächtige Stovingen of Pappen, van de uiterste nood- zaaklykheid. De Verfterving in beide gevallen bepaald zynde, begunstigt men de afscheiding der verstorvene Deelen, door den *Terpentyn Geest*, en het gebruik eener gemeene Gortpap.

§ 596.

De Verfterving door POTT beschreeven, eischt verzagtende Aanlegzels uit- wendig, en inwendig het dagelyks gebruik van zoo veel Heulsap, als den Lyder, zonder meer dan dommelig te worden, verdraagen kan.

§ 597.

Men kan zig van dit zelfde Hulpmiddel bedienen, in Verftervingen veröorzaakt door zeer saamengestelde Beenbreuken en Ontwrigtingen, door aanmerklyke Schootwonden, door eene Kwetsing der Zenuwen, door Verbryzelingen en Ver- scheuringen der Deelen van allerlye soort, en dergelyke. In alle deeze geval- len egter, moeten 'er vooräf de noodige ontlastingen gemaakt, en tegelyk met het Heulsap, verkoelende Geneesmiddelen gegeven worden.

§ 598.

Beginnende Verftervingen uit Koude, worden in den eersten opslag best behandeld, door Baden of Waschingen met koud Water of Sneeuw, vermydende alles wat eene schielyke verwarming aanbrengt. Als dit soort de Voeten inneemt, klimt het zeldzaam hooger dan tot het onderste gedeelte der Kuiten; eene byzon- derheid welke ik meermaalen hebbe waargenoomen.

§ 599.

De inkervingen, door sommigen in alle soorten van Verftervingen aangepree- zen; het behandelen deezer met prikkelende hulpmiddelen; gelyk ook de Kring-

wyze insnydingen aan den rand van het levende; dienen meer om nadeel dan voordeel te bewerken, en hebbe ik om die reeden, met sti' zwygen voorby gegaan.

§ 600.

In de Verftervingen, veröorzaakt door binding of drukking, moet men vooräl bedagt zyn, op het wegneemen deezer oorzaaken, zonder het welke alle hulpmiddelen vrugtloos zullen worden aangewend.

§ 601.

Eene Verfterving, afhanglyk van eene zeer rotte Scheurbuik, Rotkoorts, of eenige andere Ziekte van dergelyken aart, eifcht vooräl het gebruik van Geneesmiddelen, in die Ziekten beproefd; eene hier mede overéénftemmende eetregel; en of algemeene, of foortelyk bederfweerende aanlegzels.

§ 602.

Ik hebbe in sommige Koortsägtige Ziektens opgemerkt, dat in de Vingeren of Teenen, in de Handen of Voeten, eene loodverwige, en zelfs zwarte mis-kleurigheid plaats greep, verzeld, of met zeer zwaare pyn, of met Ongevoelighed, en dus zeer gelyk aan de Verfterving. Ik hebbe dezelve altoos in korten tyd hersteld, door het gebruik alleen van warme Weekmaakende Pappen of Stovingen, en ben verplicht zulks hier aan te merken, om dat zeer bekwaame Lieden, dit geval met my ziende, hetzelfde beschouwde als eene waare Verfterving, die een flegt uitëinde Voorfpeelde; en men derhalven ligtelyk in de verzoeking konde geraaken, om hetzelfde, overéénkomftig dit denkbeeld te behandelen, daar het inderdaad niets anders influit, dan eenen flegts vertraagden omloop des Bloeds door de Huidvaten.

III. H O O F T D E E L.

De langduurige Gezwellen.

§ 603.

Wat *Langduurige Gezwellen* zyn, is in § 447. gebleeken. Als zoo veele ondergefchikte foorten derzelfver moet men aanmerken, de *harde Gezwellen*, de *Beurs*.

Beursgezwellen, het *Vetgezwel*, het *Spekgezwel*, de *Bloedgezwellen*, de *Waterige Gezwellen*, de *Vleesch Gezwellen*, het *Lugt Gezwel*, de *Aardagtige Gezwellen*, de *Speekzel Gezwellen*, de *Galgezwellen*, de *Zoggezwellen*, de *Pisgezwellen*, de *koude Verzweeringen*, de *Onwaare Breuken*, en de *Werktuigige Gezwellen*.

I. K L A S S E.

De harde Gezwellen.

§ 604.

HARDE GEZWELLEN worden die genoemd, welke, alsze met de vingeren gedrukt worden, eenen weerstand bieden, die meer of min moeilyk te overwinnen is, en altoos het natuurlyk weerstandbiedend vermoogen der zachte Deelen van ons Lighaam zeer veel te boven gaat. Het *Knoestgezwel*, de *Kanker*, de *Kropklieren*, het *Kropgezwel*, en de *Knobbelgezwellen*, behooren alle tot deezen.

*Tumores
indurati.*

Het Knoestgezwel.

§ 605.

Het KNOESTGEZWEL is een hard, vast, onpynlyk, somwylen zelfs ongevoelig, en langzaam grooter wordend Gezwel, waarby geen de minste miskleurigheid der Bekleedzelen plaats heeft, maar dat niet zeer zelden, eene eenigzints ongelyke Oppervlakte aanbied.

Scirrhus.

§ 606.

De natuur deezer Gezwels, bestaat hoogst waarschylyk, in eene byzondere ontäarting van het Celwyze Weefzel, dat de saamenstellende Vaten eener Klier onderling Veréénigt; en misschien ook in die der Vaten zelve.

§ 607.

Deszelfs meest gewoone Zitplaatzen zyn, de Onderlip, de Tong, de Oorklier, de Oxelklieren, de Borstschyf, de Amandelen, de Liefchklieren, de Ballen, en de Baarmoeder.

§ 608.

Eene uiterlyke beleediging, veranderde hoedaanigheid der Vogten, verandering in de omloopende beweeging van deezen door de Vaten, en ophouding

der Maandelyksche ontlastingen, of eenigerlye Werktuiglyke verandering in de gantsche Machine omtrent deezen tyd van het Leven, moet men als de meest vermoogende Oorzaaken van dit Gebrek aanmerken. De Ontsteking, van veele onder het getal deezer Oorzaaken aangenoomen, is zulks nimmer, en hebbenwe om die reeden met stilzwygen voorbygegaan.

§ 609.

Het Knoestgezwel, op zig zelfs beschouwd, is altoos goedäartig, en gaat nimmer over tot Kanker, dan ingevolge eener bykomende als noch onbekende Scherptheit der Vogten. Dit inzonderheid is de reeden, dat het somwylen geduurende het gantsche Leven gedraagen word, zonder eenig het minste ongemak te veröorzaaken.

§ 610.

Allerlye Geneeswyzen, door de Schryvers tot hier toe in dit gebrek aangepreezen, zyn of nutloos, of onnoodzaaklyk. Ze zyn nutloos, voor zoo veel dezelve behooren tot het toedienen van Geneesmiddelen, welke men wil dat de oplossing bewerken zullen. Ze zyn onnoodzaaklyk, voor zoo veel ze betrekking hebben tot de wegneeming. De onöplosbaarheid van hetzelfde, door onëindig veele Proeven beweezen, bepaald het eerste: deszelfs onschadelykheid, van my, in myne *Heelkundige Mengelstoffen* aangetoond, het laatste.

§ 611.

Hoedaanig men van hetzelfde moet denken, als het van zynen oorspronglyken aart, toevalliger wyze verbafterd, zal onder het naastvolgend opschrift getoond worden.

De Kanker.

§ 612.

Wanneer het Knoestgezwel, eenen meer of min langen tyd geduurd hebbende, gevolgd wordt van Jeuktheit, hette, en eene stekende of kloppende Pyn: wanneer het zyne ronde gedaante verliest, eene onregelmaatige aanneemt, en de dekkende Huid als bestraald wordt van verwyde Bloedvaten, verändert hetzelfde, gelyk *Cancer* van hoedaanigheid, zoo ook van Naam, en wordt somwylen *Kanker*, somwylen *Carcinoma* *Kreeftgezwel* geheeten.

§ 613.

§ 613.

Zoo lang dit Gezwel voorgemelde Verschynzelen behoud, wordt het een BESLOOTEN, en VERBORGEN KANKER genoemd. Zoo haast het daarën-
 tegen, van Vertoonzelen verändert; met doode Korsten bezet raakt; openbreekt;
 by wyze van een Uitwas boven de natuurlyke oppervlakte des Deels uitspat, of
 eene voortknaagende zweer maakt, welke door openbersting der Bloedvaten,
 somwylen doodelyke Bloedstortingen veröorzaakt, veränderd deezen naam,
 in dien van GEÖPENDE, en VERZWOOREN KANKER.

*Cancer
occultus.*

§ 614.

In beide gevallen, is het altoos verzeld met eene ontäarting der Vogten, welks
 natuur als nog onbekend is. Misschien zelfs kan men zeggen, dat het altoos af-
 hanglyk is van deeze, en een Knoestgezwel nimmer overgaat in Kanker, dan
 ingevolge deeze zelfde Vogts-verbaftering. Dat de Kanker derhalven, geen
 zuiver plaatslyk gebrek is, en door geenerlye plaatslyke hulpmiddelen kan gered
 worden, zyn zoo veele noodzaaklyke gevolgen deezer Leerstelling.

*Cancer
Apertus
& Exul-
ceratus.*

§ 615.

Men is altoos van gedagten geweest, dat het zeer noodzaaklyk was, het juiste
 Tydstip te kennen, waarin een Knoestgezwel overging tot Kanker. Men heeft
 zulks gewild, om te beter te kunnen bepaalen wanneer de wegneeming des Ge-
 zwels geöorloofd was, of althans met de meefte hoop van een goed gevolg konde
 gedaan worden. De onnoodzaaklykheid egter deezer Kunst-bewerking in het
 Knoestgezwel, §. 610. aangewezen; de nutloosheid derzelve in de Kanker, van
 my in het voorgemelde Werk betoogd, ontslaan ons geheellyk van de moeite
 eens onderzoeks, aan zoo veelerhande zwaarigheden onderhevig als dit.

§ 616.

Meerder nut zou het insluiten, wanneer we in alle gevallen met zeekerheid
 konden bepaalen, of een gegeeven Gezwel, waarlyk behoorde tot de Klasse der
 Knoest- en Kreeft Gezwellen, dan niet. Hier omtrent egter, ontmoeten we
 somwylen onöverkoomlyke Zwaarigheden, en zyn we als nog niet in staat, om
 iets, dat in alle opzigten voldoen zoude, te kunnen vast stellen.

§ 617.

§ 617.

Ik hebbe geen het minste gewag gemaakt van de Oorzaaken, welke het Knoestgezwel doen ontäarten in Kanker. De reeden hier van is, dat dezelve nauwlyks meerder kenbaar zyn, dan de ontäarting der Vogten welke het laatste gebrek onmiddelyk voortbrengt, en wy den tyd niet willen spillen met gisfingen. Dit nogthans fchynd men hier omtrent te moogen aanneemen, dat uiterlyke beleedigingen van het Knoestgezwel, ophouding van zekere natuurlyke ontlastingen, eene droefgeestige gesteltheid, en meer andere dergelyke Omftandigheden, deeze verändering fomwylen vooäf gaan, en als in zeeker opzigt bepaalen.

§ 618.

Na alles wat ik tot hier toe gezegt hebbe, begrypt men ligtelyk, dat de gantsche behandeling der Kanker, enkel beftaan moet, in dezelve zo veel mooglyk zy, draaglyk te maaken voor den Lyder. Dit gefchied met betrekking tot de befloote Kanker beft, met eene verftandige werkloosheid aan de zyde des Heelmeesters: in de verzworeen, met het uiterlyk gebruik van *Saturnina* en *Alumina*: en in beiden, door eenen koelen en zagten Eetregel; door de Aderlaating in het geval van Volbloedigheid; door zagte Laxeermiddelen, by gebrek van Ontlasting; door het *Heulfap*, als de Pynen zeer zwaar zyn; en door het afweeren van alles, wat het gebrek door aanraaking kan tergen.

De Krop-Klier Gezwellen.

§ 619.

*Scrophu-
lus.*

Het KROP-KLIER GEZWEL, is een hard en onpynlyk Gezwel, gemaakt door eene uitzetting der enkele of faamengevoegde Klieren, ingevolge eener verftopping van derzelver faamenftellende Vaten.

§ 620.

De Hals, de Oxels, het zydelyk gedeelte des Aangezigts, de Borften der Vrouwen, de Liefchen en dergelyken, zyn deszelfs meest gewoone Zitplaatzen.

§ 621.

Het is zeer gemeenzaam by Kinderen; zeldzaamer by Volwassenen; en gaat veel-

veeltyds verzeld met harde knobbels in de Longen en het Darmscheil, gelyk ook van zekere zeer kleine Zweertjes aan de randen der Oogleden, nauwlyks merkbaar dan met behulp van Vergrootglazen.

§ 622.

Algemeen genoomen, kan men deeze Gezwellen in twee foorten, in GOED-
AARTIGE naamlyk, en KWAADAARTIGE, onderscheiden. De eersten vol-
doen in alle opzigten aan de gegeven Bepaaling, en wyken fomwylen vry ge-
maklyk voor de Werking der aangewende Hulpmiddelen. De laaften zyn rood,
ontsteken, loodverwig, en pynlyk: Zy weêrstreeven een geruimen Tyd, alle,
en zelfs de meest vermoogende Hulpmiddelen. Het woord *Kwaadäartig* egter,
betekend hier ter plaatze niets anders dan *eene moeilyke Geneesbaarheid*, 't gene
men wel moet aanmerken.

*Benigna,
Maligna.*

§ 623.

Derzelver gevolgen, alsze in een groot aantal aanwezig zyn, of de Longen
en het Darmscheil inneemen, zyn menigvuldig; en onder anderen, zeer hardnek-
kige Oogöntstekingen, Teering, Beenbederf, Beenëeters, en dergelyken. Al-
toos zyn ze gegrond op eene byzondere Vogts verbaftering, van welke wy nauw-
lyks meerder kennen dan den Naam, wat ook sommige daar omtrent gewild heb-
ben. Eene erflyke gesteldheid geeft daar toe niet zelden aanleiding.

§ 624.

Haare Geneezing, is in de meeste gevallen moeilyk; fomwylen zelfs onmoog-
lyk. Het laaste is inzonderheid waar, als ze erflyk zyn, en in het geval van
veröudering. De beste Geneeswyze is de oplossing, en deeze onmooglyk zynde,
de Verëtering. De wegneeming met het snymes naamlyk, die wel eene enkele
ryze kan plaats grypen, is in verre de meeste omftandigheden ongeoorloofd.

§ 625.

Onder eene verbaazende menigte van Geneesmiddelen, ter oplossing deezer Ge-
zwellen van tyd tot tyd aangepreezen, heeft my nooit iets beter voldaan, dan een
Mengzel van den *Koortsbast* met de *gestaalde Ammoniakzout bloemen*, en de *Stroop*
van Orange schillen, inwendig; en uiterlyk, de *nedergedrupte Wynsteenolie*, in
zulk eene groote veelheid als immer mooglyk is vermengd met de een of ander
der bekende *oplossende Pleisters*.

S

§ 626.

§ 626.

Ligt verteerbaare Voedzelen, en vermeerdering van Lighaamsbeweeging, begunstigen heel zeer de werking deezer Hulpmiddelen.

§ 627.

Ter bewerking der Verëttering in deeze Gebreken, dienen vooräl prikkende en tegelyk weekmaakende aanlegzels in de gedaante van Pleisters, vermits de Ettermaaking hier altoos langzaam haar beflag krygt, en de Pappen uit dien hoofde zeer lastig zyn.

§ 628.

De ontlasting des Etters, moet men altoos, zoo veel mooglyk zy, aan de Natuur vertrouwen; of behoord ten minsten niet met verhaasting, door de Kunst bewerkt te worden. Hoe langer naamlyk dezelve beslooten blyft, hoe vaardiger geschied de geneezing, doordien het aangedaane Klierdeel alsdan beter in zig zelfs versmelt, en minder verharding nalaat.

§ 629.

Belangende de wegneeming: deeze moet nimmer geschieden als 'er verscheiden deezer Gezwellen tegelyk plaats hebben; dezelve erflyk zyn; of de Kunstbewerking, uit hoofde der bygelegen deelen, eenig merklyk gevaar insluit.

Het Kropgezwel.

§ 630.

Eene uitzetting der Schildwyze Klier van het Strottenhoofd, afhanglyk van eene ophooping van dat Vogt, welk natuurlyk in dezelve wordt afgescheiden, draagt den naam van KROPGEZWEL, KEELGEZWEL, en somwylen ook van KEELBREUK.

*Bronck-
cele.*

§ 631.

De Bewooners van *Carinthia*, *Styria*, en andere plaatzen omtrent het *Alpische Gebergte*, zyn aan hetzelfde zeer onderhevig; de oorzaak hier van is alsnog twyfelächtig,

§ 632.

De ingeslooten stof, is somwylen niet ongelyk aan Eiwit door warmte gestold: som-

somwylen is ze Etterächtig, Vleeschächtig, Blaaswyze, of van eenige andere hoedaanigheid.

§ 633.

Schoon dit Gezwel, algemeen genoomen, niet veel gevaar insluit, wordt het dikmaalen door deszelfs grootte zeer lastig, en vervald wel eens in eene verdriegtige Verzweering.

§ 634.

Deszelfs beste Geneeswyze is de Oplosfing, die egter alleen mooglyk is in den beginne. Hier toe wordt aangepreezen, het inwendig gebruik van een Poeijer saamgesteld uit de *Zoete Kwik*, *Gebrande Spons*, *Vermillioen*, en *Pissebedden*; en voor het uitwendige, de *nedergedrupte Wynsteen-olie* of het *Ammoniakzout*, vermengd met eenige *oplossende Pleisters*.

§ 635.

De Oplosfing onmooglyk zynde, kan men, als het ingeslooten Vogt dun is, hetzelfde door de driekante Priem of de Seton ontlasten, en het Gezwel zelve somwylen geneezen. In de tegengestelde omstandigheden, moet het geheel aan de Natuur bevoelen worden.

*De Knobbel-Gezwellen.**Tuberculi.*

§ 636.

Onder deezen Naam begrypt men zekere, doorgaans niet zeer groote, harde, en knoopwyze Gezwellen, welke somwylen huisvesten in het Huidweefzel, somwylen in den Vetrok, onpynlyk, niet miskleurig zyn, en hunnen oorsprong ontleenen uit eene opvulling der Klierbeursjes van het een en ander Weefzel.

§ 637.

Veeläl zyn verscheiden deezer Gezwelletjes, in een zelfde Voorwerp, te gelyk aanwezig. Altoos zyn dezelve onvatbaar voor Oplosfing. Zeldzaam gaanze uit zig zelfs over tot Verzweering.

§ 638.

Haare Geneezing derhalven kan niet verkreegen worden, dan door behulp van het Snymes, of Bytmiddelen; en is inderdaad, uit hoofde haarer onschaaadelykheid, nauwlyks aanprysbaar.

2. K L A S S E.

De Beursgezwellen.

§ 639.

*Tumores
Cystici.*

BEURSGEZWELLEN noeme ik dezulke, welkers stof in een byzonder vliezig zakje beslooten zynde, geheel geene gemeenschap heeft met den Omloop.

§ 640.

Het *Papgezwel*, het *Hooniggezwel*, het *Boongezwel*, de *Peesknoop*, de *Zenuwknoop*, het *Vorschgezwel*, en de *Lipknoop*, behooren alle tot deezen.

Het Papgezwel.

§ 641.

*Athero-
ma.*

Een Beursgezwel, welks ingehouden stof zeer gelyk is aan een breiächtig mengzel, wordt een **PAPGEZWEL** genoemd.

§ 642.

Twee foorten deezer Gezwellen zyn 'er, welke, gelyk ze in byzondere Deelen plaats grypen, zig door verschillende merktekenen kenbaar maaken.

§ 643.

Die der eerste foort, altoos geplaatst aan de oppervlakte des Lighaams, hebben hunnen oorsprong uit dat foort van Huidkliertjes, welke voor het grootste gedeelte in zekere maazen van het Huidweefzel zyn ingekast. Deeze zyn rond, klein, aan de Huid zelve vastgehegt, en kunnen zonder deeze, by geene mooglykheid verplaatst worden.

§ 644.

Die van het tweede foort, hebben hunne zitplaats in zekere Kliergraantjes van het Vetvlies, zyn grooter dan de voorige, verschuifbaar naar alle zyden, en niet dan toevallig gehegt aan de Huid.

§ 645.

De byzondere kenmerken der Papgezwellen, zyn voor het meeste gedeelte uit de

bovenstaande beschryving blykbaar. Men kan egter hier omtrent nog aanmerken, dat ze een nauwkeurig bepaalde omtrek hebben, en met zeer traage vorderingen, van een byna onmerkbaar beginzel, tot eene verschillende grootte aanwaffchen.

§ 646.

Derzelver gevolgen zyn zeer ongelyk. Somwylen worden ze zonder eenige merklyke verandering te ondergaan, geduurende het gantsche Leven gedraagen; somwylen daarëntegen, door eene toevallige oorzaak ontsteken, openen ze zig van zelve, en maaken eene Verzweering, die, als de zelfstandigheid van het omvangend bekleedzel tevens daarin deel neemt, dezelve geheel doet eindigen.

§ 647.

Hoe ouder een Papegzwel is, hoe dikker is doorgaans deszelfs bekleedzel. Men moet op deeze byzonderheid, die tegelyk betreklyk is tot andere Beursgezwellen, wel agt geeven, om dat ze van veel invloed is op de Behandeling.

§ 648.

Wat de Geneezing betreft deezer Gezwellen; deeze geschied niet dan door vernieling van derzelver Beursje, of door de Uitpelling van het gantsche Gezwel. De eerste Geneeswyze is inzonderheid betreklyk tot Papegzwellen, van het eerste soort; en geschied, of door een Brandmiddel, of, door het Gezwel in zyne gantsche uitgestrektheid te openen met het Snymes, de ingeslooten stof daar uit te drukken, en de Beurs te doen afscheiden door het *Poeijer van Wit Kopperroed*. De laatste manier is best geschikt voor die van het tweede soort, en zal in het *Leerstuk der Heelkundige Kunstbewerkingen*, beschreeven worden.

Het Honiggezwel.

§ 649.

Het HOONIGGEZWEL, dus genoemd naar de gelykheid van deszelfs stof, *Melicerus* met verdunde Honig, verschild hier door alleen van het Papegzwel, en is voor het overige, in alle opzigten daar mede overéénkomstig.

§ 650.

Het MOL - en SCHILDPAD - GEZWEL, die beiden het gehairde deel des *Talpa* Hoofds *Testudo*.

Hoofds inneemen, zyn meermaalen van den aart des Honiggezwels, dan van het Papgezwel; eene byzonderheid, welkers kennis zyne nuttigheid insluit.

Het Boongezwel.

§ 651.

Lupin.

Het BOONGEZWEL, is eene uitzetting en vergrooting van zeker foort van Slymbeurzen, geplaatst aan het voorste gedeelte van het Kniegewrigt, aan het bovenste en buitenste gedeelte van den Dye, aan het begin van den Voorvoet, aan het bovenste des Schouders, en aan het meest uitsteekende gedeelte des Elleboogs.

§ 652.

Dit Gezwel heeft meestal eene half bolronde gedaante, is onpynlyk, niet miskleurig, en meer of minder Veerkrachtig, naar maate der taatheid van het Vogt daarin bevat, en de dikte van deszelfs bekleedzel.

§ 653.

Aan het Kniegewrigt ontspruit het doorgaans uit menigvuldig knielen: op alle andere plaatzen is deszelfs oorzaak minder blykbaar. Algemeen genoomen, maakt het zeer langzaame Vorderingen; somwylen gaat het over tot Verzweering.

§ 654.

De Geneezing geschied doorgaans langs den weg van Oplosfing: Zeldzaam egter, moet het met het Mes geöpent, of weggenoomen worden.

§ 655.

De Oplosfing wordt best bewerkt, door het Gezwel twee maalen daags te wryven met den *Geest van het Ammoniak Zout*, en het gebruik van een welsluitend Verband, nat gehouden in eene waterige smelting van het zelfde Zout, in de tusschentyden. Een mengzel van *Spiegelbars* en *overgehaalde Brandewyn*, aangelegt door middel van een Nap van Vlas gemaakt; en een aanhoudend gebruik van Spaansche Vliegen Pleisters, worden tot hetzelfde oogmerk aangepreezen. De eerste behandeling egter, heeft my altoos zoo wel geslaagd, dat ik nog nimmer genoodzaakt geweest ben, de laatste te beproeven, of eenige Kunstbewerking daar aan te oeffenen.

De Peesknoop.

§ 656.

DE PEESKNOOP, is een onpynlyk, niet miskleurig, veerkragtig, eirond, *Ganglion.* en ter zyden verschuifbaar Gezwel, gemaakt door de ophooping van een eiwitagtig Vogt in de schede der Peezen.

§ 657.

Haare gemeenste Zitplaats is de Rug van de Hand, in een der Peezen naamlyk van de uitstrekke Vinger-Spiere. Andere peesryke Deelen egter, zyn daar van niet geheel uitgeslooten.

§ 658.

Geene deezer Gezwellen is gevaarlyk. Zy worden veelal geduurende het gantsche Leven gedraagen zonder eenig Ongemak, anders dan eene geringe Vertraaging in de schuivende beweging der aangedaane Pees te veroorzaaken. Tot eene meer dan gemeene grootte gekoomen, verveelenze doorgaans den Lyder uit hoofde haarer misstand, en het is juist dan, datze het bezwaarlykft geneezen worden.

§ 659.

Het verbryzelen der Beurs, met een looden of houten Hamer; en derzelver afscheiding met het Snymes, zyn de eenige algemeen goedgekeurde behandelingen deezer gebreken. In een versch geval egter, is het my eens gelukt de oplossing te bewerken, door een mengzel van *Groene Zeep* en *Keukenzout*: waar mede ik het gebrek twee maalen daags liet wryven; en door den aanleg van een drukkend Verband in de tusschentyden.

De Zenuwknoop.

§ 660.

DE ZENUWKNOOP, een gebrek der Huid-Zenuwen, is zelden grooter dan een Erwt, en uitermaaten pynlyk. Deze laatste byzonderheid, en een zeker *Nodus Nervorum* onvermoogen in de beweging van het Deel, waar toe de lydende Zenuw behoort, onderscheiden voornaamlyk, dit Gezwelletje van alle andere.

§ 661.

§ 661.

Eene zekere witte Zelfftandigheid, beflooten tuffchen de bekleedzels der Zenuwen, en die als van eenen Kraakbeenigen aart fchynd, maakt het binnenfte gedeelte deezer gebreken, welke hieröm, op het gevoel uitermaaten weêrftreevig zyn.

§. 662.

Geenerlye Heelmiddelen, zyn in dit geval van eenige uitwerking. De wegneeming alleen bewerkt deszelfs geneezing. By gelegenheid der Kunstbewerkingen, zullen we dezelve in alle haare byzonderheden voordraagen.

Het Vorfchgezwel.

§ 663.

Ranula. VORSCHGEZWEL, noemt men een zagt, flap, meer of min groot, en in 't algemeen, onpynlyk gezwel, geplaatft onder en aan het voorfte gedeelte van de Tong, aan de eene of andere, of wel aan beide zyden van het Tongriemtje.

§ 664.

Somwylen wordt het gemaakt door eene ophooping van Kwyl, in de Ontlaftbuis van de Ondertongsche, of Onderkaaksklier; fomwylen door eene Wyeächtige verzaamling in de Vakjes van het Celwyze Weefzel. De ingeslooten ftof is in de twee eerfte gevallen niet anders dan meer of min veränderd Speekzel; in het laafte heeft ze de Natuur van het Eiwit, en wordt fomwylen Gips en Steenächtig.

§ 665.

Schoon het niet zeer gemeen zy, dat het Vorfchgezwel tot eene zeer groote uitgebreithed aanwaffche, vind men hier van egter voorbeelden. Het laafte foort, is daar voor byzonderlyk vatbaar, en miffchien zelfs, is dit wel het eenig foort onderscheidend kenmerk.

§ 666.

De Geneezing der twee eerfte gevallen, kan in den beginne, en zelfs zoo lang de Stof niet te veel ontäart is, verkreegen worden, alleen door een aanhoudend gebruik van fterke Waterdryvende Purgeermiddelen, en eenigfints faamentrekende Mondspoelingen. In het laafte Geval is zulks onmooglyk, en de Kunstbewer-

bewerking onmybaar. Men moet hetzelfde stellen van de eersten, in het geval eener zeer groote veröoudering, en ontäarting, zoo van het ingeslooten Kwyl, als der Speekzelbuizen en Klieren. Van deeze Geneeswys is het hier de plaats niet om te spreken.

De Lipknoop.

§ 667.

Door LIPKNOOP verstaat men een klein, rond, of eenigzints langwerpig, loodkleurig, onpynlyk, en Blaaswys Gezwel *der Onderlip*, gemaakt door een Gelyeächtig Vogt, opgehoopt in zekere Klierbeursjes. Ik zegge, *der Onderlip*, om dat ik het nooit elders gezien hebbe, en niet om dat ik van gedagten ben, dat de *Bovenlip* daar voor volstrekt onvatbaar is. *Nodus labiorum.*

§ 668.

Dit gebrek, dat geen het minste gevaar insluit, kan niet geneezen worden, dan door hetzelfde met eene holle Schaar, of met een Snymes, geheel weg te neemen. De eerste manier verkieze ik altoos voor de laatste, om redenen, welke ik ter zyner plaatze nader zal aanwyzen.

3. K L A S S E.

Het Vetgezwel.

§ 669.

Het VETGEZWEL is eene bepaalde ophooping van welgesteld Vet, in de Vak- *Lipomena*; jes van het Celwyze Vlies; kenbaar uit eene zachte, onpynlyke, niet miskleurige, en somwylen eenigzints ongelyke Zwellings, die van een byna onmerkbaar beginzel, langzaamerhand, tot eene zeer verschillende en onbepaalbare grootte aanwacht.

§ 670.

Dit Gezwel erkend geenerlye Geneeswyze, dan de Wegneeming, welkers beschryving behoord tot het *Leerstuk der Kunstbewerkingen*.

4. K L A S S E.

Het Spekgezwel.

§ 671.

Steatoma. Het SPEKGEZWEL is een Gezwel dat meer of min groot, onpynlyk, harder dan een Vetgezwel, niet miskleurig, weerstandbiedend, veerkragtig, en in de meeste gevallen verschuifbaar is.

§ 672.

Deszelfs onmiddelyk Oorzaak, is niet anders dan eene plaatslyke Verzaamling, ophooping, en verharding der Vetstof in het Celwyze Weefzel. Het verschilt derhalven voornaamlyk door de laatste byzonderheid, van het zoo aanstonds beschreeven Vetgezwel.

§ 673.

De zelfde Geneeswys als we in het Vetgezwel hebben aangepreezen, is ook de eenige in het Spekgezwel. Kan deeze geen plaats grypen, zoo moet het met alle omzigtigheid voor doorbraak beveiligd worden. Toevallig geöpent en niet wegneembaar zynde, moeten de Verbanden bestaan uit verkoelende, en droogende Heelmiddelen.

§ 674.

Ik hebbe dit, en het voorige Gezwel, niet betrokken tot den rang der Beursgezwellen, gelyk veelal de gewoonte is; om dat derzelver stof, in verscheiden vakjes van het Vetvlies verspreid zynde, niet kan gezegt worden in eene afzonderlyke Beurs, op de wyze der Beursgezwellen bevat te zyn, ten zy men het allerbuitenste deezer Vakjes, of laat ik liever zeggen, het Vlies dat het buitenste deezer Vakjes saamensteld, voor dat gene wil aanneemen, 't welk als de omvangende Beurs derzelver moet beschouwd worden.

5. K L A S S E.

De Bloedgezwellen.

§ 675.

Tumores sanguinei. Alle Gezwellen, welken door Bloed, in de Vaten opgehoopt, of in het celwyze Weefzel uitgestort, gemaakt worden, noemt men BLOEDGEZWELLEN.

§ 676.

§ 676.

Tot de Rangschikking van deezen behooren, de *Bloedvlek*, de *Slagäderbreuk*, en de *Ader spat*.

De Bloedvlek.

§ 677.

Door **BLOEDVLEK**, verstaat men eene verzaamling van Bloed, in de Vakjes van het Vetvlies, afhanglyk van eene verbreeking der kleinste Vaten, door eenigerlye kneuzende Oorzaaken. *Ecchymosis.*

§ 678.

Dit gebrek derhalven, is niet anders dan het tweede soort van kneuzing § 61. beschreeven, en wordt op dezelfde wyze gekend, en geneezen. Als het de gantsche uitgestrektheid van een Deel inneemt, wordt het somwylen beschouwd als eene Versterking; eene misgreep, welke my dikmaalen ontmoet is, en voor de welke ik meene, den jongen Heelmeester te moeten waarschouwen.

De Slagäderbreuk.

§ 679.

SLAGADERBREUK, betekent in den striktsten zin van het Woord, eene te gennatuurlyke plaatslyke verwyding van eenig gedeelte eens Slagäders. Meer algemeen wordt daar door verstaan, zoo wel dit geval, als eene zydelyke opening des Slagäders, met uitstorting van Bloed in het celwyze Weefzel. Wy zullen het laatste denkbeeld opvolgen. *Aneurisma.*

§ 680.

Eene Slagäderbreuk is of *Waar*, of *Onwaar*, of *Saamengesteld*.

§ 681.

Eene **WAARE SLAGADERBREUK**, is eene bepaalde verwyding van de holte eens Slagäders; of eene zakwyze uitbreiding van het een of ander gedeelte zyner zyden. *Aneurisma verum.*

§ 682.

Eene **ONWAARE SLAGADERBREUK**, die veel meer gemeen is dan de voorige, *Aneurisma spurium.*

rige, bestaat in eene uitstorting van het slagaderlyk Bloed in het celwyze Weefzel, afhanglyk van eene toevallige opening in de eigen bekleedzelen des Slagaders.

§ 683.

Aneurisma complicatum

De waare Slagaderbreuk, zoo zeer toegenoomen, dat de rokken des Slagaders niet meer bestand zyn, om zig tegen de onöphoudelyke werking van het omlooppend Bloed te kunnen aankanten, maakt, door eene uitstorting van hetzelfde, in het Vetvlies der omliggende deelen, eene meer uitgebreide Zwelling dan te voren; en aan deeze is het, dat men den naam van SAAMENGESTELDE SLAGADERBREUK toeëigend.

§ 684.

De waare Slagaderbreuk komt misfchien zeldzaam anders dan in de groote Slagader, is bezwaarlyk te kennen, en geheel niet geneesbaar.

§ 685.

De onwaare Slagaderbreuken, kunnen in alle deelen des Lighaams zonder onderscheid plaats grypen. De meesten deezer egter, zyn het gevolg eener kwetsing van de Armflagader, by het openen der Leverader. Ze zyn aan verscheiden veranderingen onderhevig, en kunnen, naar de verschillende omstandigheden welke daar mede vergezeld gaan, in even zoo veele onderhoorige foorten verdeeld worden.

§ 686.

Somwylen naamlyk, het Vat met eene taamlyke opening doorboord zynde, geschied 'er eene uitstorting van Bloed in de Vakjes van het celwyze Weefzel, groot genoeg, om de meeste uitgestrektheid van een Deel, door eene zeer loodverwige, zwaare, en somwylen kloppende Zwelling, die byna alle werkingen van hetzelfde verhinderd, te doen uitzetten.

§ 687.

Somwylen daarëntegen, als de opening des Slagaders zeer klein, en het Vat zelve, onder het een of ander peesagtig uitbreidzel gelegen is, gebeurd 'er eene stolling van het Bloed in de nabyheid van het wondje des Slagaders, die de verdere verspreiding van hetzelfde door het Vetvlies verhinderd, en een Gezwel maakt, dat naar deszelfs verscheiden grootte, meer of min bepaald en omschreeven is, geen de minste verandering maakt in de natuurlyke kleur der Bekleedzelen, niet of

of zeer weinig pynlyk is, in den beginne door drukking verkleind wordt, en waarin men fomwylen klopping, fomwylen een zeker zonderling geruifch waarneemt.

§ 688.

Veelmaalen is dit foort van Slagäderbreuk afhanglyk van eene Verbreeking der binnenfte Rok van den Slagäder, door welk eene oorzaak zulks ook zyn mooge. Gelyk in dit geval, het doorlopend bloed eenen openen weg gebaad wordt, om in het Celwyze Weefzel welk dit Vlies verbind met de overigen, in te dringen, zoo kan het ook gebeuren, dat deeze zelfde Vloeistof, zig verspreidende tuffchen de faamenftellende Vezelen van den veerägtigen Rok, deeze Vezelen doet van een wyken, derzelver zydelyke faamenhegting vernield, eene uitftorting maakt in het buitenfte Celächtig Vlies des Slagäders, en te gelyk in dat der omliggende Deelen, en dus eene Slagäderbreuk doet voortkomen, welke, ten opzigte van deszelfs uiterlyke verfchynzelen, gedeeltelyk gelyk is aan eene Waare, gedeeltelyk aan eene Onwaare.

§ 689.

In enkele gevallen eindelyk, is het gebrek oorspronglyk van eene kwetfing der veerägtige Rok van den Slagäder, de binnenfte ongeschonden blyvende. In deeze omftandigheid, wykt de binnenfte Rok, die nu niet meer behoorlyk gesteund wordt, buitenwaards, en wordt, in de gedaante eener meer of min bepaalde Zwelling, welkers klopping zeer merkbaar is, en die doorgaans zeer fchielyk van Uitftorting gevolgt wordt, opgeheeven.

§ 690.

Alle deeze befchreeven foorten van Slagäderbreuken, zyn van verfchillende Oorzaaken afhanglyk. Kneuzingen, Wonden, fterke inspanning van Kragten, Hoeften, Braakingen, Lagchen, Schryën, Zingen, Blaazen, en dergelyken, hebben dezelve gelykerhand doen ftand grypen.

§ 691.

De gevolgen deezer Gezwellen, tot welk eene foort zy ook behooren, zyn in meeft alle gevallen zoo beklaglyk, dat men niet anders dan eene zeer ongunftige voorzegging doen kan. Die der uiterlyke Ledemaaten, zelfs als ze reeds verre gevorderd en veröuderd zyn, kunnen egter fomwylen geneezen worden.

§ 692.

Het uitdryvend Verband van THEDEN, met Azyn geduurig nat gehouden; de Kunstbewerking; of de Afzetting des Deels, zyn in de Slagäderbreuken der Lede-maaten, de voornaame hulpmiddelen. In die der holten van het Lighaam, kan men niets doen, dan de aanperfsing van het Bloed verminderen door Aderlaating, Buikzuiveringen, en eene fchraale Levenswys; gelyk ook de befcherming van de uitgestrekte wanden des Slagäders, als het Gezwel uiterlyk zichtbaar is, voor geweldige aandoeningen.

De Aderfpāt.

§ 693.

Varix. Eene ADERSPAT is eene tegennatuurlyke vergrooting der middenlyn van een bepaald gedeelte eener Aderlyke Buis; indervoegen, dat dezelve, tot eene meer of min aanzienlyke Zwellling, boven de eigen oppervlakte des Deel, wordt opgeheeven.

§ 694.

De gemeenfte Zitplaatzen deezer Gezwellen, zyn de Beenen. Somwylen egter heeft men dezelve gezien aan den Buik van Zwangere Vrouwen; aan de Slaapen des Hoofds; aan de binnēnzyde van den Dyë; in het Balzakje, en dergelyke. De Ambyën daarēnboven, zoo van den Endeldarm, als van de Pisblaas, zyn niet anders dan Aderfpatten.

§ 695.

Alle Aderfpatten, welke zig aan de uiterlyke oppervlakte des Lighaams opdoen, worden daar uit gekend, dat ze Gezwellen maaken, die zagt, ongelyk van oppervlakte, knoopägtig, loodverwig, en meerendeels onpynlyk zyn. Men kan hier nog byvoegen, datze nauwkeurig eene zelfde ftrekking volgen, als den loop is van het Vat in het welke zy plaats grypen, als ook, dat ze met geene de minfte klopping bedeed zyn.

§ 696.

Overmaatige arbeid, fterke bewegingen, bloedrykheid, aanhoudende drukking, te zeer fluitende Verbanden, eene regtfandige plaatzing van het Lighaam by aanhoudenheid voortgezet, Kwaade gefteltheid, Miltzugt, Zwangerheid, en
met

met één woord, alles door het welke de terugkeering van het Bloed naar het Hart vertraagd wordt, moet men als zoo veele oorzaaken derzelver aanmerken.

§ 697.

Geene deezer Gezwellen, alsze zonder eenige blykbaare oorzaak voortkoomen, en van eene matige grootte zyn, is gevaarlyk. De Ambyen zelfs, vooräl in droefgeestige Lighaamen, worden voordeelig geoordeeld. Alsze onvoorzigtig, met sterke terugdryvende middelen behandeld worden, geeven ze in sommige Voorwerpen, gelegenheid tot allerlye soorten van Bloedstortingen, inwendige Ontstekingen, en Beroertens. Sommige derzelver ook, met een zeer aanmerklyk Bloedverlies, toevallig geöpent, kunnen den weg baanen tot eene kwaade gesteltheid, Waterzugt, Teering, of zeer hardnekkige Zweeren. Aderspatten eindelyk, zoo wel aan den Buik, als aan de Beenen van Zwangeren, geneezen in veele gevallen, na de Verlossing, van zelve.

§ 698.

De behandeling der Aderspatten is tweeledig, algemeen naamlyk, en byzonder.

§ 699.

De eerste, die opzigtelyk is tot alle deeze Gezwellen zonder onderscheid, bestaat in het verbeteren of wegneemen der ongesteltheden, welke wy gezegt hebben, dat dikmaalen, als de voortbrengende Oorzaak deezer Gezwellen moeten worden aangemerkt, en behoord inzonderheid tot de Geneeskunde.

§ 700.

De laaste, enkel Heelkundig, is betreklyk tot de Aderspatten der uiterlyke Ledemaaten, tot die des Endeldarms, of die van den Pisblaas.

§ 701.

De Aderspatten der Beenen, de gemeenste van allen die aan de uiterlyke Ledemaaten voorkoomen, worden best behandeld, met het *uitdryvend verband van THEDEN*, en met welsluitende *Rygekouffen*, gemaakt van Hondsleder of stevig Linnen. Uitermaaten groot, en hier door zeer pynlyk zynde, moetenze met het Lancet geöpent worden. Alsze van zelfs doorbreeken, moet men bedagt zyn datze dikmaalen eene zeer aanmerklyke Bloedvliet veröorzaaken, die door de

Li.

Eikenzwam, en een welsluitend Verband moet gestuit worden. Somwylen zelfs, is de wegneeming noodzaaklyk; dog hier van, zal op eene andere plaats gesproken worden.

§ 702.

*Hamor-
rhoides in-
terne.*

De Aderspatten welke zig in de holte des Endeldarms ophouden, en INWEN-
DIGE AMBYEN genoemd worden, veröorzaaken dikmaalen eene zeer moei-
lyke ontlasting der Uitwerpzelen; in welk geval men door *de Spuit van PELIT*,
weekmaakende Afkookzels moet brengen in den Endeldarm, ter verdunning
der stof, daarin opgehouden. Wanneer dezelve ontfteken, verzweeren,
verharden, of versterven, baarenze veelerhanden toevallen, en moeten be-
handeld worden in overeenkomst hunner omstandigheden. Zeer sterk met
Bloed opgevuld en pynlyk zynde, kan menze openen met het Lancet, hier toe
dat Tydstip waarnemende, waarin ze zig zomtyds uitwendig vertoonen. Als ze
verzeld gaan van eene Etterächtige slymvloed, zyn zuiverende en versterkend in-
spuitingen de voornaamste Hulpmiddelen. In het geval eener te sterke Bloed-
vliet, welken zy somwylen, als ze van zelve doorbreeken, te wege brengen, die-
nen vooral inspuitingen van Koud Water, of van eenige saamentrekkende vog-
ten, en de opvulling des Endeldarms op de wyze van PETIT. In de UITWEN-
DIGE AMBYEN, dat Aderspatten zyn, geplaatst in de nabyheid van den Aars, koo-
men inzonderheid te pas, zagte verkoelende en eenigzints saamentrekkende Aan-
legzels, en somwylen, dat is, als ze zeer opgevuld en pynlyk zyn, het gebruik
van Bloedzuigers, de opening met het Lancet, of eenige dier Kunstbewerkingen,
welke men ter haarer volkoomen geneezing heeft uitgedagt, en hier na zullen be-
schreeven worden.

*Hamor-
rhoides
externae.*

§ 703.

De behandeling der Aderspatten van den Pisblaas, is aan zeer veele moeilykhe-
den onderworpen, en meer Genees- dan Heelkundig. Doorgaans veröorzaaken
deeze Gebreken, eene zeer groote afscheiding van slym, welke de ontlasting der
Pis belemmerd, en dikmaalen verkeerdelyk beschouwd wordt als Etter.

6 K L A S S E.

De Watergezwellen.

§ 704.

*Tumores
aquis.*

Tot den rang der WATERGEZWELLEN, betrekke ik alle die verzaamlingen
van

van Water, welke in het Vetvlies plaats grypen, en een bepaald gedeelte van den omtrek eens Deels doen uitzetten; gelyk ook, die in eene der zogenaamde holten van het Lighaam voortkoomende, niet zoo zeer de gantsche uitgestrektheid dier holte, als wel een meer of min aanzienlyk gedeelte derzelver inneemen, en niet anders, dan door eenigerhande Heelkundige Hulpmiddelen kunnen gered worden.

§ 705.

Onder deeze derhalven, behooren het *Zugtgezwel*, het *Wyegezwel*, het *Watergezwel*, de *Algemeene Waterzugt*, het *Waterhoofd*, het *Watergezwel des Ruggraads*, de *Borst-Waterzugt*, het *Buikwater*, de *Waterzugt in een beslooten zak*, en de *Waterzugt der Gewrigten*.

Het Zugtgezwel.

§ 706.

Het **ZUGTGEZWEL**, is een zagt, wit, onpynlyk Gezwel, zeldzaam verzeld *Oedema.* van Ontsteking, toegeevende aan de drukking der Vingeren, en waarin het kenmerk dier indrukking, eenen geruimen tyd stand houdt.

§ 707.

By deeze Verschynzelen, welke tevens als Kentekenen van dit gebrek moeten aangemerkt worden, behoord nog, dat het meestal de uiterste Deelen aantast, en op het gevoel koud is, schoon den Lyder zelve, geen het minste gevoel van koude daarin waarneemt. Wy onderstellen egter, in de opgaave deezer kenmerken, dat het Zugtgezwel bestaat op zig zelve, en niet vermengd is met Roos, Ontsteking, en dergelyken.

§ 708.

De naaste oorzaak van dit Gezwel, is een verhinderden omloop der Vogten door de watervoerende Vaten, en somwylen ook, eene uitstorting van dit Vogt, in de vakjes van het celwyze Weefzel.

§ 709.

Tot de afgelegen Oorzaaken behooren, eene algemeene of byzondere verslapping der Vezelen; overvloed der Vogten; derzelver ziekyke gesteltheid; verhinderling des Omloops; te lang aanhoudende uiterlyke Drukking; eene dagelyks herhaal-

haalde loodregte stand van het Lighaam; Zwangerheid; verharding van sommige Ingewanden; en wat dergelyke meer zyn.

§ 710.

De behandeling van het Zugtgezwel, op zig zelve beschouwd, is naar de verschydenheid der Oorzaaken verschillend, en niet vatbaar voor algemeene Regelen. Als het van eenige innerlyke Ziekte afhangt, moet het door een Geneeskundig bestier geholpen worden. Door Zwangerheid veröorzaakt, is de Verlosing het voornaame Hulpmiddel. Als 'er Gezwellen liggen in de Nabyheid der groote Vaten, welke door toedrukking van deezen, het Gebrek veröorzaaken, is de wegneeming derzelver, het eenig Geneesmiddel tevens van het Zugtgezwel; en deeze onmooglyk zynde kan ook de geneezing van dit, niet bewerkt worden. Door Ouderdom, Teering, en eene allerzwaarste trap van Scheurbuikige ontbinding der Vogten veröorzaakt zynde, is het ongeneeslyk.

§ 711.

In 't algemeen egter, kan men de inwendige behandeling te hulp koomen, door het Wryven der beleedigde Deelen met warme Doeken; door berookingen met Speceryächtige dingen; en door oploffende, zoo wel, als versterkende Stovingen. Rygkouffen, als het aan de Beenen is; en matig fluitende Windzels om het Deel gelegd, moeten, als zoo veele niet onvermoogende Hulpmiddelen beschouwd worden.

§ 712.

Als het Zugtgezwel met Roos, Ontsteking, Verzweering, of Versterking verzeld is, koomen voornaamlyk te pas, die hulpmiddelen, welke in de Beschryving deezer Ziekten zyn aangewezen.

Het Wyegezwel.

§ 713.

*Tumores
Serosi.*

WYEGEZWELLEN noemt men dezulken, welkers ingehouden Vogt meestāl aan de gewoone hoedaanigheden der Wye beantwoord, en die tevens koud, bleek, onpynlyk, Veerkragtig, en minder indrukbaar zyn dan de Zugtgezwellen.

Deeze

§ 714.

Deeze Gezwellen worden fomwylen veröorzaakt door uiterlyke beleedigingen: dikmaalen ook, zyn ze het gevolg van Roos, Ontsteking, Kinderziekte, en dergelyken.

§ 715.

Derzelver veränderingen, faamengesteltheden, en behandeling, zyn vry gelyk aan die van het Zugtgezwel, en kunnen uit de Beschryving hier van, ontleend worden.

Het Watergezwel.

§ 716.

WATERGEZWELLEN zyn door zeker beroemd Heelmeester genoemd, dat soort van Gezwellen, door dewelke niet zelden het Werktuiglyke der Deelen geheel vernield word, en die meestäl afhangen van eene ophooping der Lympha in de Vaten, of deszelfs uitstorting in de Vakjes van het Celwyze Weefzel. *Tumores lymphatici.*

§ 717.

Deeze Gezwellen kunnen in alle deelen van het Lighaam zonder onderscheid, plaats grypen. Somwylen worden ze gemaakt onmiddelyk onder de Huid in het Vetvlies; fomwylen in de tusschenruimtens der Spieren; zeldzaam zelfs in het Beenvlies

§ 718.

In alle deeze gevallen geschied geen de minste verandering in de kleur of warmte der Bekleedzelen. Men gevoeld 'er zelfs nauwlyks eenige gewaarwordelyke pyn in, ten zy dezelve geplaatst zyn in zeer gevoelige Deelen, en door eene bovenmaatige vergrooting, eene uitrekking en spanning dier Deelen veröorzaakt: in deeze omstandigheid naamlyk, kunnen de smerten welke zy voortbrengen, onverdraaglyk zyn. In sommige gevallen, zynze van alle kanten nauwkeurig bepaald en omschreeven: in andere daarëntegen, beslaanze de gantsche uitgestrektheid van het Deel welk zy inneemen, en doen hetzelfde op eene verschriklyke wyze uitzetten. Altoos is hunne meeste dikte in het midden, en verminderenze allengskens naar den Omtrek. Schoonze algemeen genoomen, niet ten eenenmaale van vastheid en veerkragt versteeken zyn, zynze egter zulks minder dan de Knoest en

Vleeschgezwellen. Ze zyn daarënboven minder bepaald in omtrek, en noch zoo rond, noch zoo verschuifbaar, als de Spekgezwellen; en worden als ze zeer groot zyn, uitwendig besproeid met verscheiden verwyde Bloedvaten. In deeze laatste omstandigheid zelfs, geschied 'er niet zelden door het verwyden van de Huidöpeningen, eene zichtbaare ontlasting van een waterächtig Vogt, dat egter geen de minste verandering maakt in de uitgebreithed des Gezwels. Verscheiden dunne plekken, aan deszelfs oppervlakte zig voordoende, geeven veelmaalen een bedrieglyk vermoeden eener aanstaande doorbraak; en den Lyder sterft eindelyk, aan eene volstrekte uitteering. Alle deeze verschynzelen derhalven, moet men als zoo veel kenmerken deezer gebreken aanmerken.

§ 719.

Eene ontäarting der Lympha, verflapping der Watervaten, derzelver Kneuzing, toedrukking, en verbreeking, zyn de meest gewoone Oorzaaken deezer Gezwellen.

§ 720.

De Geneezing, die altoos aan veele moeilykheden onderhevig is, wordt in den beginne nogthans somwylen verkreegen, door afleidende, en verdunnende Geneesmiddelen; en het uitwendig gebruik van oplofende en te gelyk versterkende Pleisters, koude Pappen, en Stovingen, rykelyk bedeeld met het *Ammoniaksout*. Als ze geene zeer groote uitgebreithed hebben, kunnen ze met het Mes worden weggenoomen: in de tegengestelde omstandigheden, is de afzetting des Deels, dezelve als mooglyk ondersteld zynde, het eenig Hulpmiddel.

§ 721.

Eene aanmerking van veel gewigt ten opzigte deezer Gezwellen is, datze somtyds afhanglyk zyn van Venusmet, en vooräl met Kwikmiddelen, zoo uit als inwendig toegediend, moeten behandeld worden.

De algemeene Waterzugt.

§ 722.

Anasarca. Deeze Ziekte, die ook het LYFWATER genoemd wordt, bestaat in eene algemeene uitbreiding van den omtrek des Lighaams, door Water, opgehouden in de Cellen van het Vetvlies.

§ 723.

§ 723.

Gelyk dezelve meer behoord tot de Genees- dan Heelkunde, zullenwe alleenlyk daar omtrent aanmerken, datze gekend wordt aan eene bleeke, bolle, koude, en indrukbaare, dat is, zugtige zwelling van het geheele Lighaam; en dat somwylen inkervingen aan de Beenen, of het uitdryvend verband van T H E D E N, daarin zeer goede diensten gedaan hebben.

Het Waterhoofd.

§ 724.

WATERHOOFD, betekend algemeen genoomen, eene Vergrooting van den gantschen omtrek des Bekeneels door Water, ingeslooten, of in het uitwendig Vetvlies, of, in de holte des Bekeneels zelve. Het eerste soort geeft men den naam van het *uitwendig*, het laatste, van het *inwendig Waterhoofd*. *Hydrocephalus.*

§ 725.

Het *UITWENDIG WATERHOOFD* heeft alle tekenen van het Zugtgezwel, en wordt somwylen geneezen, door het gebruik van oplofende en versterkende Stovingen; door Blaardragten of inkervingen in den Nek; en door het toedienen van Buikzuiverende, Pisdryvende, Doorwaaszemende, en Versterkende Geneesmiddelen. *Hydrocephalus externus.*

§ 726.

Het *inwendig Waterhoofd* is algemeen of byzonder, en doet of het geheele bovenste gedeelte des Hoofds uitzetten; of bepaald zig slegt by een meer of min aanzienlyk deel van hetzelfde. Ordeshalven, kan men het eerste den naam geven van *algemeen*, het laatste dien van *byzonder inwendig Waterhoofd*. *Hydrocephalus internus.*

§ 727.

Het *algemeen inwendig Waterhoofd*, is kenbaar uit eene algemeene vergrooting van het bovenste gedeelte des Hoofds, gepaart met afwyking der Bekeneelsbeenderen, vergrooting van deezen, onindrukbaarheid der Zwelling, en dergelyken. Deze Ziekte, grypt meestäl plaats by Kinderen, zeldzaam by Volwassenen; en is vroeg of laat doodelyk. *Hydrocephalus internus uniserialis.*

§ 728.

Hydrocephalus internus particularis.

Het BYZONDER INWENDIG WATERHOOFD, heeft deze kenmerken. Eene omſchreeven, en van alle kanten bepaalde zwelling, verheft zig aan het een of ander gedeelte van den omtrek des Bekkeneels, en wel byzonderlyk, omtrent het Agterhoofd. Deeze zwelling, die meer of minder groot, en naar evenreedigheid gespannen is, heeft in de meeste gevallen een zekeren trap van doorchynenheid, en maakt geen de minſte verandering in de kleur der Bekleedzelen. Eene ligte ſchaving of ontvelling egter welke dikmaalen hier by komt, kan ten opzigte der laaſte byzonderheid, eenige verandering maaken. Aan den omtrek van den Schynbaaren grond des Gezwels, welkers afmeetingen in verſcheiden gevallen verſchillend zyn, voelt men ſomwylen een Beenächtige kring, gemaakt door eene ontbeering van het Been binnen deſzelfs bepaaling. De uitgeſtrektheid der Zwelling, die aanſtonds na de geboorte, byna zyn volkoomen beſlag heeft, wordt eenigermaten verminderd door drukking: en deeze twee laaſte omſtandigheden inzonderheid zyn het, door dewelke dit Gezwel van alle andere Gezwellen onderscheiden wordt.

§ 729.

Deeze Ziekte, overſchreid niet minder de paalen der Genees- en Heelkunde, dan de vorige, en is altoos, en in alle gevallen doodelyk.

Het Watergezwel des Ruggraats.

§ 730.

Spina bifida.

Door het WATERGEZWEL DES RUGGRAATS verſtaat men eene dergelyke zwelling als het laaſt voorgaande, aan het een of ander gedeelte des Ruggraats van agteren, vergezeld van eene ontbeering der Uitſteekzels van de overëenkomſtige Wervelen, en veelmaalen ook van een inwendig Waterhoofd.

§ 731.

In dit gebrek wordt de omtrek van den grond des Gezwels bepaald door de zydelyke deelen der Wervelen; en moet deſzelfs oorsprong gezogt worden, dan eens in het inwendig Waterhoofd, dan eens, in eene Waterige Verzaamling, in de holte zelve van den Ruggraat.

§ 731.

§ 732.

Altoos is hetzelfde aangeboren; onvatbaar voor eenigerlye Geneeswyze; en uit zynen eigen aart doodelyk. Het Leven egter, kan in enkele gevallen, verscheiden Maanden of Jaaren stand houden; en, gelyk dit meestäl schynd af te hangen van de geheelheid des Gezwels, zo is het de pligt van den Heelmeester, om zorg te draagen, dat dezelve zoo lang mooglyk ongeschonden blyve. De bescherming van het Gezwel, voor uiterlyke beledigingen; en de behandeling der dekkende bekleedzelen door eenigzints saamentrekkende aanlegzels, zyn hier toe de voornaame hulpmiddelen.

§ 733.

Dat sommige Gezwellen van deezen aart, gepaart gaan met eenen binnenwaards gekeerden stand der Voeten, en verlamming der onderste Ledemaaten; andere met eene werkloosheid van de sluitspier des Pisblaas, en hier van afhangende onwillige afloop der Pis, als het Lighaam eenen loodlynigen stand gegeven wordt, zyn byzonderheden, welke ik niet voorby kan hier aan te merken.

§ 734.

Ik zegge niets, aangaande de voortbrengende oorzaken deezer Gebreken, omdat dezelve my geheel onbekend zyn, en ik geen gebruik wil maaken van gissingen, altoos verwand met de dwaaling.

De Borstwaterzugt.

§ 735.

Eene verzaamling van Water in een der zakken van het Borstvlies, of in beiden te gelyk, wordt BORSTWATERZUGT genoemd.

*Hydrops
Pectoris.*

§ 736.

Moeilyke ademhaaling, een drooge hoest, vermoeidheid by de geringste Lighaamsbeweeging, eene afgebrooken slaap, geringe pisöntlafing, en eene kleine zwakke, ongelyke of tusschenpoozende Pols, zyn de gemeene, schoon niet onbedrieglyke kenmerken deezer Ziekte.

§ 737.

Bestaat het Water slegts een der Borstholten, dan ligt men gemaklyk op de
zie-

zieke, bezwaarlyk op de gezonde zyde; en bespeurd men niet zelden eene uitzetting der eerste.

§ 738.

Is de uitstorting aan beide zyden, kunnen de Zieken nimmer regt uit liggen, maar moeten den meesten tyd zitten, en zoo wel het Hoofd als de Borst, meer dan naar gewoonte oprigten.

§ 739.

In beide gevallen zonder onderscheid, worden de onderste Ledemaaten dikmaalen bezet met eene zugtige Zwelling. Hetzelfde gebeurt aan de Armen, die tevens somwylen kragtloos, of lam worden.

§ 740.

De behandeling deezer Ziekte is voor het grootste gedeelte Geneeskundig. Het zetten egter van Blaardragten, of Fontanellen, en de aanleg van de *Ecorce de Garou*, aan de Armen, de Beenen, of de Borst zelve, zyn dikmaalen van nut bevonden. In sommige gevallen is de *Borstöpening* het eenig hulpmiddel.

Het Buikwater.

§ 741.

Ascites. Het BUIKWATER, is eene verzaamling van Water in de Buiksholte, binnen de bevatting van het Buikvlies.

§ 742.

Deeze Ziekte, die veelmaalen vermengd is met eene algemeene Waterzugt, wordt, als ze op zig zelfs bestaat, gekend, aan eene algemeene uitzetting van den Buik, verzeld met een gevoel van zwaarte, vogtgolwing, en dergelyken.

§ 743.

Al de hulp welke de Heelkunst in dit geval kan toebrengen, bestaat in het doen eener Kunstbewerking, ter ontlasting van het ingeslooten Water. Al het overige is Geneeskundig, zoo wel als de beschouwing der Oorzaaken van welke het zelve afhangt, en de bepaaling van het Tydstip waar in Voorgemelde bewerking moet gedaan worden.

*De Waterzugt in een beslooten Zak.**Hydrops
saccatus.*

§. 744.

Onder deezen naam, begrype ik alle Verzaamlingen van Water, in één of meer Vliesagtige bekleedzelen beslooten, voor zoo veel dezelve naamlyk, in een der voornaamste holligheden van het Lighaam plaats grypen. De *Waterblaasjes* derhalven, de *Waterzugt des Buikvlies*, gelyk ook, die der *Vrouwelyke Eijernesten*, moeten allen hier toe gebragt worden.

§ 745.

Door *WATERBLAASJES*, verstaat men zekere aanéénschaakeling van *Vliezige Zakjes*, met een Wateragtig Vogt opgevuld, en beslooten in de holte van het Hoofd, van de Borst, van den Buik, of van het Bekken.

Hydatides

§ 746.

Weinig Ziekten misschien zyn 'er, welkers kenmerken zoo bezwaarlyk kunnen bepaald worden dan deeze. Die van den Buik egter zyn het meest blykbaar, dewyl dit Deel, naar evenreedigheid van de grootte en hoeveelheid deezer Blaasjes, door eene meer of min omschreeven zwellling, waarin men somwylen vogtgolving waarneemt, uitzet. De Pis daarénboven, is niet zelden bezet met steenagtige Lighaamtjes, en wordt niet geloofd dan met moeite, en in eene kleine hoeveelheid. By dit alles voegt zig veelmaalen eene hardnekkige opstopping van den Afgang, Koorts, en eene zeer lastige verzaamling van Lugt in den Darmbuis. Het spysverteerend vermoogen eindelyk van de ingewanden des Buiks, wordt ten meesten deele vernietigt; de Lyder is veelmaalen onderworpen aan braakingen; en niet zelden gebeurd het, dat by Vrouwen, de natuurlyke ontlasting der Maandstonden, of geheel agter blyven, of in de uiterste wanorde gebragt worden.

§ 747.

De *WATERZUGT DES BUIKVLIES*, wordt oneigentlyk dus genoemd, en is inderdaad niet anders dan eene verzaamling van Water in de vakjes van het Celwyze Weefzel, dat dit Vlies verbind met de binnenste oppervlakte der Buikspieren.

*Hydrops
peritonei.*

§ 748.

In dit foort van Waterzugt, maakt de verzaamling meestäl eene verbreeking der
X vlies.

vliesagtige tusschenscheidzels, die het eene vakje van dit Weefzel, afscheid van het andere; en als dan is hetzelfde begreepen in ééne, en van alle kanten bepaalde holte. Somwylen egter gebeurd het, dat de geheelheid deezer tusschenscheidzels, in weêrwil der uitstorting ongeschonden blyft; en in dit geval is het Vogt verdeeld door alle Celletjes van het meêrgemelde Weefzel; maakende dus een soort van Waterzugt, 't welk zeer wel tot de *Waterblaasjes* kan gebragt worden.

§ 749.

De Kentekenen deezer Ziekte, zyn algemeen genoomen, duidelyker dan die der vorige. De Buik naamlyk, is naar evenreedigheid der uitstorting, door eene meer of min bepaalde Zwellings, meer of min uitgezet. De Navel, die natuurlyk een weinig is ingedrukt, verheft zig dikmaalen, als de uitstorting algemeen is, tot eene aanzienlyke hoogte. Scherpe pynen, in de meeste gevallen met Koorts verzeld, doen de kragten des Lyders verloren gaan. De Dyën niet alleen, maar ook de Beenen, zyn bezet met eene zugtige opblaazing. De Ademhaaling is belemmerd; de Eetluft bykans vernietigt; de Dorst daarëntegen onleschbaar; en men gevoeld door eene beurtelingsche tikking der Vingeren, aan wêerzyden van den Buik geplaatst, zeer duidelyk eene vogtgolwing. De laatste byzonderheid egter, is alleen betreklyk tot dat soort deezer Ziekte, in dewelke het uitgevaate vogt, in niet meer dan eene holte begreepen is: in de tegengestelde omstandigheid naamlyk, moet men inzonderheid besluiten uit de ongelykheid der opzwellings, vergeleeken met de overige toevallen, welke wy zoo aanstonds beschreeven hebben.

§ 750.

De gevolgen van beide deeze soorten van Waterzugt, zyn ten uitersten verderflyk. In den beginne egter, is het mooglyk, datze door een Heelkundig handwerk, waar van we hier na zullen spreekken, geneezen worden. Het is niet even eens gelegen, als de Ziekte zeer verre gevordert is, en de groote uitgestrektheid, of de menigvuldige aanhegtingen van den Zak, of der Zakken, aan de nabuurige Deelen, niet toelaaten dat derzelve holtens door inkrimping vernietigt worden. In dit geval waarlyk, is dezelve vroege of laat doodelyk.

§ 751.

*Hydrops
ovarii.*

De WATERZUGT DER VROUWELYKE EIJERNESTEN, is eene tegen-natuurlyke vergrooting deezer Deelen, ingevolge eener meer of min groote Ver-
zaam

zaamling van Water in dezelve; 't zy dat zulks afhanglyk is van eene ontäarting der Eijeren daarin bevat, of wel, van eene vermeerderde opvulling der Waterblaasjes, welke fomwylen tusschen dezelve verspreid zyn; of eindelyk van eene ophooping in het sponsächtig Weefzel zelve der Eijeresten.

§ 752.

Dit gebrek, heeft in den beginne zeer twyffelächtige kenmerken. De Zieke zelfs, gevoeld in dit Tydperk zoo weinig Ongemak, en alle werkingen van het Lighaam worden met zoo veel vryheid voltrokken, dat het nauwlyks mooglyk is, eenige ongesteltheit van dien aart te vermoeden. In het vervolg egter, verschy-
nen 'er eene groote menigte Toevallen, van dewelke de eene minder, de andere meerder, deszelfs daadelyk bestaan aantoonen. Het eerst blykbaar teken 't welk zig opdoet, is eene harde en bepaalde Zwelling aan deeze of gene zyde van den Onderbuik, onmiddelyk boven de Schaambeenderen. Deeze Zwelling is in som-
mige gevallen vergezeld met Pyn, die zig niet alleen in het Bekken, maar ook in de Heup, en langs de uitgestrektheid des Dyes doet gevoelen; en in andere ge-
vallen gepaart gaat, met eene bezwaarlyke ontlasting der uitwerpzelen. De dagelyk-
sche toeneeming der uitzetting vervolgens, vermeerdert op eene langzaame wyze den omtrek des Buiks; en wel fomtyds tot zoo verre, datze de maat van 3, 4, en meer Ellen, te boven gaat. In deezen toestand, worden dikmaalen de Maandstonden in wanörde gebragt, of derzelver gezette ontlasting vernietigt. De Spysverteering bedorven wordende, gaat de Eetlust verlooren; en de Zieke vervalde wel haast in eene volstrekte uitdrooging. De Ademhaaling, die tot hier toe onbelemmerd voltrokken werdt, geschied niet dan met eene allerüiterste be-
zwaardheid. De Dorst wordte onleschbaar; de Pis weinig, dik, troebel, en als met roode geklopte steenen gemengd. Het ingenoomen Voedzel wordte zonder eenige verändering door Braaking uitgeworpen. De Pols is klein en ras. De kleur des aangezichts wordte bedorven; en de Lyfmoeder eindelyk, maakt niet zel-
den eene aanmerklyke uitzakking in de Scheede.

§ 753.

Weinig gevallen zyn 'er, waarin dit soort van Waterzugt, schoon met de meest vermoogende Hulpmiddelen te keer gegaan, geen doodelyk uitēinde gehad heeft. Het Handwerk zelfs, 't welk wy op zyne plaats zullen voordraagen, doet

in de meeste gevallen niets dan de Ziekte voor eenigen tyd draaglyk maaken, en moet meer beschouwd worden als onderhoudend, dan als geneezend.

De Waterzugt der Gewrigten.

§ 754.

De Gewrigten zyn onderworpen aan eene Zwelling, welke men den naam ge-
Hydar- geeven heeft van WATERZUGT, schoonze veelmaalen geheel geene overëen-
chron. komst heeft met deeze.

§ 755.

Somwylen naamlyk, bestaatze alleen in eene verzaamling van het Lidvogt, dat zeekerlyk geen water is, in de holte der gewrigten zelve; somwylen, en dit is het eenige geval welk dien naam verdiend, in een soort van *Zugtgezwel*, dat zig bepaald tot de omvangende Deelen des Gewrigts.

§ 756.

Het eerste geval is kenbaar aan eene Zwelling, die, hoe groot ze ook zyn mooge, nauwkeurig omschreeven is; en zig niet uitstrekt tot de naastgelegen Deelen. De Beenhoofden welken het lydend Gewrigt saamenstellen, wyken van elkander; dat is te zeggen, derzelve natuurlyke afstand, wordt op eene blykbaare wyze vermeerderd. De uitzetting welke het Gewrigt ondergaat, wordt niet zelden door den tegenstand der Zybanden, als 't ware verdeeld in twee afzonderlyke uitzettingen. De Pyn, die somwylen zeer hevig is, doet zig voornaamlyk gevoelen ter plaatze deezer Banden, in de holte des Gewrigts; en wordt altoos vergroot door de beweging. Met betrekking tot het Kniegewrigt kan men hier nog byvoegen, dat de Knieschyf door het ingeslooten Vogt voorwaards geperst wordt, en deeze, met de Vingeren gedrukt zynde, geen tegenstand ontmoet, dan wanneer dit Vogt is weg geweeken.

§ 757.

De gevolgen van dit gebrek, als hetzelfde eenigermaten veröuderd is, zyn ten uiterste verderflyk. De Scherpthe naamlyk, welk het verzaameld Vogt dikmaalen verkrygt, veröorzaakt eene zeer gevoelige prikkeling in de omvangende deelen des Gewrigts, en verteerd de bedekkende Kraakbeenderen der gewrigte Beenhoofden niet alleen, maar ook de Beenhoofden zelve. Somwylen zelfs,
 koo-

koomen 'er Uitgroeiingen van Been, welke, van weêrzyden in elkander schieten, en eene waare Gewrigtsverfstyving maaken. Deeze zelfde stof daarënboven, baand zig veelmaalen een weg door de Bekleedzelen; en ontlast zig geheel, of ten deele, in de gedaante van een dik, lymagtig Vogt, eenigermaaten naar witte Honig gelykende, en door de Grieken den naam gegeven van *Melicera*. In dit geval koomen 'er Pypzweeren, welke zeer dikmaalen van Vleeschagtige Uitwasfen gevolgt worden.

§ 758.

Het tweede foort deezer Ziekte § 755. aangewezen, heeft eene grooter uitgebreidheid, is minder pynlyk, heeft geene vogtgolving, behoud voor eenen zeke- ren tyd het indrukzel der Vingeren, en is zonder afwyking der geleede Beenderen.

§ 759.

Dit gebrek kan het gevolg zyn eener algemeene ontbinding der Vogten tot eene wateragtige dunheid; in zyne uitwerking op deeze Deelen, door toevallige oorzaaken bepaald. Het kan ook afhangen van plaatslyke beleedigingen, welken, door de veerkragt des deels te vernietigen, of door het verbreeken der Watervaten, eene uitstorting of ophooping maaken in het Vetvlies.

§ 760.

Somwylen gebeurd het, dat het vogt, welk in dit geval in het Celwyze Weefzel huisvest, eene zeer flymerige gedaante heeft, en by de minste beweeging van het Deel, een geluid maakt, als Perkement dat gekreukt wordt. Deeze omstandigheid vermeerderd zeer de moeilykheid der Geneezing. Veröuderde gebreken van deezen aart, breiden zig dikmaalen uit tot in de holte des Gewrigts zelve, en hebben als dan gemengde kentekenen.

§ 761.

Ter behandeling van het eerst beschreeven foort deezer Ziekte, dienen voor- al waterdryvende Purgeermiddelen; *Diuretica*; Wryvingen met den *Geest van het Ammoniakzout*; Pappen bereid uit Gort in sterke roode Wynmoer gekookt, en bedeeld met eene ruime hoeveelheid *Ammoniakzout*; smeltingen van dit zout in *Pis*, *Wynmoer* of *Kalkwater*; als mede de Loogen uit Afch van Eikenhout en Wyngaardranken, met meergemeld Zout, zoo veel mooglyk zy aangezet. Her-

haalde Blaardragten, gemaakt aan den omtrek des Gewrigts; het uitdryvend verband van THEDEN; de rust van het beleedigt Deel; en meer andere dergelyke Hulpmiddelen, koomen hier nevens in aanmerking. Indien alles in gebreke blijft om de oplossing der zwelling te bevorderen, moet men het ingeslooten Vogt eenen uitgang bezorgen door eene insnyding, die weinig uitgestrektheid heeft; door eene doorbooring met de driekante Priem; of door den aanleg van een Bytmiddel op de meest voordeelige plaats der zwelling. De laatste handelwyzen egter, zyn zeldzaam noodzaaklyk, als de eersten tydig, en met genoegzaame gezetheid gevolgt worden. Ik ten minsten, hebbe my nog nimmer in de noodzaaklykheid bevonden om daar van gebruik te maaken, schoon ik met waarheid kan zeggen, een verbazend aantal deezer Gebreken behandeld te hebben, en daar onder sommigen, waarin anderzints zeer bekwaame Heelmeesters, de afzetting des Deels, als het eenig Hulpmiddel hadden voorgesteld.

§ 762.

In het tweede foort, wordt de behandeling begonnen met het toedienen van Geneesmiddelen, welken niet tot ons onderwerp behooren. Uitwendig, bediend men zig eerst van de wryvingen met den *Geeft van het Ammoniaksout*, en het uitdryvend verband, geholpen door de rust van het Deel; en deeze niet helpende, van dezelfde Pap als in het vorige geval; van eene andere, bereid uit de *wilde Wyn-gaard Wortel*, met *azyn* en *sout* gekneusd; en van eene aanhoudende Blaardragt, die byna den gantschen omtrek des Gewrigts inneemt. Als dit geval zig tot in de holte des Gewrigts tevens uitbreid, en geene der aangewezen hulpmiddelen van eenige uitwerking zyn, neemt men den toevlugt tot eene dier handwerken, welke wy zoo aanstonds hebben aangewezen.

§ 763.

Van de beschreeven Ziekten der Gewrigten moet wel onderscheiden worden, zekere schielyke vloeijingen eener Jigtige of Zinkingagtige stof op dezelve, gelyk ook zekere, zeer pynlyke zwellingen van deeze, veröorzaakt door Venusmet. De eerste wyken doorgaans gemaklyk voor verwarmende en oplofende Plaatsmiddelen. De laatste eischen het uit- en inwendig gebruik van Kwikbereidzels.

7. K L A S S E.

De Vleeschgezwellen.

§ 764.

Gezwellen, uit eene vaste zelfstandigheid bestaande, en waarin geen de minste vogtsverzamling plaats heeft, worden doorgaans allen betrokken tot den rang der VLEESCHGEZWELLEN, schoon sommige derzelver waarlyk, zeer weinig overëenkomst hebben met eene vleeschagtige zelfstandigheid. Het eigentlyk du genaamd *Vleeschgezwel* zelve, de *Neusprop*, het *Hoornagtig uitwas*, de *vleezige uitwassen van het Tandvleesch*, de *vleeschprop der Vrouwelyke Teeldeelen*, en de *Sponsagtige uitzetting der Gewrigten*, zyn zoo veele ondergeschikte soorten van deez.

*Sarcoma-
ta.**Het Vleeschgezwel.*

§ 765.

Het VLEESCHGEZWEL, is eene ontarting van het Celwyze Weefzel binnen eenen zekeren bepaalden omtrek; eene ontäarting, welke misschien afhanglyk is van eene uitbreiding der Vaten zelve van dit Weefzel.

Sarcoma.

§ 766.

Men onderscheid hetzelve in twee soorten: in een *aangebooren* naamlyk, en *verkreegen*.

§ 767.

Het AANGEBOOREN VLEESCHGEZWEL begint altoos met eene roode, paarsche, of anders gekleurde Vlek, welke gemeenlyk MOEDERVLEK genaamd, en ten onregte aan de grillige verbeelding der Zwangeren toegeschreeven wordt. Deeze Vlek verheft zig allengskens en onder verschillende gedaantens, boven de oppervlakte van het Huidweefzel; een Gezwel maakende, dat meer of min groot wordt, onpynlyk, en altoos miskleurig is. Dat hetzelve, reeds zeer kort na de geboorte stand grypt, en tot eene zekere hoogte gekoomen, somwylen, gedurende het gantsche Leven onveränderd hetzelfde blyft, kan men hier nog by voegen.

*Sarcoma
matrum.**Nvus
matrum.*

§ 768.

§ 768.

*Sarcoma,
postnativi-
tatem ac-
ceptum.*

Het VERKREEGEN VLEESCHGEZWEL, vertoond zig van den beginne af als eene vaste, weêrstreevende, en onpynlyke Zwelling, welkers hardheid minder is dan die van het Knoestgezwel, maar meerder dan die van alle andere Gezwellen. Meestäl, is de kleur der Bekleedzelen in dit gebrek onveränderd. Het heeft niet zelden een dunnen hals, eene knobbelächtige oppervlakte, en groeid onverschillig en met langzaame vorderingen, op alle deelen van het Lighaam, de geringste zelfs niet uitgezondert. Wanneer hetzelve toevallig doorbreekt, veröüderd is, of door verkeerde behandelingen getergd wordt, krygt het somwylen eenen zeer grooten trap van kwaadäartigheid, en veröorzaakt toevallen, niet ongelyk aan een geöpent Kreeftgezwel.

§ 769.

De geneezing van het eerste soort deezer Gezwellen, verkrygt men op eene onfylbaare wyze, alleen door het dagelyksch gebruik van den *Geeft des Zeezouts*; en van het laaste, somwylen door het zelfde hulpmiddel, somwylen door het Mes, en in zekere omstandigheden, alleen door de afzetting van het aangedaane Deel. De verschillende staaten deezer Gebreks, deszelfs verschillende Zitplaats, gelyk ook het afzyn of de tegenwoordigheid van eenigerlye toevallige gebreken, bepaalen inzonderheid deeze verscheidenheid, en tegelyk de gemaklyke, moeilike, of onmooglyke geneezing van hetzelve.

§ 770.

Hoedaanig men zig van voorgemelden Geeft, ter behandeling der Vleeschgezwellen bedienen moet, zoude ik met stilzwygen kunnen voorbygaan, indien ik niet door de ondervinding geleerd had, dat hier omtrent aanmerklyke misflagen begaan worden, die maar al te dikmaalen aanleiding gegeven hebben tot mislukkingen. Zy bestaat kortelyk hier in. Men bestrykt door middel van een Penfeel, daar mede, 2, 3 en 4 maalen Daags, de gantsche oppervlakte van het Gezwel; zorgvuldig in agt neemende, dat men de paalen van deszelfs omtrek niet te buiten gaa. Na verloop van eenigen tyd, hier door eene doode korst gemaakt zynde, wordt deeze, zoo lang dezelve vast houd, op gelyke wyze bestreeken, tot dat ze de gantsche dikte van het Gezwel inneemt, en dit, als geheel daar in veränderd is. Wanneer, gelyk meestäl gebeurd, de Korst afvalt voor en alëer de geneezing dus verre gevordert is, en het overblyvende gedeelte des Gezwels

zweels, eene Zweerende oppervlakte aanbied, moet men deeze doen droogen door den aanleg van het *Kalkwater*, en vervolgens dezelfde behandeling hervatten.

Het Hoornägtig Uitwas

§ 771.

Het HOORNAGTIG UITWAS verschilt nauwlyks van het Vleefchgezwel, *Cornuus*, dan in hardheid, en doordien het doorgaans, zoo dra het deezen naam verdiend, eene bruine of zwarte kleur heeft.

§ 772.

Altoos begint het met een wratägtig puistje, dat de hardheid heeft van Eelt, en allengskens grooter wordt. Uit zyn eigen aart is het onpynlyk, en veroorzaakt weinig ongemak. Ik hebbe het nimmer gezien dan aan de Lippen. Getrouwe Waarneemingen egter bewyzen, dat het ook op andere plaatsen van het Lighaam kan voortkoomen.

§ 773.

Somwylen kan hetzelfde geneezen worden door den *Geeft van Zeezout*, op dezelfde wyze toegediend als in de Vleefchgezwellen: Somwylen daarëntegen, wykt het niet voor dit Hulpmiddel, en is de uitsnyding onvermydelyk.

§ 774.

Als dit gebrek aan verscheiden deelen te gelyk plaats grypt, heeft men reeden om eene zeer byzondere ongesteltheit der Vogten, als nog onbekend, te vermoeden.

De Neusprop.

§ 775.

Onder den naam van NEUSPROP bevat men alles wat in de holten der Neus uitwascht, van welk eene vastheid, gedaante, of grootte, zulks ook zyn mooge. *Polypus nasi.*

§ 776.

De algemeene kenmerken van dit gebrek zyn deeze. Uit het vlies waarmede de Neusholten bekleed zyn, aan de eene of andere zyde van het Neussichot, of aan beide zyden te gelyk, groeid een sponsägtig, zagt, hard, rood, wit, en pynlyk of

onpynlyk Gezwel, dat dan eens klein, dan eens groot, fomwylen aan het voorste, meermaalen diep in den Neus is vastgehegt; en, of binnen de Neusholten bepaald blyft, of niet alleen voor, maar ook agter uit dezelve, tot eene meer of min aanzienlyke groote uitſpat.

§ 777.

Somwylen is de Neusprop van den aart der Vleeschgezwellen, fomwylen van die der Uitwaffen uit Beenbederf oorspronglyk. Meermaalen is ze niet dan een foort van Slymgezwel, uit eene ophooping van het natuurlyk slym in de Slymbeursjes zelve voortſpruitende. In enkele gevallen, heeftze de vaſtheid van Kraakbeen, en ſchynd als eene enkele verlenging van een der Kraakbeenige Stukken van den Neus, te moeten beſchouwd worden. Van alle deeze verſcheidenheden is het, dat de byzondere kenmerken, beoordeeling, en geneezing deezer gebreken afhangen.

§ 778.

De *Vleeschagtige Neusprop*, vertoond zig onder de gedaante van een rood, vaſt en ſponsagtig uitwas, dat fomtyds onpynlyk is, vooräl in den beginne; maar vervolgens, door toeneeming pynlyk wordt, loodverwig, en aan deszelfs oppervlakte bezet raakt met Aderspatten, welke een zeer groote kwaadaartigheid aanwyzen. Dit gebrek is minder gemeen dan de overige, en, als 'er de laaſtgemelde verſchynzelen by zyn, ongeneeslyk.

§ 779.

Die *Neusprop welke van den aart is der Uitwaffen*, grypt meest plaats by Menſchen, in dewelke eene Pokkige, Scheurbuikige, of Kropzeerige ongeſteltheid der Vogten de overhand heeft, en is het enkel gevolg van een Beenbederf 't welk het Zeefbeen, de Neusbeenderen, de Sponsbeentjes, het Opperkaaksbeen, het Wiggebeen, of de Verhemeltensbeenderen heeft aangegreepen. Men beſluit tot derzelver aanweezen, uit het vooräfgaan eener ſtinkende Neuszwcer, gepaart met de zagtheid, ligt roode kleur, en ſchielyke toeneeming der Uitzetting. Dit geval is niet geneeslyk dan na het opruimen der oorzaaken van welke het afhangt, 't gene fomwylen uitermaaten bezwaarlyk is.

§ 780.

De *Slymagtige Neusprop* bezet fomwylen een groot gedeelte van het Snotvlies. In den beginne is ze ſlap, naderhand wordtze vaſter, en verkrygt, zeer verönderd

derd zynde, veelmaalen eene aanmerklyke trap van hardheid. Men kan haar aanmerken, als de gemeenzaamste van allen, en die het gemaklykst kan geneezen worden.

§ 781.

De *Kraakbeenige Neusprop* behoord misschien meer tot de speelingen der Natuur, dan tot de Klasse der Gezwellen, veröorzaakt geenerlye ongemak, en vordert geheel geene Hulpmiddelen. Ik hebbe 'er alleen van gesproken om den Jongen Heelmeeester oplettend te doen zyn, en hem by voorkoomende gelegenheden te bevryden van mislagen.

§ 782.

De gevolgen der Neusproppen, wanneerze eenige aanzienlyke grootte gekreegen hebben, zyn deeze. Eene verhinderde Ademhaaling; wegdrukking van het Neuschot naar de tegenstelde zyde; verstopping der Neusbuis; nederdrukking der Verhemeltens beenderen naar de holte van den Mond; voorwaards drukking van het slappe Verhemelte; Pyn; Bloedstorting; gebreklyke Spraak, en Verfstikking.

§ 783.

Alle Neusproppen, de tweede soort slegts uitgezondert, zyn met niet meer dan een *Pedunculus* aan de plaats haarer oorsprong vastgehegt. Men moet op deeze byzonderheid wel agt geeven, omdatze de regelmaat is van alle onze behandelingen.

§ 784.

De meest zekere Geneeswys derzelve is de Kunstbewerking; die nogthans verboden is, in het geval van kwaadäartigheid § 777. beschreeven. Somwylen, als ze niet zeer hard zyn van zelfstandigheid, heeft men haar doen inkrimpen met Saamentrekkende, of verteerd met Bytmiddelen: in de meeste gevallen egter, zyn allerlye plaatsmiddelen nutloos. Toevallige gebreken daar nevens gaande, moeten deeze, op hunne wyze behandeld worden.

De Vleeschagtige uitwassen van het Tandvleesch.

§ 785.

De VLEESCHAGTIGE UITWASSEN VAN HET TANDVLEESCH, die *Epulides*, zeer dikmaalen voorkoomen, zyn meer of minder groote, vaste, bleekroode,

niet ontsteken, dog somwylen pynlyke Gezwellen, uit de zelfstandigheid van het Tandvleesch voortspuitende.

§ 786.

Deeze gebreken bestaan dikmaalen op zig zelfs, en zyn somtyds het gevolg van Beenbederf. In het eerste geval behoorenze tot den rang der Vleeschgezwellen, in het laatste tot die der Uitwassen.

§ 787.

De eersten, alsze niet buiten gemeen groot zyn, of eene kraakbeenige hardheid hebben, geneezen veelmaalen gemaklyk doorze dagelyks eenige reizen te bestryken met den *scherpen Geest des Zeezouts*: de laatsten zyn ongeneeslyk, zoolang het Beenbederf zelve aanhoud, en eischen niet zelden het gebruik van het Brandyzer.

§ 788.

Veröuderde gezwellen van het eerste soort, zyn ten opzichte der geneezing vrygelyk aan de tweede; dat is te zeggen, datze veelmaalen niet, dan door branding geholpen worden. Als deeze versch zyn, en een dunne hals hebben, is een omgelegd bindzel doorgaans een beslissend hulpmiddel.

§ 789.

'Er zyn gevallen, waarin een schynbaar Uitwas des Tandvleesch, inderdaad een Neusprop is, gevormd in den Symbuezem van het Opperkaaksbeen. In deeze omstandigheid vertoondze zig doorgaans in de nabyheid van een bedorven Maaltand, en wordt somwylen verzeld van een dergelyk uitwas in de Neusholte van dezelfde zyde. De geneezing is als dan zeer onzeeker, om dat men van vooren nimmer bepaalen kan, waar de grond van het Gezwel zyn zal. Bevind zig deeze nogthans gelukkig, digt by den grond der Kas, welke de bedorven Kies insluit, zookrygt men de geneezing, door die Kies uit te trekken, het uitwas weg te snyden, en de Kas tot in de holte stoutelyk te doorbooren met het Brandyzer. Ik ben deeze aanmerking, die ik niet weete dat door iemand gemaakt is, verschuldigt aan mynen verstandigen en oordeelkundigen Vriend, den Heere MARTENS, by gelegenheid eener dergelyke Kunstbewerking door hem gedaan, en die alle gevolgen hadt, welke men immer hoopen of verwagten kan.

*De Vleeschprop der Vrouwelyke Teeldeelen.**Cercosis.*

§ 790.

Onder dezen Naam, verstaat men een vleeschagtig Uitwas, beslooten in de Lyfmoeder of Schede, en uit de Zelfstandigheid deezer Deelen voortspruitende.

§ 791.

Dit Gezwel, dat dan eens binnen de bepaaling der Teeldeelen beslooten blyft, dan eens tot buiten de lippen der Schamelheid zig uitstrekt, is oorspronglyk uit de binnenste oppervlakte der Lyfmoeder, uit die van derzelve Hals, van den omtrek der Moedermond, of uit de binnenste oppervlakte der Schede, Deeze verscheidenheden maaken vier onderscheiden soorten deezer Gebreken, ieder van welken, zig door byzondere verschynzelen kenbaar maakt.

§ 792.

In het eerste geval naamlyk, zoo lang het gebrek binnen de holte van de Lyfmoeder beslooten blyft, gevoeld de Zieke eene zekere zwaarte in dit Ingewand; heeft eene meer of min belemmerde ontlasting der Pis, en van de stof des Afgangs; en gebeurt 'er eene langzaame, dog aanhoudende ontlasting van Bloed door de Schede, zoo dra hetzelfde tot in dit Deel doorzakt, en men het, met den Vinger kan waarneemen.

§ 793.

In het tweede geval, besluit men tot deszelfs aanwezen, uit het gevoel van een meer of min vast, vleeschagtig Lighaam, in de holte der Schede; langs welkers geheelen omtrek, men den Vinger vryelyk beweegen kan; uit den tegenstand welke men gewaar wordt, een weinig hooger dan de rand is van den mond der Lyfmoeder; uit het afzyn der Bloedvliet aan die der voorgaande soort eigen; en, uit eene merkbare omvouwing van den zoo even gemelden rand der Moedermond naar agteren.

§ 794.

Het derde geval, eischt niets dan het gezigt en gevoel, om ons te verzeekeren van deszelfs aanwezen. Het onderzoek met den Vinger naamlyk, die men rondom de plaats der aanhegting met veel vryheid beweegen kan; en de natuurlyke gesteltheid van den mond der Lyfmoeder, bewyst hetzelfde ontegenzeglyk.

§ 795.

Schoon alle deeze Uitwasfen, voor zoo veel derzelve innerlyk faamenstel en oorsprong betreft, van denzelfden aart zyn als de Vleeschgezwellen; zynze egter, algemeen genoomen, minder kwaadäartig dan deezen. Die van het eerste foort ondertuffchen, kanten zig eerst aan tegen de geregelde ontlasting der Maandftonden, en verwekken naderhand aanhoudende Bloedvloeijingen, welken beiden verscheidenerlye wanordes in de werkingen des Lighaams veroorzaaken, en niet zelden van eenen langzaamen Dood gevolgt worden.

§ 796.

Indien deeze gebreken, gelyk fomwylen gebeurd, niet van zelfs afvallen, zynze niet geneesbaar, dan door het Handwerk, van hetwelk het hier de plaats niet is te spreken.

Het Sponsgezwel der Gewrigten.

§ 797.

Fungus articularum. Het SPONGGEZWEL, UITWAS, en WITTE ZWELLING DER GEWRIGTEN, zyn zoo veele byzondere benaamingen, op eene en dezelfde Ziekte toegepast. Men verstaat 'er naamlyk door, zulk een Gezwel, 't welk, uit het binnenste der Gewrigten zelve zynen oorsprong neemt, de tegenstand van alle omvangende Deelen overwind, en zig uitwendig, naar deszelfs byzondere omftandigheden, met verschillende vertoonzelen aanbied.

§ 798.

In den beginne is de kleur der Huid, die het Gezwel dekt, onveränderd: de Zwelling is zagt, onpynlyk, dog een weinig veerkragtig, zig onmiddelyk na men haar gedrukt heeft, herftellende: de beweeging van het Gewrigt egter, is meer of min verhindert. Naderhand, als de Zwelling toeneemt, vermeederen ook de Toevallen, en wordt het gebrek grooter, vaster en pynlyker. De beweeging gaat geheel verlooren. 'Er koomen fomwylen meer dergelyke Gezwellen in andere nabyliggende Geleedingen. Het Gezwel zelve, breekt door, en ontlast een zeer kwaadäartig stinkvogt. Vleeschächtige Uitspattingen verheffen zig allengskens uit de opening der Verzweering. Den Lyder vervald in eene uitteerende Koorts; en sterft eindelyk, na eene geheele vermaagering des Lighaams, in de allerüiterste elenden.

§ 799.

§ 799.

De natuur deezer Ziekte derhalven, is zeer na verwand aan het Kreeft- en kwaadäartig Vleeschgezwel. Deszelfs onmiddelyke oorzaak bestaat waarschynlyk in eene ontäarting van het celwyze Weefzel der Gewrigtsklieren. Tot de afgelegen Oorzaaken behooren, onvolkoomen Ontwrigtingen, sterke Kneuzingen, Beenbederf en dergelyken.

§ 800.

Geen Gewrigt van Armen of Beenen is 'er, in dewelke hetzelfde niet kan plaats grypen. Allergemeenst egter, ziet men het in de geleeding des Elboogs, en het Kniegewrigt.

§ 801.

De Geneezing, wat men daar van ook zeggen mooge, is onmooglyk. De afzetting van het Deel alleenlyk, die strikt genoomen, geene Geneezing kan genoemd worden, is het eenig Hulpmiddel. Is deeze verboden, en het geval door veröoudering, kwaadäartigheid, of nevensgaande Ziekten wanhoopend, alsdan behoort hetzelfde, met droogende, verkoelende, en Pynstillende middelen behandeld, en den Lyder aan eene strenge Leefregel onderworpen te worden.

8. K L A S S E.

Het Lugtgezwel.

§ 802.

Eene algemeene, of bepaalde Zwelling van het gantsch Lighaam, of van eenig byzonder Deel, afhanglyk van Lugt, verzaameld in de vakjes van het celwyze Weefzel, wordt een LUGTGEZWEL genoemd.

Empysem.

§ 803.

Als Oorzaaken van hetzelfde moet men beschouwen, het indringen der buitenlucht door eene Wond of Verzweering: rotstoffen verzaameld in het Vetvlies; Longwonden; verbreeking van het Strottenhoofd of der Lugtpyp; won en tot in de holte deezer Deelen doorgaande; Darmwonden; Wonden van den Galblaas; doorgaande Borstwonden; Ribbebreuken, en dergelyken.

§ 804.

§ 804.

Deszelfs kenmerken zyn, eene bleeke, onpynlyke, en veerkragtige Zwelling, in dewelke, alsze met de Vingeren behandeld wordt, een zeer byzonder, en als kraakend geluid wordt waargenoomen.

§ 805.

De geneezing deezer Gezwellen is inzonderheid afhanglyk van het wegneemen der Oorzaaken; en deeze onmooglyk zynde, onverkrygbaar. De algemeene behandeling bestaat in het gebruik van geeftryke en oploffende Plaatsmiddelen, de verwyding der byzynde Wond als dezelve zeer klein is, of het doen eener insnyding wanneer de bekleedzelen geheel zyn.

§ 806.

De verschillende benaamingen, door de Schryvers aan dit gebrek gegeven, naar dat het deeze of geene Deelen by uitstek aantast, of de gantsche uitgebreidheid van het Lighaam inneemt, zyn meer bezwaarend voor het Geheugen, dan nuttig; en hebbenwe om die reeden gedagt, te moeten voorbygaan met stilzwynen.

9. K L A S S E.

De aardächtige Gezwellen.

§ 807.

*Tumores
verrei.*

AARDAGTIGE GEZWELLEN zyn dezulken, welke bestaan uit eene meer of min harde, en steenächtige stof, in deeze of geene Deelen opgehoopt.

§ 808.

De Soorten derzelve zyn het *Kalkgezwel van eene onbekende oorzaak*, de *Kalkknobbels der figtige*, en de *Tongsteen*.

*Tumor
calcæus,
ignota
Cause.*

Het Kalkgezwel van eene onbekende Oorzaak.

§ 809.

Dit Gebrek, dat doorgaans een gantsch Deel inneemt, en als een soort van Versteening kan aangemerkt worden, is zeer hard op het gevoel, heeft eene knob-
bel-

belägtige oppervlakte, en is, of geheel niet, of alleen door de afzetting van het Deel, geneesbaar. Het eerste geval heeft plaats, als hetzelfde gepaart gaat met eene verharding van bygelegen Klieren, of eene blykbaare zieklyke gesteldheid van het gantsche Lighaam: het laatste, als het zuiver plaatslyk is, en in een anderzints gezond Onderwerp voorkomt.

De Kalkknobbels der Figtige.

Tophi podagrici.

§ 810.

Deeze gezwollen zyn zoo gemeen, als het voorige gebrek zeldzaam is; zy vertoonen zig inzonderheid aan de Gewrigten der Vingeren en Teenen, in de gedaante van zeer harde knobbels, en zyn uit hoofde haarer steeds aanhoudende oorzaak, ongeneeflyk.

De Tongsteen.

Calculus sublingualis.

§ 811.

Onder deeze benaaming verstaat men een klein en hardgezwel onder de Tong, gemaakt door eene steenagtige stof, daar ter plaatze in eenig klierbeursje of kwylbuisje verzameld.

§ 812.

Dit kleine gebrek, geneeft somtyds zig zelfs langs den weg van verzweering; maar moet somwylen, door eene insnyding, en het opvolgend uithaalen van den Steen, geheeld worden.

10. *K L A S S E.*

Het Galblaasgezwel.

§ 813.

Het GALBLAASGEZWEL, is eene uitzetting der Galblaas door ingeslooten Gal, ingevolge eenerverstopping van deszelfs Loosbuis, of van de gemeene Galbuis, door eenigerlye steenagtige zelfstandigheid.

Turner vesicula fellea.

§ 814.

Dit Gezwel, vertoond zig altoos onder den rand der regter onwaare Ribben; geeft een diep gevoel van Vogtgolving; en is somwylen verzeld van Geelzugt.

Z

§ 815.

§ 815.

Zeldzaam wordt hetzelfde geneezen door weekmakende Pappen, en het inwendig gebruik van oplofende Geneesmiddelen. In de meeste gevallen, is het openen des Gezwels noodzaaklyk, en zyn alle andere hulpmiddelen onvermoo-gend. Dat hier toe, de aanhegting der Galblaas aan het Buikvlies vereischt wordt, en deeze, door de voorafgegaane verschynzelen eener Ontsteking kenbaar zy, is iets 't welk men wel moet aanmerken.

11. K L A S S E.

De Pisgezwellen.

§ 816.

*Tumores
urinarii.*

PISGEZWELLEN noemd men dezulken, in dewelke de Pis, in de Blaas zelve opgehouden, of uitgestort wordt in het Vetvlies der uiterlyke Teeldeelen en van den omtrek des Bilnaads. Tot deezen derhalven behooren, de *opzwellings des Pisblaas*, en de *indringing van Pis in het celwys Weefzel*. Van beiden zullenwe opzetlyk spreken, by gelegenheid der beschryving van de Ziekten der Piswegen, tot dewelken zy meer regtstreeks behooren, dan tot de Gezwellen.

12. K L A S S E.

De Zoggezwellen.

§ 817.

*Tumores
lactei.*

Alle verzaamlingen van Zog, de gewoone paalen der Natuur, in hoeveelheid of plaats overschrydende, worden ZOGGEZWELLEN genoemd.

§ 818.

Deeze zyn inzonderheid eigen aan Kraamvrouwen, en betreklyk, of tot de Borsten, of tot eenig ander gedeelte des Lighaams. Ik zal de eersten den Naam geeven van *Zoggezwel der Borsten*; de laaften, die van *Zogsverplaatsingen*.

Het Zoggezwel der Borsten.

§ 819.

Het ZOGGEZWEL DER BORSTEN, is eene tegennatuurlyke, pynlyke, eenigfints harde, niet ontsteken, en fomtyds knobbelagtige vergrooting deezer Deelen, afhanglyk van eene ophooping van Zog in haare eigen vaten, of uitstorting deszelven in het Vetvlies. *Tumor lacteus mamma- rum.*

§ 820.

Het eerste geval wordt inzonderheid gekend uit eene meer of min algemeene hardheid van de Mamschyf: het laatste uit eene grooter, zagter, en gespannen Zwelling welke meestäl het geheel beslag der Borst inneemt.

§ 821.

Beide gevallen grypen meest plaats by Vrouwen die het zoogen haarer Kinderen toevertrouwen aan anderen. Herhaalde blootstellingen der Borsten staande den tyd van het zoogen aan eene koude Lugt; eene grooter toevloed van zog dan door het Kind gebruikt wordt; gebreklyke ontlasting der Kraamzuiveringen; en meer andere dergelyke oorzaken, geeven insgelyks daar toe aanleiding.

§ 822.

Somwylen eindigen deeze Gezwellen door Oplossing, fomwylen door Verzwearing, en dikmaalen door Verharding. De laatste uitgang is zoo onvoldoende voor de Vrouwen, als verdrietig voor den Heelmeester, en moet altoos zoo veel mooglyk zy, verhoed worden.

§ 823.

De Oplossing wordt best bewerkt, door het in agt neemen eener schraale Eetregel, het herhaald gebruik van Laxeermiddelen, de ontlasting van het Zog door zuiging, en den aanleg van zagte, weekmaakende, en oplofende Hulpmiddelen.

§ 824.

Indien de Oplossing onmooglyk is, en eene bykoomende Ontsteking verëtering dreigt, moet de behandeling overëenstemmen met die der verzwearing van deeze Deelen, § 503. beschreeven. De nablyvende verhardingen worden mis-

fchien door niets beter opgeloft, dan door de *neérgedrupte Wynsteen-olie*, zoo veel mooglyk zy vermengd met eenige *Weekmaakende Pleister*.

§ 825.

Dat deeze Verhardingen, hoe aanzienlyk en langduurig dezelve ook zyn moogen, nimmer ontäarten in Kanker, is misschien niet onnut aan te merken, daar het zeker is, dat de onwetenheid, en het zelfs belang, haar dikmaalen als zoodanig, met het Snymes agtervolgt hebben.

De Zogsverplaatzingen.

§ 826.

Gezwellen, waar ter plaatze anders dan in de Borsten, door eene verzaamling van Zog gemaakt, draagen den naam van ZOGSVERPLAATZINGEN.

§ 827.

Eene fchielyke verdwyning van het Zog uit de Borsten, opvolgende Koortsächtige Beweeging, zwervende Pynen als die van eene zinkingächtige vloeijing, en het verschynen eener Zwellung, die heet, geelächtig rood, glimmend, en veerkragtig is, zyn derzelve voornaamste kenmerken.

§ 828.

Schoon het somwylen gelukt deeze verzaamlingen te geneezen langs den weg van Oplossing, gaan ze egter veelmaalen over tot een zeker soort van Verzwearing. Deeze uitgang wordt meer aangewezen door het geduurig toeneemen der zwelling, en het gevoel van Vogtgolving, dan door de gewoone tekenen eener waare verëttering, § 556. beschreeven.

§ 829.

Het bewerken der Oplossing, is voor het meeste gedeelte Geneeskundig. Uiterlyk kan men gebruik maaken van eene fterke smelting van *Spaansche Zeep in zoete Melk*, gelyk ook van de *neérgedrupte Olie van Wynsteen*, verslapt met *Water*, en by wyze van Stovingen aangelegt. De oplossing hier door geen stand grypende, is de ontlasting van het Vogt, door eene insnyding, het eenig Hulpmiddel.

13. K L A S S E.

De Onwaare Breuken.

§ 830.

Alle Gezwellen, welke of den Navel, of de uiterlyke Teeldeelen inneemen, en niet afhanglyk zyn van eene verplaatzing der Ingewanden, geeft men den naam van ONWAARE BREUKEN.

*Hernia
Spuria*

§ 831.

Tot deeze derhalven behooren, de *Water navelbreuk*, de *Bloed navelbreuk*, de *Etter navelbreuk*, de *Vleesch navelbreuk*, de *Ader navelbreuk*, de *Vet navelbreuk*, de *Waterbreuk der Teeldeelen*, derzelver *Bloedbreuk*, *Zaadbreuk*, *Vleeschbreuk*, *Etterbreuk*, *Vetbreuk*, *Aderbreuk*, en de *Breuk*, gemaakt door *Waterblaasjes*.

De Water navelbreuk.

§ 832.

De WATER-NAVELBREUK bestaat zeldzaam op zig zelfs, maar is doorgaans het gevolg van het Buikwater. De Navel in dit geval, maakt eene doorschynende en bleeké Zwellings, waarin men eene zeer duidelyke Vogtgolving waarneemt. Somwylen opent zy zig van zelfs met gevolg van Geneezing. Somwylen verdwynd ze door drukking, en het gebruik van saamentrekkende plaatsmiddelen. Veelmaalen egter, moetze met het Lancet geöpent worden.

*Hydro-
phalus.*

De Bloed navelbreuk.

§ 833.

Eene uitstorting van Bloed, den Navel in eenen bepaalden omtrek doende uitzetten, en afhanglyk van Kneuzing, of van het afscheuren der Navelstreng by nieuwgeboorne, draagt den Naam van BLOED NAVELBREUK. Dit Gezwel wykt doorgaans gemaklyk voor Oplossende Middelen, en een maatig sluitend verband.

*Hæmato-
cele.*

De Etter-navelbreuk.

§ 834.

*Emphyom-
phalus.*

De ETTER-NAVELBREUK is niet anders dan een Ettergezwel ter plaatze van den Navel, en eischt dezelfde Geneeswyze. Somwylen bestaatze op zig zelfs; somwylen is ze het gevolg eener verzaamling van Etter in den Buik, of in het Celwyze Weefzel van het Buikvlies.

De Vleesch-navelbreuk.

§ 835.

*Sarcon-
phalus.*

De VLEESCH-NAVELBREUK is somtyds van den aart der Vleeschgezwellen; somtyds van die der Zweeren met sponsagtig Vleesch. In het eerste geval, is ze vatbaar voor dezelfde veranderingen, en behandeling, als van de Vleeschgezwellen in het algemeen is aangemerkt. In het laatste, dat veeltys van eene afscheuring der Navelstreng afhangt, kanze door saamentrekkende of korstmaakende middelen, gelyk ook, door de afbinding, of wegsnyding, geneezen worden.

De Ader-navelbreuk.

§ 836.

*Varicom-
phalus.*

ADER-NAVELBREUK noemt men de Aderspatten van den Navel zelfs, of van deszelfs omtrek, van welk eene oorzaak deeze ook afhangen. Haare geneezing is gelyk aan die der Aderspatten in het algemeen; en kan uit de Beschryving deezer ontleend worden. Somwylen, zegt men, is dit Gezwel kwaadaartig, en vordert eene streelende Geneeswyze. Myne ondervindingen laten my niet toe, hieromtrent iets zeekers vast te stellen. Ik ben egter, meer geneigd zulks te ontkennen, dan te bevestigen.

De Vet-navelbreuk.

§ 837.

*Lipom-
phalus.*

De VET-NAVELBREUK, is niet anders dan een Vetgezwel des Navels, en heeft dezelfde oorzaaken, kenmerken, en gevolgen, als de Vetgezwellen in het algemeen, welke wy §. 669. en vervolgens, beschreeven hebben. Haare Ge-
nee-

neezing is insgelyks gelyk aan deelen, en kan alleen door de wegneeming des Gezwels verkreegen worden.

De Waterbreuk des Balzaks.

Hydrocele.

§ 838.

Onder deelen Naam verstaat men alle verzaamlingen van Water, welke de Balzak zelve, de Schederok der Zaadvaten, of de Schederok des Bals, inneemen.

§ 839.

Het eerste foort van Waterbreuk is vry gemeen aan Kinderen, en wordt zeldzaamer bespeurd by Volwassenen. By de laaften ook, gaat het veeltijd gepaart met eene algemeene Waterzugt des Lighaams of met het Buikwater, en behoort in dit geval eerder als een Toeval dier Ziekten, dan als een Gebrek op zig zelfs beschouwd te worden.

§ 840.

Het tweede foort is niet zeer gemeenzaam, en wordt zelfs ontkend van sommige, niettegenstaande zeer getrouwe en nauwkeurige Waarneemingen, deszelfs bestaan ontegenzeglyk beweezen hebben.

§ 841.

Het derde foort, dat dikmaaler voorkomt, is aan minder tegenspraak onderworpen dan het vorige. Men vind egter Heelkundige, die hetzelfde beschouwen, als behoorende tot den rang der Waterblaasjes.

§ 842.

Elk deezer verschillende foorten van Waterbreuken, heeft zyne eigen kenmerken. In de Waterbreuk des Balzaks naamlyk, is dit Deel gelykelyk uitgezet door eene witte en gespannen zwelling, in dewelke somwylen de merktekenen eener drukkende Vinger, een geruimen tyd behouden wordt: de Roede is gezwollen, en de Voorhuid dikmaalen blaaswys opgezet, of als gedraaid in een krultrek: veelmaalen ook kan men de golving van het ingedrongen Vogt waarneemen, en altoos is de Zwelling als in twee gedeeld door den naad des Balzaks. De Waterbreuk van den schederok der Zaadvaten, strekt zig doorgaans uit van den ring der Buikspieren tot aan den Bybal, heeft eene langronde gedaante, en is, in even-
ree.

reedigheid der hoeveelheid van het verzaameld Vogt, meer of min gespannen: de Bal der beleedigde zyde, is aan de agteronder kant der Zwelling voelbaar: de Roede is ingekort, en eenigzints gedrongen naar de gezonde, zyde: ter plaatze eindelyk van den Ring der Buikspieren, en hier ook alleenlyk, wordt door den Lyder een ligt gevoel van Pyn waargenoomen. De Waterbreuk van den Scherok des Bals, wordt aangewezen, door eene ronde, bleeke, en veerkrachtige Zwelling aan het benedenste des Balzaks, door de onvoelbaarheid van den Bal; door den langzaamen aanwasch, en de onpynlykheid der Zwelling; gelyk ook, door de verlenging der Zaadstreng, en eene pynlyke gewaarwording in dezelve als het Deel niet ondersteund, en het Lighaam in eenen loodregten stand geplaatst is.

§ 843.

Alle deeze kenmerken egter, zyn alleen betreklyk tot de beschreeven gebreken, zoo lang deeze ieder op zig zelve plaats hebben, en niet vermengd zyn met elkander, of met eenige andere plaatslyke Ongefteltheden. In de laatste omftandigheden naamlyk, doen 'er zig gemengde kentekenen op, welke gedeeltelyk deeze, gedeeltelyk gene Ziekten aanwyzen. Eene nauwkeurige vergelyking van de zoo even gemelde verschynzelen der Waterbreuken, met de foort onderscheidende Kenmerken der Darm-Net- en Vleeschbreuken, dat de voornaamste Ziekten zyn, welke deeze gebreken doorgaans verzellen, is alleen in staat, om ons in deeze gevallen te beveiligen voor mistafting.

§ 844.

Het eerste foort van Waterbreuk is, als het op zig zelfs bestaat en by Kinderen plaats grypt, ligtelyk te geneezen door versterkende en eenigzints speceryächtige Stovingen. By Bejaarden geschied zulks somwylen, door Buikzuiverende en Pisdryvende Geneesmiddelen, gelyk ook door het Deel te stooven, met eene *smelting van Loodzuiker in Kalkwater*, of van *Aluin*, *Ammoniakzout*, *Kamfer*, en dergelyken, in *Wyn*.

§ 845.

De twee laatste foorten zyn onvatbaar voor de werking van eenigerhande Plaatsmiddelen, en eiffchen altoos de Kunstbewerking. In de eerste ook, als de voorgeschreeven Hulpmiddelen van geene uitwerking altoos zyn, moet men den toe-vlugt neemen tot een Blaardragt, of het maaken van eenige zeer kleine inkervingen, in de Huid des Balzaks.

De Bloedbreuk des Balzaks.

§ 846.

Bloed, in eenig gedeelte van den Balzak, of deszelfs ingehouden Deelen verzameld, en eene Zwelling maakende, die pynlyk, loodverwig, en ondoorschynend is, geeft men den naam van **BLOEDBREUK DES BALZAKS.**

Hematocoele.

§ 847.

Dit Gebrek is fomtyds afhanglyk van Wonden, fomwylen van kneuzende Oorzaaken, en wordt geneezen, door oplofende Stovingen, of door de ontlasting van het uitgestorte Bloed, door eene insnyding. Eene zeer groote uitstorting van deezen aart, niet terstond behoorlyk behandeld wordende, doet dikmaalen een gedeelte des Balzaks vallen in versterving.

De Zaadbreuk.

§ 848.

Door **ZAADBREUK** verstaat men eene schielyke, meer of min pynlyke, en niet zeer harde opzwellings van den Bal en Bybal, veelal afhanglyk van eene gestoorde Byflaap op het oogenblik der uitloozing, of, van eene buitengemeene ingetoogenheid by zeer gezonde, sterke, en Bloedryke Menschen.

Spermatocele.

§ 849.

Dit gebrek verdwynd fomwylen van zelfs, fomwylen eischt het verkoelende Geneesmiddelen, de Aderlaating, Buikzuivering, en verdeelende Stovingen. Eene hervatte Byflaap als zulks mooglyk zy, is in het eerste geval, het vaardigst Geneesmiddel.

De Vleeschbreuk.

§ 850.

De **VLEESCHBREUK** is fomwylen eene Ziekte van den Bybal, en fomwylen, eene ontäarting van de eigen zelfstandigheid der Ballen. In het eerste geval, is ze van denzelfden aart als het Vleeschgezwel. In het laatste, behoordze tot den rang der Knoest of Kreeftgezwellen, naar maate zy zig bevind in deeze of geene omstandigheden.

Sarcocoele.

§ 158.

De Vleeschbreuk, aangemerkt als eene Ziekte van den Bybal, begint gemeenlyk met eene ligte verharding van dat gedeelte deszelve, het welke het naatst is, aan den gemeenen streng der Zaadvaten. Deeze verharding, die allengskens veld wind, neemt vervolgens de gantfche uitgestrektheid in des Bybals, en omvat eindelyk den geheelen omtrek van den Bal. In den beginne, is ze doorgaans onpynlyk, en vry van alle aanhegting ten opzigte der naastliggende Deelen. Naderhand egter, by aanhoudenheid verönagtzaamd zynde, hegtze zig aan de omliggende Deelen, beleedigt de Schederok der Zaadvaten, doet de Bal zelve ontäar. ten, wordt zeer pynlyk, maakt eene kwaadäartige Verzweering, en doet eindelyk, den Lyder elendig omkoomen.

§ 852.

De Vleeschbreuk, welke als eene knoestächtige ontäarting des Bals zelve moet beschouwd worden, begint fomwylen in het middenpunt deezes Deels, en fomwylen aan deszelfs oppervlakte. In het laaste geval, is ze eerder kenbaar dan in het eerste. In beide gevallen heeftze de gewoone verschynzelen des Knoestgezwels, § 605. beschreeven, en wordt uit zig zelve, of door tergende behandelingen, miskleurig, aderspattig, en met één woord Kanker.

§ 853.

Geene deezer Gebreken zyn vatbaar, nog voor oploffing, nog voor eene goedäartige verzweering. Die van het eerste foort egter, kan misschien geneezen door de wegneeming van het Gezwel zelve, of van den Bal: ze wordt langen tyd draaglyk gehouden door eene geregelde Levenswys, nu en dan herhaalde afleidingen, verkoelende zoowel als saamentrekkende Aanlegzels, en het bestendig gebruik van een Schortband. Die van het tweede foort, wordt op dezelfde wyze, dog met minder uitslag onderhouden, en erkend, of behoeft, geenerlye Handwerk.

§ 854.

Met deeze Ziekten moet niet verward worden eene venerifche opzwellling van den Bal of Bybal, welke dikmaalen voorkomt, en alleen geneezen wordt, door het In- en Uitwendig gebruik der bereidzelen van het Kwikzilver. Ik meende dit te moeten aanmerken, om dat ik ooggetuigen geweest ben van dergelyke misflagen.

De

*De Etterbreuk van den Bal, en des Balzaks.**Empyocèle.*

§ 855.

Deeze Naam wordt gegeven aan eene verzaamling van Etter, in den Bal zelve, of in het Balzakje, gevolgt op eene voorgaande plaatslyke Ontsteking, of algemeene heete Koortsächtige Ziekte.

§ 856.

Dit Gebrek, als het de Bal zelve aantast, doet dezelve dikmaalen geheel versmelten, en als ontraaffelen; in dit geval eene zweer maakende, uit dewelke van Dag tot Dag, dunne, witte, en Vezelächtige Lighaamtjes voortkoomen.

§ 857.

De opening des Gezwels met het Lancet, zoo haast de Verzaamling zulks toelaat, en het opvolgend gebruik van zachte Balsemächtige Heelmiddelen, beslissen in beide deeze gevallen de Geneezing, die nogthans moeilijker is in de verzeuring des Bals, dan van den Balzak.

De Vethreuk.

§ 858.

Eene bovenmaatige vergrooting van een gedeelte des Balzaks, of van deszelfs gantsche uitgestrektheid, door eene al te overvloedige nederzetting van Olie in het Celwyze Weefzel, draagt den naam van VETHREUK.

Lyparocèle.

§ 859.

Deszelfs kenmerken zyn gelyk aan die der Vetgezwellen in het algemeen, en kunnen uit de beschryving van deezen ontleend worden. Het is byna hetzelfde met de behandeling, vooräl wanneer ze zig bepaald by een gedeelte slegts van den Balzak.

De Aderbreuk.

§ 860.

De ADERBREUK bestaat somwylen in eene verwyding der Aderlyke Vaten van de Huid des Balzaks, somwylen in die der Zaadstreng of van den Bybal.

Varicocèle.

§ 861.

Het eerste geval, is in alle opzigten gelyk aan de Aderfpatten in het algemeen, en voor dezelfde behandeling vatbaar.

§ 862.

Het tweede en derde wordt gekend aan eene knobbelagtige zwelling van den Zaadstreng, of van het voorgemelde vaatagtig Lighaam; en gaat dikmaalen gepaart met eene uitdrooging van het Lighaam des Bals zelve.

§ 863.

Beide deeze foorten, ontspruiten meestäl uit wellustige denkbeelden, ongesteltheit der Vogten, verhinderde terugkeering des Bloeds, en plaatslyke Kneuzingen. Ze worden geneezen door eene Horizontaale plaatzing van het Lighaam, by Nagt; door het gebruik eener Schortband des Daags; door eene gemaatigde Levenswys; en door het gebruik van saamentrekkende en versterkende Hulpmiddelen.

Hydatocèle

De Breuk gemaakt door Waterblaasjes.

§ 864.

Deeze, die meer plaats grypt by Kinderen, dan by Volwassenen, bespeurd men somwylen aan eenig gedeelte der Zaadstreng; somwylen, in het Celwyze Weefzel van den Balzak. Altoos vertoond ze zig in de gedaante eener kleine onpynlyke, en veerkragtige Zwelling, die eenigermaaten verschuifbaar is, maar, waar ook geplaatst, nimmer binnen den Ring der Buikspieren kan gedrukt worden. Deeze laatste byzonderheid moet men wel in agt neemen, om dat ze het voornaame Kenmerk is, waar door dit gebrek, als het zig in de Lies bevind, van een beginnende Darmbreuk onderscheiden wordt.

§ 865.

Deszelfs Geneezing wordt somwylen bewerkt door de Natuur, somwylen door oploffende Hulpmiddelen, en veelmaalen, alleen door de Konstbewerking, die, als het gebrek zeer groot is, gelyk somwylen gebeurd, dezelfde is als der Waterbreuk.

14. K L A S S E.

De Werktuiglyke Gezwellen.

§ 866.

WERKTUIGLYKE GEZWELLEN noeme ik dezulke, welke gemaakt worden door de tegennatuurlyke grootte, of niet gewoone plaatsing, van een anders ^{Tumores} ^{organici.} wel gesteld Deel onzes Lighaams, onafhanglyk van eene eigenlyk dus genaamde Uitzakking.

§ 867.

Tot deeze Rangschikking behooren, voor zoo veel my als nog bekend is, de *Vergrooting der Oorklier*, de *Vergrooting der Amandelen*, en het *Bal-Lieschgezwel*.

De Vergrooting der Oorklier.

§ 868.

De Oorklier, en misschien ook andere Klieren, vergroot somwylen dermaaten, dat de schoonheid des Aangezigts daar door merkelyk benaadeeld wordt, schoon de natuurlyke vastheid en werking dier Klier dezelfde blyven.

§ 869.

Misschien is het waar, dat deeze vergrooting enkel afhangt van eene Natuurspeeling in de voeding van dit Deel, zonder eenige andere bykoomende Oorzaken. Zeeker althans is het, dat dezelve onvatbaar is voor eenige verbetering door het gebruik van Hulpmiddelen; datze nimmer eenen kwaaden aart aanneemt; en dat, als men de gantsche Klier met het Mes wegneemt, 't gene de eenige Geneeswyze is, men geen de minste verandering ontdekt in deszelfs Saamenstel.

De Vergrooting der Amandelen.

§. 870.

Eene gelyke vergrooting als de Oorklier, ondergaan ook somwylen de Amandelen, 't zy één derzelve afzonderlyk, 't zy beiden te gelyk. Dit geval, wordt somwylen verbeterd, of althans in zynen voortgang bepaald, door het aanhoudend

gebruik van sterke Purgeermiddelen, en saamentrekkende Gorgelwaters. Somwylen egter vergroot het tot dien trap, dat de Spraak, Slikking, en Ademhaaling belemmerd worden, en men verplicht is te besluiten tot de wegneeming.

Parorchidism.

Het Bal-Lieschgezwel.

§ 871.

Dit is niet anders dan het verblyf des Bals, of der Ballen, in dat gedeelte van den *Meatus*, dat aan de Liesch beäntwoord, en zig natuurlyker wyze bevinden moest in het benedenste van den Balzak.

§ 872.

Dit geval is vry gemeen aan Kinderen, en wordt zeldzaam gezien by Volwasfenen. Het is vooräl kenbaar uit het afzyn des Bals of der Ballen in den Balzak, vergeleeken met eene vaste, ronde, onpynlyke en eenigzints verschuifbaare Zwelling in de Lieflichen.

§ 873.

De Natuur zelve doet dit Gezwel verdwynen, door de doorzakking der Ballen in het Zakje te bevorderen; en als dit geene plaats grypt, blyft het voor altoos aanwezig. In de behandeling der Breuken by Kinderen, moet men altoos op dit geval bedagt zyn, ten einde men het zelve niet verkeerdelyk alszoodaanig beschouwe.

15. K L A S S E.

De Koude Verzweeringen.

§ 874.

Abscessus frigid.

KOUDE VERZWEERINGEN noeme ik dezulken, welke een Gezwel maaken, dat hard, niet zeer pynlyk, weinig of niet miskleurig, en van eenen zeer langen duur is

§ 875.

Kinderen, Vrouwen die een stilzittend Leven leiden, en Zwakke, of Hoogbejaarde Menschen, zyn aan deeze meer onderhevig dan Lieden van Middelbaaren Ouderdom, en eene Werkzaame Levenswys. In eenen hoogen trap van Scheur-

Scheurbuik, of ontbinding der Vogten tot eene Waterächtige dunheid, worden ze veelmaalen waargenoomen.

§ 876.

Geen Deel van ons Lichaam is 'er, waar in dezelve niet kunnen plaats grypen. Gemeenlyk egter, bespeurd men ze in het midden der uiterste Ledemaaten, en in den omtrek der Gewrigten.

§ 877.

Al de hulp, welke de Heelkonst in deeze gebreken kan toebrengen, bestaat enkel in het begunstigen der Ettermaaking, door prikkelende Hulpmiddelen; die, om de traage werking der Natuur in deeze gevallen, best in de gedaante van Pleisters worden aangelegt. Eene genoegzaame verzaamling van stof daar zynde moetenze met het Mes geöpent, en vervolgens met balsemagtige dragtmiddelen verbonden worden. In de nabyheid der Gewrigten is het goed, deeze opening niet lang uit te stellen, om de verspreiding der stof, in de holte des Gewrigts te verhoeden.

§ 878.

Weinig egter, zullen alle deeze hulpmiddelen, in de meeste gevallen ter geneezing toebrengen, wanneer niet tevens een Geneeskundig bestier, daar toe mede werkt. De heerschende, en van elders bekende ongesteltheit der Vogten naamlyk, moet verbeterd, en de zwakheid der natuurlyke werktuigen op alle mooglyke wyze versterkt worden, 't zy door algemeene, 't zy door soortelyk verbeterende en versterkende hulpmiddelen.

§ 879.

Moeilyk is het in den beginne, om deeze Gezwellen te onderscheiden van anderen. De zeer groote hardheid egter welke altoos daar aan eigen is; de langzaame toeneeming in uitgestrektheid, de geringe pynlykheid derzelver, alsze aan zig zelve overgelaaten, en niet door menigvuldige drukkingen getergd worden; de nauwlyks merkbaare verandering van de natuurlyke kleur der Bekleedzelen; een zeer duister gevoel van vogtgolving somwylen in het midden der verharding; maar vooral, de bekende verandering en ontäarting der Vogten, in het Onderwerp by welke zy voorkoomen, zyn zo veele byzondere omstandigheden, welke derzelver bestaan aanwyzen.

Gezwollen van dit soort, alsze in een Deel plaats grypen, welks uitgestrektheid niet zeer aanzienlyk, en waar van het saamenstel meerendeels klieragtig is, worden somwylen gevolgt van eene geheele verteering des aangedaane Deels zelve, en dit verdiend vooräl, de oplettenheid des Heelmeesters.



HEDENDAAGSCHE
ALGEMEENE OEFFENENDE
HEELKUNDE.

VIERDE LEERSTUK.

VERHANDELING
DER
UITZAKKINGEN.

B b

IN.

I N H O U D.

1 HOOFDDEEL. *De Uitzakkingen in het algemeen.*

2 HOOFDDEEL. *De eigentlyk dus genoemde Uitzakkingen.*

De Uitzakking des Endeldarms.

— — — — — *der Schede.*

— — — — — *Lyfmoeder.*

3 HOOFDDEEL. *De Breuken.*

De Hoofd of Herffenbreuk.

— *Borstbreuk.*

— *Buikbreuk.*

— *Lendenbreuk.*

— *Navelbreuk.*

— *Lieschbreuk.*

— *Zakbreuk.*

— *Dyebreuk.*

— *Heupbreuk.*

— *Schedebreuk.*

— *Breuk van het eironde Gat.*

— — — — — *des Bilnaads.*

— *Maagbreuk.*

— *Netbreuk.*

— *Darmbreuk.*

— *Darm - Netbreuk.*

— *Blaasbreuk.*

— *Breuk van het Eijernest.*

— *Aangebooren Breuk.*

— *Beklemde Breuk.*

— *Aangegroeide Breuk.*

— *Verzwooren Breuk.*

— *Verstorven Breuk.*

HEDENDAAGSCHE

ALGEMEENE OEFFENENDE

H E E L K U N D E.

VIERDE LEERSTUK.

VERHANDELING DER UITZAKKINGEN.

I. H O O F T D E E L.

De Uitzakkingen in het algemeen.

§ 881.

Eene verplaatsing der Ingewanden, buiten de bepaaling der holte in dewelke zy natuurlyker wyze beslooten zyn, geeft men den naam van **UITZAKKING**.

Prolapsus.

§ 882.

Deeze Gebreken, zyn of verhoolen en gedekt door de Bekleedzelen, of ze

Bb 2

zyn

zyn blykbaar en vertoonen de uitgeweeke Deelen in hunne eigen Zelfftandigheid. De laaftten behouden den algemeenen naam van *Uitzakkingen*, de eerften geeft men die van *Breuken*.

§ 883.

Beiden zyn afhanglyk, van eene aangebooren gefteltheid der bepaalende Deelen; van eene natuurlyke of ziekelyke zwakte der Vezelen; van eene zeer groote inspanning van kragten; van fterk Hoeften, Niezen, Braaken, en dergelyken; van eene moeilyke verloffing by Vrouwen; gelyk ook van de beleedigende werking van kneuzende Vermoogens, en eenen verminderden tegenftand der algemeene en byzondere Bekleedzelen, door zekere Wonden, of Verzweeringen.

§ 884.

De Natuur der uitgeweeke Deelen zelve, de plaats welke zy inneemen, de omftandigheden waarin ze zig bevinden, de oorzaaken zelfs welke de uitwyking voortbrengen, bepaalen inzonderheid de Naam, Kenmerken, Gevolgen, en behandeling deezer Ziekten, en maaken dezelve, als van weinig aanbelang, gewigtig, gevaarlyk, of doodelyk.

§ 885.

De twee volgende Hooftdeelen zullen een meer byzonder en nauwkeurig verflag van dit alles influiten.

II. H O O F T D E E L.

De eigentlyk dus genaamde Uitzakkingen.

§ 886.

De Bepaaling van deeze, is §. 878. gegeven. De ondergefchikte foorten der zelve zyn, de *Uitzakking des Endeldarms*, der *Schede*, en der *Lyfmoeder*.

*Prolapsus
Ani.*

De Uitzakking des Endeldarms.

§ 887.

Deeze Naam wordt gegeven aan eene verflapping, verlenging, en uitval-
ling

ling des Endeldarms, tot zoo verre dat ze de onderste bepaaling van het Bekken overschreid, en buiten de opening van den Aars, voor een meer of min aanzienlyk gedeelte, zichtbaar is.

§ 888.

Dit gebrek vertoond zig doorgaans in de gedaante eener langwerpige, zachte, en roode Zwellings, die uit den Aars voortkomt, en in haar midden eene opening heeft, welke veelal het inbrengen des kleinen Vingers, met een taamlyk gemak toelaat.

§ 889.

Somwylen egter, en vooral in het geval van veroudering, heeft het eene meer ronde dan langwerpige gedaante, is de voorgemelde opening nauwlyks kenbaar, en deszelfs kleur, Paars, Loodverwig, of Zwart. Men moet op dit verschil wel agt geeven, om dat het de regelmaat is, onzer beoordeeling, en behandeling.

§ 890.

Dan eens wordt deeze Uitzakking gemaakt, alleen door het binnenste Vlies des Endeldarms, dan eens door de geheele Zelfstandigheid van deezen Darm. Soms is derzelver oppervlakte bezet met Ambyen; somwylen met eene zeer taaije, en Slymägtige stof.

§ 891.

De Oorzaaken, als men strikt wil redeneeren, zyn nauwlyks bepaalbaar; dog worden meestal gesteld te behooren, tot eene Verlamming van de Sluitspier des Aars, en de Verflapping des Endeldarms. De gemeenzaamheid deezes Gebreks, by Kinderen, Vrouwen, en Zwakken, maakt dit gevoelen waarschynlyk. Het wordt nogthans twyffelägtig, als men aanmerkt, dat zeer gezonde en sterke Menschen niet altoos bevreid zyn van dit Ongemak, en het ook by deeze gezien is.

§ 892.

De algemeene behandeling deezes Gebreks, bestaat, in het herstellen van het uitgevallen gedeelte des Endeldarms binnen de holte van het Bekken; en het beveiligen deszelve voor eene nieuwe uitwyking.

§ 893.

De herstelling geschied, door eene zachte, en beurtelings verwisselende druk-

king der Vingeren van beide Handen; het Lighaam des Lyders horifontaal geplaatst zynde.

§ 894.

De beveiliging voor eene nieuwe uitwyking, wordt best bewerkt, door versterkende Stovingen, inspuitingen, en berookingen, ondersteund van een dikke drukdoek en het T. verband; of door eene ingebragte Lamsblaas, welke men naderhand met Lugt opvuld, toebind, en uitwendig op deeze of geene wyze verzeekerd.

§ 895.

De inbrenging wordt fomwylen verhinderd door de zeer groote uitgebreithed der Uitzakking, en derzelver klemming, ontsteking, en opzwellling. In deeze omstandigheid, doet men het gebrek by aanhoudenheid stoven met verkoelende en saamentrekkende Hulpmiddelen; en beproeft men van tyd tot tyd de herstelling.

§ 896.

Als het uitgeweeke gedeelte des endeldarms verstorven is, en deeze versterving alleen deszelfs oppervlakte inneemt, wordt de geneezing dikmaalen verkreegen, door de inbrenging, en het opvolgend gebruik van versterkende en wynächtige inspuitingen of dampbaden. Wanneer dezelve de gantsche zelfstandigheid des Darms, voor zoo veel de uitvalling betreft ontäart heeft, is het goed, de afscheiding te bewerken door het gebruik van den *Terpentyngeest*, en weekmaakende Pappen; terwyl de kragten des Lyders ondersteund worden door den *Koortsbast*, en eene zachte voedende Eetregel. Dit geval egter, waarin zeldzaam de overige Darmen geen deel neemen, is den meesten tyd doodelyk.

De Uitzakking der Schede.

§ 897.

*Troclapsus
vagina.*

DE UITZAKKING DER SCHEDE, in haare striktste betekenis genoomen, is niet anders, dan eene verlenging van derzelver binnenste bekleedzel, tot in, of buiten de natuurlyke paalen deezes Deels.

§ 898.

Deeze uitzakking is betreklyk, of tot een meer of min aanzienlyk gedeelte van dit

dit vlies, of tot deszelfs gantsche uitgestrektheid. Elk deezer gevallen heeft zyne byzondere kenmerken.

§ 899.

In de gedeeltelyke uitzakking der Schede, bespeurd men eene zagte, roode, en eenigzints rimpelige zwelling, die voor een gedeelte uiterlyk zichtbaar is, uit een der zyden van de Schede schynd voort te koomen, en in de meeste gevallen, ligtelyk kan binnen gebragt worden.

§ 900.

In de geheele uitzakking van dit Deel, is de zwelling niet ongelyk aan die des uitgezakte Endeldarm, beschouwd in alle deszelfs verschillende omstandigheden, en kan men meestäl, de vinger brengen, door de opening van het Gezwel tot aan den mond der Lyfmoeder.

§ 901.

Schoon dit gebrek, doorgaans meer lastig dan gevaarlyk is, kan het egter toevalliger wyze, ontsteken, verzweeren, of verfterven. In sommige deezer omstandigheden, deelen de gemelde ontäartingen zig mede aan de Pisblaas, of den Endeldarm, en veröorzaaken gevaarlyke niet alleen, maar zelfs doodelyke Toevallen.

§ 902.

De herstelling van het uitgeweeke gedeelte der Schede, met de Vingeren; het gebruik van versterkende Stovingen, Inspuitingen, dampbaden, en berookingen; eene zoo lang mooglyk aanhoudende horifontaale ligging van het Lighaam; het inbrengen eindelyk van een *Pessarium*, zyn in alle geneesbaare gevallen van deze soort, de voornaamste hulpmiddelen.

De Uitzakking der Lyfmoeder.

§ 903.

Wanneer de Lyfmoeder, geheel of ten deele, haare natuurlyke plaats verlaat, en tot buiten de Lippen der Schamelheid nederhangt, zoo dat derzelver Mond, aan het benedenste einde der zwelling zichtbaar is, noemd men zulks eene **UITZAK-** *Prolapsus uteri.*
KING DER LYFMOEDER.

§ 904.

Dit gebrek is afhanglyk van eene verslapping der Hylig- en Zitbeensbanden,
en

en der sluitende vermoogens aan den onder en voorkant van het Bekken, tot welke inzonderheid behoord de *Constrictor cunni*.

§ 905.

De uitzakking der Lyfmoeder bestaat nooit op zig zelfs, maar is altoos verzeld met een Darm- of Blaasbreuk. Misschien zelfs is het waar, datze in alle gevallen het gevolg is van deezen.

§ 906.

Geenerlye Leeftyd, geenerlye Gesteltheid, is voor deeze ziekte onvatbaar. Men bespeurd ze egter meer by Bejaarden, dan by aankoomelingen; meer by gehuwde Vrouwen dan by Vreisters; en meer by dezulken die veel Kinderen ter wereld gebragt hebben, dan by anderen.

§ 907.

De kenmerken zyn verschillend naar dat de Lyfmoeder ten deele of geheel is uitgezakt; en naar dezelve zig bevind in deeze of gene omstandigheden. Wy zullen alleen de eersten aanwyzen, vermits de laasten van zelve, uit de kennis deezer byzonderheden voortvloeijen.

§ 908.

In de gedeeltelyke uitzakking der Lyfmoeder, is het Gezwel hier door gemaakt, zo draa het uitwendig zichtbaar is, rood, langwerpig, vast in het midden, en zagter in den omtrek, latende zig met zeer weinig moeite, en somwylen alleen door eene horifontaale ligging, binnen brengen.

§ 909.

In de geheele uitzakking van dit ingewand, is de zwelling meestäl bolrond, grooter dan de voorige, en veel moeilyker om in te brengen. De overige verschynzelen zyn dezelfde, maar alle in eenen veel sterkeren graad.

§ 910.

Geringe uitzakkingen der Lyfmoeder, gelyk ook dezulken, die slegts een korten tyd bestaan hebben, zyn niet zoo zeer gevaarlyk als lastig. Veröuderde in tegendeel, verwaarloosde, of die met Ontvelling, Verzweering, Ontsteking, Versterving, of zeer aanmerklyke Darm- en Blaasbreuken gepaart gaan, kunnen zeer slegte gevolgen naa zig sleepen.

§ 911.

§ 911.

De behandeling deezer Gebreken, is na genoeg gelyk aan die der Uitzakkingen van de Schede, welke wy zoo aanstonds beschreeven hebben. Het *Pessarium* egter, moet eene andere gedaante hebben, en met dat des Heeren CAMPER overéenkoomen. De gemeene, en alzints bekende *Moederringen*, kunnen ook, ter binnenhouding der herstelde Uitzakking, somwylen met vrugt gebruikt worden.

§ 912.

Onherstelbaare Uitzakkingen van de tweede soort, moeten door een gepast Verband geschoord, en naar eisch der byzynde toevallige omstandigheden, met de noodige hulpmiddelen behandeld worden.

§ 913.

Ik zegge niets van de omkeering der Lyfmoeder, door sommige gebragt tot de Uitzakkingen, om dat deeze niet voortkoomt dan door eene onvoorzigtige afhaaling der Nageboorte by de Verlosfing, en dus een Onderwerp is der Vroedkunde, welke niet binnen de paalen valdt van ons bestek.

III. H O O F T D E E L.

De Breuken.

§ 914.

Een BREUK is eene verplaatsing van eenig gedeelte der Ingewanden van het Hoofd, de Borst, den Buik, of het Bekken, tot zoo verre, dat ze de bepaaling deezer holten overschreid, en uitwendig een Gezwel maakt, dat dan eens deeze, dan eens gene gedaante heeft, en in de meeste gevallen inbrengbaar is.

Hernia.

§ 915.

Het verschil der Breuken wordt bepaald, door de verscheidenheid der Deelen welke dezelve uitmaaken; door de verschillende plaatzen welke zy inneemen; door de openingen of verwydingen, welke haar doorlaaten; door haare onderscheiden gedaante en uitgebreidheid; door den verschillende staat der uitgeweeken en bedekkende Deelen; gelyk ook, door haare duuring, en de oorzaaken, van welke zy afhangen.

§ 916.

De Kenmerken der Breuken, zyn of *Algemeene*, of *byzondere*. De eerste zyn eigen aan alle Breuken zonder onderscheid; de laatste, aan deeze of geene Breuk by Uitstek, met uitzondering van alle anderen.

§ 917.

Tot de *Algemeene Kenmerken* behooren, dat het Gezwel eene plaats inneemt welke men by ondervinding weet, dat geschikt is voor Breuken; dat men, hetzelfde met de Vingeren onderzoekende, ter plaatze van zekere natuurlyke of dikmaalen waargenoomen toevallige openingen, het vervolg der Deelen bespeurd welke het Lighaam des Gezwels uitmaaken; dat deeze openingen ten duidelyksten gevoeld worden, wanneer of van zelfs, of door drukking, het uitwendig Gezwel binnen slipt; dat de Zwellling gemaakt wordt, niet door een vloeistof, maar door een vast lighaam, 't welk niet bezwaarlyk te onderscheiden is; dat eindelyk, by het doen der poogingen tot binnenbrenging, ditzelfde vast Lighaam bestendig bespeurd word, en het geval is voorgegaan van eenige der Oorzaaken, welke gemeenlyk een Breuk doen stand grypen. Sommige voegen by deeze byzonderheden nog, dat het Gezwel dan eens verdwynd, dan weder te voorschyn komt, en doorgaans inbrengbaar is, wanneer het Lighaam eenen zekeren stand, meer of min hellende naar eenen Horifontaalen, gegeven wordt. Dit verschynzel egter, dat niet altoos plaats heeft, en somwylen zelfs bedrieglyk is, meende ik, niet te moeten brengen tot het getal deezer kenmerken.

§ 918.

De *eigen Kentekenen*, zyn even zoo verschillend, als de verscheidenheid is der Breuken; en zullen wy naderhand, als we van ieder Breuk in het byzonder spreken, voordraagen.

§ 919.

De oorzaaken deezer Gebreken, algemeen genoomen, verschillen in geenen deele van die der uitzakkingen, § 883. beschreeven. Alle kunnenze gevoeglyk onderscheiden worden, in *voorbereidende*, en *uitwerkende*. De eersten bepalen slegts de mooglykheid; de laatste de daadelykheid.

§ 920.

Als *voorbereidende oorzaaken* moet men beschouwen, eene aangebooren of Ziekly.

lyke gesteltheid van sommige Deelen, geschikt ter bepaaling van anderen; eene slapmaakende, slymige, en zeer vette Eetregel; het woonen op plaatzen, welkers dampkring, door de nabyheid der Zee, van aanmerklyke Rivieren, Meeren, of Moerassen, doorgaans zeer vogtig is; Beroepen welke verplichten tot het dagelijks hervatten van zeer sterke, 't zy algemeene, 't zy byzondere Lighaamsbeweegingen; verzaamlingen van Water in zekere holligheden van het Lighaam; zeer sterke, en lang aanhoudende belette Pislóozingen, en van de stof des Afgangs; gelyk ook, verzweeringen en wonden, tot zekere diepte in de zelfstandigheid der bepalende zachte deelen van sommige holten doorgaande.

§ 921.

Tot de *uitwerkende Oorzaaken* worden betrokken, Hoesten, Niezen, Braaken, perslingen by gelegenheid der gewoone Ontlastingen, hard Schreeuwen, Lagchen, het blaazen op zekere Speeltuigen, groote inspanning van Kragten, vooräl bovens hands, het Paardryden, Springen, Dansen, zeer moeilijke verlossingen, en dergelyken.

§ 922.

De gevolgen der Breuken, regelen zig inzonderheid naar derzelver soorten, oorzaken, duuring, staat en toevallen; gelyk ook naar den Ouderdom, en de Lighaamsgesteltheid des Lyders. Deeze derhalven, kunnen niet dan gebreklyk, tot algemeene bepaalingen gebragt worden.

§ 923.

De Geneezing is of onderhoudend, of volstrekt. Beiden sluiten meestäl in, de herstelling der uitgeweeken Deelen in hunne natuurlyke plaats, en derzelver beveiliging voor eene nieuwe uitvalling.

§ 924.

De herstelling geschied somwylen gemaklyk, en alleen door de eigen inkrimping der Deelen, of de handen des Heelmeester, het Lighaam altoorens in eenen stand geplaatst zynde, welke uit zynen eigen aart dezelve begunstigt. Somwylen integendeel, is ze zeer bezwaarlyk, en kan niet gedaan worden, dan na eene voorgaande Konstbewerking.

§ 925.

Het beveiligen der herstelde Deelen voor eene nieuwe Uitzakking, geschied

dan eens door een Verband, dan eens door het gebruik van Werktuigen, welke men den Naam geeft van *Breukbanden*; en die, overéénkomstig het verschil der Deelen welke de Breuk inneemt, eene onderscheiden gedaante hebben.

§ 926.

Ten opzichte van beide deeze aanwyzingen, ondersteld men de inbrengbaarheid der Breuken, als een noodzaaklyk verëischte. In gevallen daar deeze geene plaats heeft, moet men slegts de dreigende toevallen verhoeden, en de aanwezige, zoo veel mooglyk zy, wegneemen.

§ 927.

De Oninbrengbaarheid der Breuken, is somwylen geheel, somwylen gedeeltelyk. De eerste laat niet toe, dat eenig gedeelte der uitgeweeken Ingewanden, hersteld wordt; de laatste, stelt de mooglykheid der herstelling van sommige, en de onmooglykheid van andere deezer Ingewanden.

§ 928.

De beklemming der uitgevallen Deelen, ter plaatze der openingen door dewelke zy heen gaan; derzelver vasthegting aan elkander en aan de omringende Deelen; de zeer groote uitgebreidheid der Breuk, in vergelyking van die der voorgemelde Openingen; gelyk ook de Ontoegeefbaarheid, of laat ik liever zeggen, de onuitrekbaarheid van de randen der verwydingen welke dezelve by haaren grond bepaalen; zyn de voornaame Oorzaaken deezer Oninbrengbaarheden.

§ 929.

In alle, of immers in de meeste Breuken, worden de uitgeweeken Ingewanden, onmiddelyk omvangen door eene vliesagtige Zak, gemaakt door de verlenging van een gedeelte des binnenste bekleedzel van die Holte tot dewelke de gemelde Ingewanden behooren. Deeze zak, waar aan men den naam gegeeven heeft van BREUKZAK, is dun in versche, dik in oude Breuken, en in het eerste geval niet, in het laatste al, met de omringende Deelen verëenigt. De inbrengbaarheid van deezen Zak, van sommige gesteld, van andere betwift, is voornaamlyk afhanglyk van deeze byzonderheden, en moet dan eens als mooglyk, dan eens als onmooglyk beschouwd worden.

*Saccus
herniarius.*

§ 930.

§ 930.

Deeze Zak befluit fomtyds in zyne holte eenig waterächtig Vogt; fomwylen is hy geheel en al verfteeken van hetzelve. In de eerfte omftandigheid noemd men de Breuk droog, in de laafte *Vogtig*.

§ 931.

Alle overige byzonderheden der Breuken zyn foortelyk; dat is te zeggen, eigen aan deeze of gene Breuk by uitftek, met uitzondering van alle anderen.

§ 932.

De foorten der Breuken, voor zoo veel dezelve eenige weezenlyke verfcheidenheden influiten, zyn, de *Hoofdbreuk*, de *Borftbreuk*, de *Buikbreuk*, de *Lendenbreuk*, de *Heupbreuk*, de *Navelbreuk*, de *Lieschbreuk*, de *Zakbreuk*, de *Schedebreuk*, de *Dyebreuk*, en de *Breuk van het Eironde Gat*. Alle deeze verfcheidenheden zyn plaatslyk: 'er zyn anderen, welke opzigtelyk zyn tot de natuur der Deelen welke de Breuk maaken, of tot de byzondere ftaat van deezen. Tot de eerfte behooren de *Hersfenbreuk*, de *Longbreuk*, de *Maagbreuk*, de *Nierbreuk*, de *Netbreuk*, de *Darmbreuk*, de *Darm-netbreuk*, de *Blaasbreuk*, en de *Breuk der Eijernesten*. Tot de laafte worden gebragt, de *beklemde*, de *aangegroeide*, de *verzwooren*, en de *verftorven Breuken*. De *aangebooren Breuk der Lieschen* en van het *Balzakje*, by Kinderen, moet nog als een byzonder foort van *Breuken* befchouwd worden.

§ 933.

De volgende Onderdeelingen, zullen eene afzonderlyke Befchryving van elk deezer Gebreken influiten.

De Hoofd. of Hersfenbreuk.

Hernia Cephalica, vel Cerebri.

§ 934.

Door deeze verftaat men eene uitwyking van eenig gedeelte der Herffenen, tot buiten de bepaaling der Bekkeneelsbeenderen, ingevolge eener gebreklyke beenwording van het een of ander deel deezer Beenderen.

§ 935.

Sommige Heelkundige fpreken van dit geval, als ohe tzelve dikmaalen plaats hadt,

hadt, en door genoegzaame ondervindingen bewezen was. Andere bewee-
ren datze niet bestaat dan denkbeeldig, en men altyd daar voor genoo-
men heeft, zeker byzonder foort van Waterhoofd, of eene zwelling der Be-
kleedzelen veroorzaakt door Kneuzing. De waarheid fchynd, dat het nimmer
een eigenlydig gebrek is, maar enkel als een toeval van het inwendig Water-
hoofd, moet worden aangemerkt.

§ 936.

In deezen Zin, zyn derzelver kenmerken, oorzaaken, gevolgen, en behande-
ling, volkoomen gelyk aan die van het byzonder inwendig Waterhoofd, § 728
en 729. beschreeven, en kunnen hier uit ontleend worden.

De Borstbreuk.

§ 937.

Hernia
thoratica. Een Gezwel, dat zagt, onpynlyk, aan een der zyden van de Borstholte ge-
plaatst, en meer of min inbrengbaar is, geeft men den naam van BORSTBREUK.

§ 938.

Doorgaans wordt dezelve gemaakt door een gedeelte der Longen, toevalliger
wyze, door de tuffchenruimten der Ribben uitwaarts geweeken; fomwylen door
eene Breuk van het Hart, of der groote slagader, langs denzelfden weg uitgespat.
In de laaste omftandigheden, befpeurd men de kenmerken eener Slagaderbreuk,
en worden de Ribben niet zelden van Beenbederf aangedaan.

§ 939.

Hernia
Pulmonis. Het eerfte geval, dat door den naam van LONGBREUK, onderscheiden wordt
van het laaste, wordt dikmaalen geneezen door het inbrengen van het uitgewee-
ken gedeelte der Longen, en den aanleg van een weêrhoudend verband.

§ 940.

Het laaste, is ongeneeslyk, doodelyk, en onderhoud men best door her-
haalde Aderlaatingen, verkoelende Buikzuiveringen, eene fchraale Eetregel, en
het vermyden van alle fterke Lighaams bewegingen. Een drukkend Verband,
is hier meer fchadelyk dan nuttig.

De Buikbreuk.

§ 941.

Alle Breuken, voorkoomende aan eenig gedeelte van den Buik, anders dan den omtrek des Navels, worden BUIKBREUKEN genoemd.

Hernia abdominalis.

§ 942.

De gemeenste Oorzaaken derzelver, zyn plaatslyke verzwakkingen van de omvangende deelen des Buiks, naa voorgaande Wonden of verzweringen; en eene groote inspanning van kragten, hevige Braakingen, en dergelyken. Somwylen zynze aangebooren, en beslaanze een zeer aanzienlyk gedeelte van de uitgestrektheid des Deels.

§ 943.

De Maag, het Net, de Darmen, de Lever, de Milt, de Pisblaas, en de Lyfmoeder, zyn de deelen, welke men doorgaans, of afzonderlyk, of in gemeenschap met elkanderen, in deeze Breuken aantreft.

§ 944.

Derzelver eigen kenmerken zyn; eene meer of min zagte Zwelling, die eene bolronde gedaante heeft, door drukking verdwynd als het Lighaam horifontaal geplaatst is, en door diepe inademing, hoesten, of andere dergelyke beweegingen, weder te voorschyn komt.

§ 945.

Welke deelen inzonderheid de Breuk uitmaaken, wordt beslooten, gedeeltelyk uit de ontleedkundige kennis van de plaatsing der Ingewanden, vergeleeken met de plaats zelve der Zwelling; gedeeltelyk uit de byzondere verschynzelen der uitwyking van dit of dat Ingewand, welke wy in het vervolg zullen aanwyzen.

§ 946.

Deeze Breuken, even als alle andere, zyn al of niet inbrengbaar. De laatste zyn zulks uit verscheidenerlye oorzaaken § 928. gemeld, en ook uit hoofde haarer zeer groote uitgebreidheid.

§ 947.

De Breukzak, welke wy § 929. gezegt hebben, dat door het binnenste bekleed-

zels

zel der Holte welks ingewanden zyn uitgeweeken gemaakt werd, en in meest alle Breuken plaats hadt, is hier dan eens al, dan eens niet aanwezig. Het eerste is waar, als de Breuk langzaam, en als door herhaalde werking van dezelfde oorzaaken gevormd wordt; het laatste, wanneerze afhangt van doorgaande Buikwonden, welkers Lidteken niet behoorlyk gemaakt, of gesteund is.

§ 948.

In de meeste Buikbreuken, wordt de Breukzak als die aanwezig is, of de ingewanden als dezelve ontbreekt, onmiddelyk gedekt van de algemeene bekleedzelen. De reeden is, dat de vezelen der Buikspieren by het toeneemen der Breuk van een wyken, en het uitwykend Ingewand, met of zonder een gedeelte des Buikvlies doorlaaten. In sommige gevallen egter vind men tusschen de Breukzak of het Ingewand, en de Bekleedzelen, de door uitrekking meer of min verdunde Buikspieren.

§ 949.

Alle deeze verscheidenheden § 947 en 948. moeten wel in agt genoomen worden, om datze een voornaam gedeelte bepaalen der geneezing.

§ 950.

De behandeling der Buikbreuken, als dezelve inbrengbaar zyn, bestaat in de binnenbrenging der uitgeweeken ingewanden door eene horifontaale ligging des Lyders, met de ongestelde zyde naar boven; en eene zachte eenpaarige drukking van het gantsche Lighaam des Gezwels met de Vingeren. Men moet hier byvoegen, de bepaaing der herstelde Deelen door een Breukband, gelyk aan die der Navelbreuk, en welks Pop eenen grooter omtrek heeft, dan de omtrek is van den grond der Breuk zelve.

§ 951.

Breuken van deeze soort, uit hoofde van haare grootte oninbrengbaar, moeten door een draagband geschoord, en met alle zorgvuldigheid voor uitterlyke beledigingen beveiligt worden.

§ 952.

Geklemde Buikbreuken, die zeer zeldzaam voorvallen, zyn niet herstelbaar dan door de Kunstbewerking; van dewelke wy by gelegenheid der Breukfnyding, opzettelyk spreken zullen.

De Lendenbreuk.

§ 953.

De LENDENBREUK bevat, voor zoo veel tot nog toe bekend is, niet anders dan de verplaatste Nier, of deszelfs Bekken, door eenigerlye voorgaande oorzaaken verwyd.

*Hernia
Lumbaris.*

§ 954.

Eene meer of mingrootte, onpynlyke, en gespannen Zwelling in de nabyheid der Lendenwervelen, welke verdwynd, als het Lighaam des Lyders op den Buik horizontaal gelegd, en het Gezwel met de Vingeren gedrukt wordt; gelyk ook, eene meer vrije Pisöntlasting, na, dan voor deeze bewerking; zyn derzelver soort onderscheidende kenmerken.

§ 955.

Deeze Breuk, wordt somwylen geneezen, door eene lang aanhoudende ligging op den Buik, en het gebruik van trapswys vergrootte Drukdoeken, gesteund door een sluitend pleister verband.

§ 956.

Somwylen, is dezelve ongeneeslyk, om datze niet inbrengbaar is; en in dit geval, moetze slegts steunend behandeld worden; terwyl men tevens gebruik maakt van versterkende, en zagte pisdryvende Geneesmiddelen, zoo wel als van eene schraale Eetregel, en het vermeiden van alle sterke Lighaamsbeweegingen, of van die der onderste Ledemaaten.

De Navelbreuk.

§ 957.

Eene uitvalling van het Net of der Darmen tevens, door den verwyden Navelring, of de van een geweken vezelen der witte Lyn, onmiddelyk boven, onder, of ter zyden den Navel, wordt een NAVELBREUK genoemd.

*Hernia
umbilicalis.*

§ 958.

Het eerste soort deezer Breuken, dat is te zeggen, die in den Navelring zelve plaats grypen, is zeer gemeen aan Kinderen, en bespeurd men zeldzaam by Volwassenen. Het tweede soort is meer eigen aan Vrouwen dan aan Mannen, en wordt

D d

meest

meest waargenoomen by dezulken die dikmaalen geweest zyn in het geval van Zwangerheid, of eenen zeer dikken Buik voordraagen.

§ 959.

In die Breuken, welke in den Navelring zelve voorvallen, vind men zelden een Breukzak, en liggen de uitgeweeke Deelen onmiddelyk onder de Bekleedzelen. In de overige, zyn deeze Deelen altoos in een Breukzak beslooten, gemaakt door een uitgerekte gedeelte van het Buikvlies.

§ 960.

Als wy zeggen, dat in de Breuken van den Navelring geen Breukzak aanwezig is, moet zulks alleen verstaan worden van Volwasfenen; want by Kinderen is ze misfchien altoos tegenwoordig.

§ 961.

De meeste Navelbreuken ontstaan na de geboorte, door eenige der Oorzaaken §. 921. aangewezen. Somwylen egter, koomen 'er Kinderen met dezelve ter Waereld, en in dit geval is de Navel, en een meer of min aanzienlyk gedeelte van den Omtrek, gelykelyk opgeheeven tot een Gezwel, uit welks midden de Navelstreng voortkomt.

§ 962.

In alle gevallen van Navelbreuken zonder onderscheid, waarin buiten het Net, eenige andere Ingewanden begreepen zyn, maakt het Net altoos het buitenste gedeelte derzelver, of laat ik liever zeggen, overdekt hetzelfde immer de overige.

§ 963.

De algemeene verschynzelen der Breuken § 917; die der Net- en Darmbreuken welke in het vervolg zullen beschreeven worden; gelyk ook, zeker gevoel van Buikpynen, als de Maag opgevuld is met voedzelen, zyn de gewoone kenmerken deezer Breuken.

§ 964.

De behandeling der Navelbreuken, voor zoo veel dezelve behooren tot de Klasse der inbrengbaare, is gemaklyk by Kinderen, moeilyk by Volwasfene, altermoeilykst by Dikbuikige.

§ 965

§ 965.

De inbrenging der uitgeweecken Deelen, geschied op gelyke wyze als by de Buikbreuken, doch in eene rigting, die loodlynig vald op de Lendenwervelen, terwyl het Lighaam des Lyders eenigzints voorwaarts geboogen, op den Rug ligt, en het Hoofd een weinig opgeheeven is.

§ 966.

Ter binnenhouding der herstelde Ingewanden, bediend men zig by Kinderen, van het *Navelbreukverband*, dat ik ter zyner plaatze beschryven zal; en by volwassene, die meer mager dan vet zyn, van de slangswyze draad-band. By Menschen, die zeer zwaarlyvig zyn, en een hangende Buik hebben, is de band, doormy beschreeven in *het tweede Deel der Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Weetenschappen*, een der zekersten.

§. 967.

Navelbreuken die door veröoudering, of verwaarloozing, buitengemeen groot geworden, en of niet inbrengbaar zyn, of niet zonder veel ongemak binnen gehouden worden, moet men enkel door een draagband schooren, terwyl den Lyder onderworpen wordt aan eene meer of min strenge Leefregel. Hier door, en door het allengskens verkleinen van de holte des Draagbands, gevoegd by het dikmaalig gebruik van ontlastende Hulpmiddelen, worden dezelve somwylen inbrengbaar gemaakt, en met veel gemak, op voorbeschreeven wyze binnen gehouden.

§ 968.

Hoedaanig bekleemde Breuken ter deezer plaatze moeten behandeld worden, zal gedeeltelyk blyken uit de beschryving der bekleemde Breuken, gedeeltelyk uit die der Breuksnyding. Voor het tegenwoordige moetenwe slegts aanmerken, datze zeer zeldzaam zyn, en nog zeldzaamer eenige Kunstbewerking behoeven.

De Lieschbreuk.

§ 969.

Door LIESCHBREUK, verstaat men een gezwel der Lieffchen, gemaakt door eene uitzakking van het Net, der Darmen, van beide deeze Deelen te gelyk, van *Hernia inguinalis*. den Pisblaas, of van het vrouwelyk Eijerest.

§ 970.

Derzelver kenmerken zyn even zoo verschillend, als de verschillende natuur en staat is der Deelen in de Breuk begreepen; en moeten uit die der Net. Darm. Darmnet. Blaas. Eijerest. bekleemde. verzworen. en verstorven Breuken ontleend worden.

§ 971.

De Deelen welke in de Lieschbreuk uitvallen, neemen meestäl hunnen weg door den ring der Buikspieren; dog ook somwylen boven of beneden dezelve, door de van een geweeken Peesvezelen der buitenste schuinze Buikspier. In het eerste en tweede geval, ligt altoos de Breuk voor en op den streng der Zaadvaten; in het laaste, loopen deeze Vaten over de voorste oppervlakte van den Breukzak

§ 972.

Alle deeze Breuken, de aangebooren slegts uitgezonderd, hebben een Breukzak, gemaakt door een gedeelte van de eigen zelfstandigheid des Buikvlies, en befloaten by Volwassene in de Schederok der Zaadvaten, of het Celwys Bekleedzel van de ronde banden der Lyfmoeder.

§ 973.

Onder de Darmen, welke in de Lieschbreuk uitwyken, is de Kronkeldarm de meest gemeenzaame. Somwylen egter bevat dezelve een gedeelte van den Nugteren - Kartel - of Blindendarm.

§ 974.

Alle Lieschbreuken zyn gevaarlyk. De kleine egter, en die zeer schielyk by sterke Menschen plaats grypen, zyn zulks meerder dan de groote, en die op eene langzaame wyze, in eenigzints zwakke gestellen gemaakt worden. By Kinderen zyn dezelve geneesbaar; by Bejaarden integendeel, moetenze meestäl geduurende het gantsche Leven onderhouden worden.

§ 975.

Ter herstelling van inbrengbaare Breuken deezer soort, doet men den Lyder eerst zyn Water maaken, en legt hem dan dermaaten te Bedde, dat het Hoofd en de Borst voorwaards geboogen, de Billen opgeligt zyn, en de Dye der ongestelde zyde geboogen is. Men verbied denzelven, het spreekken, schreeuwen, sterke inademingën, en allerlye Beweegingen. De Breuk zelve, omvangt men
als

alsdan, zoo veel mooglyk zy, met de vlakke Hand, en drukt haar zagtelyk, langzaam, en eenpaarig op- en eenigzints buitenwaards, naar de zyde van den Lieschring; of, als dit niet voldoet, regt opwaards, en fomwylen zelfs naar de zyde van het Schaambeen. Men volhardt met deeze beweegingen, beurtelings naar eisch der byzondere omftandigheden veranderd, tot zoo lang de Breuk hersteld is, en 'er uitwendig geenerlye Zwelling meer bespeurd wordt.

§ 976.

De bepaaling der herstelde Deelen, binnen de Buiksholte, bewerkt men best door het bestendig gebruik eener veerkragtige Breukband, welke nauwkeurig fluit om den omtrek des Bekkens, en in kragt evenreedig is aan den Ouderdom, de lighaamsgesteltheid, en de onvermydelyke beweegingen des Lyders; gelyk ook, aan de bekende grootte der Breuk, en van den Lieschring. De gemaklykste en zekerste deezer Werktuigen, zyn die des Heeren CAMPER, van dewelke wy ter zyner plaatze, eene Beschryving en Afbeelding zullen mededeelen.

§ 977.

Lieschbreuken, op geenerlye wyze inbrengbaar, dog niet behoorende tot de Klasse der beklemde, verzworen, of verstorven Breuken, moeten door een zelfde Breukband, maar met eene lepelwys uitgeholde Pop, gesteund, en voor vergrooting beveiligd worden. Dikmaalen gebeurd het, dat dezelve, door deeze behandeling allengskens kleiner wordende, inslippen; en vooräl, wanneer men naar maate der vermindering van de Breuk, van tyd tot tyd de holte der Pop verminderd, of dezelve trapswyze opvuld, met ingelegde fyne en drooge Spons schyven.

§ 978.

Niets is noodzaaklyker in de behandeling van Lieschbreuken, dan het vermyden van allerlye sterke Lighaamsbeweegingen, en vooräl van het te Paard ryden, springen, dansen, en dergelyken; gelyk ook, het onafgebrooken gebruik van den Band, en eene nauwkeurige toezigt omtrent den staat van deeze.

§ 979.

De geneeswys deezer Breuken, in het geval van beklemming, zal naderhand beschreeven worden. Hier ter plaatze moet ik alleenlyk aanmerken, datze by

uitstek vatbaar zyn voor dit Toeval, en inzonderheid by Menschen van eenen middelbaaren Ouderdom, en by Werklieden.

§ 980.

Lieschbreuken, by een en hetzelfde Voorwerp, aan beide zyden gelyktydig plaats hebbende, moeten door een zelfde Band als vooren, maar met twee Poppen, weêrhouden worden.

De Zakbreuk.

§ 981.

*Hernia
scrotalis.*

De ZAKBREUK is doorgaans het gevolg der Lieschbreuk, door verwaarloozing tot zoo verre vergroot, datze zig uitstrekt tot aan den Bybal, en de eene of andere zyde van den Balzak doet uitzetten. Somwylen egter, is ze onafhangelijk van deeze, en grypt ze plaats, als in een enkel oogenblik.

§ 982.

Derzelver verscheidenheden, kenmerken, oorzaaken, veranderingen, gevolgen, en behandeling, zyn in allen deele gelyk aan die der Lieschbreuk; en kunnen uit de Beschryving deezer, vergeleeken met de algemeene beschouwing der Breuken, en met die der Darm-Net-Blaas en andere Breuken, afgeleid worden.

§ 983.

Somwylen gaat deeze Breuk gepaart met een Water- of Vleeschbreuk, en in deeze gevallen, bespeurd men de gewoone verschynzelen van de een en ander.

§ 984.

De ring der Buikspieren, door dewelke meestal de Ingewanden uitwyken, is doorgaans wyder in de Zak - dan in de Lieschbreuk, en de hoeveelheid der uitgeweeken Deelen grooter. Dat de Zakbreuken derhalven, alle overige omftandigheden gelyk zynde, meerder uitgebreithed hebben dan de Lieschbreuken, spreekt van zelve.

§ 985.

Veröuderde Breuken van deeze soort, worden dikmaalen zoo groot, datze tot aan de Knieën nederhangen. Doorgaans verklaard men dezelve als ongeneeslyk,
uit

uit hoofde, zoo wel van den grooten klomp der Deelen daarin bevat, als van derzelve vermoedelyke vastgroeiing aan elkander, en de vermindering der Buiksholte. Eene strenge Eetregel intusfchen, bestendige horifontaale ligging van het Lighaam, herhaalde ontlastingen door Aderlaatingen en Buikzuiveringen, hebben zoo dikmaalen dergelyke Breuken doen binnen gaan, dat men zig nauwlyks genoeg kan aankanten tegen dit vooroordeel.

§ 986.

Oninbrengbaare, dog niet bekleemde Zakbreuken, en waarin men voorgemelde behandeling te vergeefsch beproefd heeft, moeten door een Schortband ondersteund, en voor vergrooting beveiligd worden. Het vermyden van alle sterke Lighaams bewegingen; en het nu en dan toedienen van zachte Laxeermiddelen, zyn in deeze Breuken ten uitersten voordeelig.

§ 987.

By Vrouwen, zakt dikmaalen de Lieschbreuk tot in één der lippen van de Schaamelheid, en vergroot dezelve, naar evenreedigheid van de hoeveelheid der Deelen in de Breuk bevat, dan eens minder, dan eens meerder. Dit geval, heeft zeer veel overeenkomst met de Zakbreuk der Mannen, en draagt den naam van SCHAAMBREUK.

Hernia pudenda.

De Dyebreuk.

§ 988.

Door DYE BREUK verstaat men, eene uitzakking van het Net, der Darmen, van den Pisblaas, en dergelyken, langs de agterste oppervlakte van den Falloppiaanschen Peesband, tot aan de boven-binnenzyde van den Dye.

Hernia femoralis.

§ 989.

De juiste plaats deezer Breuk, ten opzigte der breedte van de binnenste oppervlakte des Dyes, valdt in de meeste gevallen een weinig aan den binnenkant der loodlyn eens gelykzydigen driehoek, welks Basis is, de afstand van den voorbovensten graat des Heupbeens, tot het overeenstemmend einde van den kam des Schaambeens, en dus ook aan de binnenzyde der Dyevaten, welkers loopstreek net beantwoord aan de strekking deezer Loodlyn.

§ 990.

§ 990.

Somwylen egter, vooräl wanneer de Breuk zeer groot is, overschrydze buitenwaards deeze Loodlyn, en liggen de Dyevaten onmiddelyk agter dezelve. In dit geval, kan men de klopping deezer Vaten, door de Breuk zelve, veelmaalen waarneemen.

§ 991.

Deeze Breuk gebeurt zeldzaam by Mannen, Kinderen, en ongehuuwde Vrouwen: by Vrouwen integendeel die Kinderen geteeld hebben, wordtze zeer dikmaalen waargenoomen.

§ 992.

De kenmerken der Dyebreuken verschillen in geenendeele van de algemeene. Men kan hetzelfde zeggen, van haare oorzaaken.

§ 993.

Derzelver gevolgen, voor zoo veel het byzondere betreft, zyn ongevoeligheid, zwaarte, en eene Waterägtige Zwelling van den Dye, het Been, en den Voet, der ongestelde zyde. De drukking der Breuk op de Dyevaten, is de eenige oorzaak deezer toevallen, welke meer plaats grypen in het geval van Net- dan van Darmbreuken.

§ 994.

Omtrent de behandeling der inbrengbaare Breuken van deeze foort, kan ik nauwlyks iets anders aanmerken, dan het gene ik voormaalen gezegt hebbe van die der Liefchbreuken. By de herstelling der uitgeweeke Deelen egter, moet de drukking inzonderheid gerigt worden naar de zyde van de witte lyn der Buikspieren; en deeze niet slaagende, regt op of buitenwaards. De Band daarënboven, ter weêrhouding geschikt der herstelde ingewanden, moet aan het voorste einde meer naar beneden hellen dan die der Liefchbreuk, en eene half eironde Pop draagen, welkers langste middenlyn zig van buiten naar binnen, dat is, van het Heup naar het Schaambeen, uitstrekt.

§ 995.

Hoedaanig oninbrengbaare, bekleemde, of anderzints saamengestelde Dyebreuken, moeten behandeld worden, zal ik in het vervolg, by verscheiden gelegenheden aanwyzen.

*De Heupbreuk.**Hernia
Ischiatica.*

§ 996.

In deeze Breuk, die niet meer dan eens is waargenoomen, wyken de Ingewanden buitenwaards, langs de agterfte uitranding van het Zitbeen, en maaken een Gezwel ter zyden van den Aars.

§ 997.

De Darmen, het Net, het Eijernest, en zelfs de Falloppiaansche Trompet der Lyfmoeder, waren in dit gebrek beslooten.

§ 998.

Gelyk men hetzelfde slegts gezien heeft, na den dood van het lydend Voorwerp, wanneer de Zwelling zoo groot was datze tot aan de knieholte zig uitstrekte, kan ik omtrent deszelfs oorspronglyke Kenmerken niets zeekers vast stellen; en moet hetzelfde zeggen aangaande deszelfs mooglyke veranderingen, en behandeling.

§ 999.

Dit alleen, kan men uit het bedoelde geval afleiden, dat ter aangewezen plaatze somwylen Breuken voorvallen; en de Heelmeeſter derhalven hier op moet bedagt zyn, in de behandeling van alle Gezwellen welke hier plaats grypen.

De Schedebreuk.

§ 1000.

De Darmen, het Net, of de Pisblaas, zakken dikwerf met een gedeelte des Buikvlies, tot tusſchen de Schede en den Endeldarm, of tusſchen het eerſtgemelde deel en de Pisblaas, nederwaards; en maaken een Gezwel, dat in de holte der Schede zelfs zigt- en voelbaar is, met de Vingeren kan ingedrukt worden, en den naam draagt van SCHEDEBREUK.

*Hernia
vaginalis*

§ 1001.

Somwylen dringt dergelyk eene Breuk door de vaneen geweeken Spiervezelen der Schede tot aan derzelver binnenſte Bekleedzel: ſomwylen, doenze de gantſche zelfſtandigheid van dit Deel, aan de zyde waarze zig ophouden, bultswyze

E e

naar

naar binnen wyken. In het eerste geval bestaat het gantsche Gezwel uit het binnenste vlies der Schede, de Breukzak, en het uitgeweeken Ingewand: in het laatste, uit de geheele dikte der Schede, de Breukzak, en ditzelfde Ingewand.

§ 1002.

Meeftäl bespeurd men deeze Breuk, by Vrouwen die dikmaalen gekraamd, of eene moeilijke verlossing ondergaan hebben. Men heeftze egter ook gezien by Vrysters die zeer zwak van gestel waren, en in het geval eener hebbelyke hardlyvigheid.

§ 1003.

Eene zachte zwelling, die eene meer of min breede grond heeft, inbrengbaar is, doorgaans gepaart gaat met aanhoudende of afwisselende Buikpynen, waarby de Moedermond van alle zyden vry is, en die binnen de holte der Schede bepaald blyft, of voor een gedeelte zig buiten dezelve aanbied, zyn de soort onderscheidende kenmerken deezer Breuken.

§ 1004.

Derzelver behandeling bestaat, in het herstellen der uitgeweeken deelen; en het bepaalen van het herstelde in zyne plaats.

§ 1005.

De herstelling geschied doorgaans gemaklyk, en alleen door eene zachte drukking met twee of meer ingebragte Vingers, terwyl het Lighaam, dan eens op den Rug horifontaal ligt, dan eens vooröver geboogen steund op de Kniën en Elboogen. De eerste plaatzing is best als de Breuk aan de voorste, de laatste, als ze aan de agterste zyde der Schede plaats grypt.

§ 1006.

Ter bepaaling der herstelde Deelen, diend vooräl het aanhoudend gebruik van een rolrond *Pessarium*.

*Hernia
ovalaris.*

De Breuk van het Eironde Gat.

§ 1007.

Deeze Breuk, die niet dikmaalen voorkomt, valt aan de binnenste oppervlakte van

van het bovenste gedeelte des Dyes, by Mannen nevens de Bilnaad, by Vrouwen naast de lippen der Schamelheid.

§ 1008.

De opening daar dezelve doorheen gaat, en waar van ze zelfs haaren naam ontleend, is het eironde gat des ongenaamde Beens, en wel, deszelfs bovenste gedeelte.

§ 1009.

Een gedeelte des Kronkeldarms, van het Net en des Pisblaas, heeft men in deze Breuk aangetroffen.

§ 1010.

Vrouwen, zyn meer aan dezelve onderhevig, dan Mannen. By de laatste, heeft menze tot nog toe maar eens waargenoomen.

§ 1011.

De Kenmerken zyn somwylen vry klaar; somwylen duister. Het eerste is waar, als de Breuk uitwendig een Gezwel maakt, het laatste als dezelve in de diepte verhooien ligt.

§ 1012.

In het eerste geval, bespeurd men ter aangewezen plaatze, na eene voorgaande Breukverwekkende oorzaak, eene zagte, niet miskleurige, indrukbaare, en dan eensronde, dan eens langwerpige zwelling, somwylen verzeld van Buikpynen.

§ 1013.

In het laatste, moet men meestäl zyn besluit opmaaken, uit eene plaatslyke en schielyk voortkoomende pyn, in de nabyheid van het Eironde Gat; uit de vermeerdering of vermindering deezer pyn door drukking; uit derzelver verspreiding door de Buiksholte; gelyk ook, uit opkoomende Walgingen, Braakingen, en dergelyken.

§ 1014.

In de herstelling der uitgeweeken Deelen, moet het Lighaam dus geplaatst worden, dat de Billen verheeven zyn, en de Borst nedergedrukt is. Ter weêrhouding van het herstelde, moet men van een drukkend Verband, of eene hier toe geschikte Breukband, gebruik maaken.

§ 1015.

Beklemde zichtbaare Breuken van deeze foort, zyn vatbaar voor eene Kunstbewerking. In de onzichtbaare integendeel, fchiet niets over dan het gebruik dier Hulpmiddelen, welke wy, by gelegenheid der befchryving van de Beklemde Breuken in het algemeen, zullen aanwyzen.

De Breuk des Bilnaads.

§ 1016.

Hernia perinaalis. De BREUK DES BILNAADS vertoond zig by Mans, tuffchen den Endeldarm en de Pisblaas; by Vrouwen, tuffchen voorgemelden Darm en de Schede, ter zyden de Bilnaad.

§ 1017.

Uit de algemeene verfchynzelen der Breuken, §. 917. vergeleeken met het gene wy zoo even gezegt hebben, kan men de gewoone kenmerken deezer Breuk afleiden.

§ 1018.

By Mannen beftaat dit gebrek op zig zelve; by Vrouwen is het doorgaans niet anders, dan eene nederwaards verlengde Schedebreuk.

§ 1019.

De Kronkeldarm, en de Pisblaas, zyn de Deelen, welke men tot hier toe in deeze Breuk heeft waargenoomen. In de eerfte omftandigheid is het Gezwel deelagtig aan de verfchynzelen der Darmbreuk; in de laafte, aan die der Blaasbreuk, welke allen ik vervolgens zal aanwyzen.

§ 1020.

Enkele gevallen zyn 'er, waarin de uitgeweecken Deelen, in den omtrek des Bilnaads, geene Zwelling maaken; terwyl 'er nogthans, dergelyk eene Breuk aanwezig is. In deeze omftandigheid, kenne ik geenerhande tekenen dan die der beklemde Breuken in het algemeen, als deeze plaats hebben; en zoo niet, dan het gevoel van zwaarte, en Pyn, ter aangewezen plaatze, naa eenige voorafgaande belediging, moeilyke Verloffing, en dergelyke.

§ 1021.

§ 1021.

Inbrengbaare Breuken van deeze foort, worden hersteld door het gezwel zagte-lyk te drukken met de Vingeren, zoo van buiten, als langs de holte van de Schede, of des Endeldarms, terwyl het Lighaam dus gelegd wordt, dat de Billen verheven zyn, en de Borst en het Hoofd vooroverhellen. De weêrhouding der ingebragte Deelen geschied best, by Vrouwen, door het gebruik van een rond *Pessarium*, welks voorste oppervlakte plat is afgesneden; en by Mannen, door een lederen T verband, ter plaatze van de Breuk bedeed met een Pop.

§ 1022.

Hoedaanig deeze Breuken in het geval van beklemming moeten behandeld worden, zal ik naderhand aantoonen.

De Maagbreuk.

§ 1023.

De MAAGBREUK, behoord in zeker opzigt tot de klasse der Buikbreuken. *Hernia*
Ze wordt *Maagbreuk* genoemd, om dat een gedeelte der Maag, zakswyze ver- *ventriculi*.
lengd, het voornaamste deel derzelyer uitmaakt.

§ 1024.

Deeze Breuk vertoond zig meestäl onder, of ter linker zyde van het zwaardwyze Kraakbeen des Borstbeens, tusschen dit, en de Kraakbeenderen der onwaare Ribben van dezelfde zyde.

§ 1025.

Buiten de algemeene kenmerken der Breuken, te vooren beschreeven, kan men nog als zoo veele andere omtrent deeze Breuk in het byzonder, beschouwen, afwisselende, of aanhoudende Maagpynen, gebreklyke Spysverteering, veelvuldige Walgingen of Braakingen, Hik, uitteering, en dergelyken.

§ 1026.

Derzelyer herstelling wordt bewerkt, door eene horifontaale ligging van het Lighaam op den Rug, en eene zagte drukking des Gezwels met de Vingeren. Ter weêrhouding van dezelve, moet men gebruik maaken van een Band, meestäl gelyk aan die der Navelbreuk. Een spaarzaam gebruik van Voedzelen; en het

vermyden van die alle welke veel lugt in zig besluiten , is in dit geval van de uiterste noodzaaklykheid.

De Netbreuk.

§ 1027.

*Hernia
omentalis,*

Als een gedeelte des Nets, door eene natuurlyke of toevallige opening der Buikspieren, naar buiten wykt, en een zagt, deegagtig, ongelyk, en meer of min langwerpig Gezwel maakt, dat zelfs buiten het geval van klemming eenigzints moeilyk is intebrengeu, geeft men zulks den naam van NETBREUK.

§ 1028.

Kinderen zyn zeldzaam, Volwassene dikmaalen, aan deeze Breuk onderworpen. Datze eerder by vette dan by magere Menschen kan plaats grypen, gelyk meest alle Heelkundige gewild hebben, is niet waar; vermits de vetheid van het Net, waarāan men dit inzonderheid toeschryft, geen de minste betrekking heeft tot de algemeene vetheid van het Lighaam, en dit deel, by magere Menschen dikmaalen zeer opgevuld is met Vetstof, terwyl het byna geheel daar van versteeken is, by vette.

§ 1029.

Netbreuken kunnen plaats grypen aan elk gedeelte des omtreks van den Buik, en het Bekken. Meestāl egter bespeurd men dezelve, aan den Navel, in de Lieschen, in den Balzak, en dergelyken.

§ 1030.

Haare gewoone kenmerken kunnen uit de algemeene beschryving § 1027. ontleend worden. Alsze veröuderd of verwaarloosd zyn, ondergaat het gedeelte van het Net, daarin begreepen, aanmerklyke verānderingen, en bied verschynzelen aan, overēenkomstig met deeze.

§ 1031.

De gemeenste deezer verānderingen, zyn de vergrooting, verharding, en verēttering van hetzelfde, gelyk ook deszelfs vasthegting aan andere in de Breuk begreepen Deelen, en aan den Breukzak.

§ 1032.

§ 1032.

De vergrooting van het Net, is fomwylen zeer aanzienlyk, en kan om zoo te fpreeken, tot in het oneindige opklimmen. Nergens ondertuffchen gefchied zulks ligter en fterker dan in de Zakbreuk, uit hoofde der toegeefbaarhe d van den Balzak. Deeze vergrooting gaat doorgaans gepaart met eenige ontaärting, zoo niet van het geheele uitgeweeke Net, ten minften van een gedeelte. Hier van is afhanglyk, dat zeer groote Netbreuken, op de eene plaats zagt, op de andere hard zyn, en als een knobbelägtig gevoel geeven.

§ 1033.

Eene verharding van het Net is mooglyk, zelfs in de kleinste Breuken; en evenaard fomwylen, die der Klieren, in het Knoeftgezwel. In dit geval begrypt men ligtelyk, dat de Breuk nog zagt, nog deegätg op het gevoel zyn kan, en men verpligt is den toevlugt te neemen tot de algemeene verfchynzelen der Breuken, vergeleeken met die van andere Ingewanden, welke nu niet aanwezig zyn, om over het beftaan eener Netbreuk te oordeelen.

§ 1034.

De Verëttering van het meergemelde Vlies, voor zoo veel het *Volumen* der Breuk betreft, draagt alle kenmerken eener gemeene Verzweering; en zou ligtelyk gelegenheid geeven tot aanmerklyke misflagen, of ten minften, tot het niet kennen van de Breuk, indien men niet nauwkeurig agt ftaat op alles wat het geval is vooräfgaen, en de byzynde toevallen.

§ 1035.

In de vaftgroeijing van het Net, aan andere in de Breuk begreepen Deelen, of aan den Breukzak, is de Breuk oninbrengbaar; en heeft dezelve voor het overige alle Kenmerken, welke § 1027, zyn opgeteld. Gelyk egter, deeze aanhegting dikmaalen afhangt van de drukking der Pop eener Breukband ter plaatze van den hals der Breuk, die men niet geheel heeft ingebracht, of in weêrwil van dien Band is uitgeweeke; en fomwylen van eene algemeene dog ligte Ontfteking des uitgevallen Nets, is dezelve, dan eens betreklyk alleen tot dien hals, dan eens, tot de gantsche uitgeftektheid der Breuk zelve.

§ 1036.

§ 1036.

Sommige Netbreuken, inzonderheid van de Liefchen en den Balzak, zyn zeer dun, lang, en als koordächtig; andere hebben de gedaante eener plat-ronde fchyf, en vooräl in het geval van Buikbreuken.

§ 1037.

Zoo moeilyk als we gezegt hebben dat een Netbreuk was om in te brengen, zoo moeilyk is ook fomwylen haare binnenhouding, zelfs door de beste Breukbanden. De natuurlyke glibberigheid van hetzelfde, is de voornaame Oorzaak van het laafte.

§ 1038.

Onder de Toevallen welke de Netbreuk vergezellen, zyn de gemeenzaamfte, zekere ligte Buikpynen, Walgingen, en Braakingen, onmiddelyk na den Maaltyd. Deeze Toevallen zyn afhanglyk van de trekking des Nets, die aan de Maag medegedeeld wordt; en byzonderlyk, als dezelve, opgevuld zynde met Spyze, zig met haaren bodem voor- en opwaards keerd. Ze worden meest bespeurd by verfche en plotslings voorkoomende Breuken van deeze foort, om dat de Maag als dan het meest wordt aangedaan, doordien het Net in zekeren graad is van spanning.

§ 1039.

Het gevaar der Netbreuken, algemeen genoomen, is niet zeer dringend. Somwylen egter kunnen dezelve beklemd raaken, en in verzwearing vervallen of verfterving. In alle deeze gevallen hebbenze zeer fchadelyke, en zelfs wel eens doodelyke gevolgen.

§ 1040.

Omtrent de herftelling en binnenhouding deezer Breuken, kan ik niet anders aanmerken, dan het gene ik van beide deze behandelingen, by verfcheiden gelegheden gezegt hebbe; vermits dezelve naa het verfchil der plaats waarze voorvallen, verfchillend zyn, en volmaakt overëenkoomen met die der Buik-Navel-Liefch-Dyebreuken, en dergelyken.

§ 1041.

Zeer groote, veröuderde, en zelfs sommige vaftgegroeide Breuken van deeze foort, hoe oninbrengbaar ze ook moogen toefchynen, worden dikmaalen herfteld,

steld, door eene aanhoudende horifontaale ligging van het Lighaam, eene schraale Eetregel, herhaalde Aderlaatingen, en menigvuldige Buikzuiveringen. Dezelken, waarin deeze geneeswys vrugtloos beproefd is, of niet kan te werk gesteld worden, moet men door een steunend verband, door een *Schortband* by voorbeeld, onderschraagen.

De Darmbreuk.

§ 1042.

De DARMBREUK is nog immer zoo gemeenzaam dan de Netbreuk; vertoont zig onverschillig aan alle plaatzen van den Buik en het Bekken, waar we gezegt hebben dat Breuken konden plaats grypen; en wordt vooräl gezien by Kinderen. *Hernia intestinalis*

§ 1043.

Somwylen bestaat dezelve uit den gantschen omtrek van een gedeelte des Darmbuis, hoekswys saamengevouwen: somwylen, uit eene zakswyze verlenging van één der zyden. Het laatste geval is zeldzaamer, en minder gevaarlyk dan het eerste.

§ 1044.

De kenmerken eener Darmbreuk, zyn gemeene of eigene. De eerste zyn betreklyk tot alle Breuken zonder onderscheid, en § 917. beschreeven. De laatste behooren alleenlyk tot deeze, en moeten als soort onderscheidend beschouwd worden.

§ 1045.

De Buigbaarheid, spanning, veerkragt, en effenheid der Breuk in zyne gantsche oppervlakte; gelyk ook, het gevoel van Lugtgolving, en de gewaarwording van zekere rommeling, als dezelve met de Vingeren gedrukt word, of van zelve naar binnen gaat, zyn de voornaamste der laatgenoemde kenmerken.

§ 1046.

Alle Darmbreuken zyn gevaarlyk: de kleine egter zyn zulks meerder dan de groote, de versche meer dan de veröuderde, en allermeeft, die by jonge en sterke Menschen zeer schielyk voortkoomen, de geklemde, verstorven, en dergelyken.

§ 1047.

Sommige deezer Breuken zyn inbrengbaar, anderen niet. De eerste zyn geneeslyk by Kinderen, en worden buiten gevaar gesteld by Volwassene, alleen door het aanhoudend gebruik van een welgemaakte Breukband. De laatste zyn zulks uit hoofde van verscheiden byzonderheden, even als de Netbreuken, en moeten, overëenkomstig hier mede, en met de byzynde toevallen, behandeld worden.

§ 1048.

Met de Darmbreuk der Lieffchen, moet niet vermengd worden de Breuk gemaakt door Waterblaasjes, § 864. beschreeven, en die vooräl dikmaalen gezien wordt by Kinderen. Ik ben verplicht zulks hier andermaal te moeten aanmerken, om te meer gelegenheid te geeven tot het vermyden van eenen misflag, die maar al te dikwyls begaan wordt.

*Entero-
Epiplocele.*

De Darm-netbreuk.

§ 1049.

Een Breuk, gelykelyk gemaakt door een gedeelte van het Net, en des Darmbuis, wordt onder deezen naam begreepen.

§ 1050.

Tot deeze soort behooren meest alle Buik- en Navelbreuken, zeer veele Liefch-Dye- en Zakbreuken, gelyk ook sommige, dog weinige Breuken der Schede, van den Bilnaad, en dergelyken.

§ 1051.

Derzelver kenmerken, gevolgen, en behandeling, zyn gedeeltelyk gelyk aan die der Net- gedeeltelyk aan die der Darmbreuken elk op zig zelve genoomen; en moeten uit de vergelyking der Beschryving van beide deeze Gebreken, ontleend worden.

De Blaasbreuk.

§ 1052.

*Hernia
Osfica.*

Door BLAASBREUK verstaat men eene zakswyze verlenging van een der zyden,

den, of van den Bodem des Pisblaas, een gezwel makende aan eenig gedeelte van den omtrek des Bekkens.

§ 1053.

Dit gebrek is vry zeldzaam, en heeft men tot hier toe nog niet gezien by Kinderen. Dit bewyft, dat hetzelfde niet afhangt van eene aangebooren wangestalte des Blaas, gelyk zeker beroemd Heelmeester beweerd heeft.

§ 1054.

Deszelfs kenmerken zyn zeer blykbaar, en behooren gedeeltelyk tot die der Breuken in het algemeen; gedeeltelyk tot de spanning, veerkragt, en het gevoel van Vogtgolving welke men in hetzelfde waarneemt zoo dikmaalen de Blaas met Pis is opgevuld; gepaart met eene doorgaans moeilyke Pislöazing als de Breuk uit is, en eene onbelemmerde ontlasting van dit Vogt in de tegengestelde omstandigheid, of derzelve begunstiging door de binnenbrenging van het gezwel, ten tyde als die ontlasting door de Natuur zelve geëischt wordt.

§ 1055.

Alle deeze verschynzelen egter zyn betreklyk tot eenvoudige Blaasbreuken: dat is, tot dezulken, welke niet verzeld zyn van eenige andere uitgevallen Ingewanden des Buiks, of van het Bekken. 'er Zyn andere, welke de saamengesteltheden deezer Breuken aanwyzen; en deeze moeten ontleend worden uit de vergelyking der zoo even gemelde verschynzelen, met die der Net-en Darmbreuken welke doorgaans deeze saamengesteltheden uitmaaken.

§ 1056.

Sommige Blaasbreuken, voeräl de veröuderde, bevatten in zig één of meerder Steenen, welke inzonderheid kunnen ontdekt worden, als de Breuk door drukking ontleedigt is van de ingeslooten Pis. In dit geval is doorgaans het uitgeweeken gedeelte van den Blaas, vastgegroeid aan de omliggende Deelen; en de Breuk derhalven oninbrengbaar.

§ 1057.

De minste Blaasbreuken worden omvagen van een Breukzak, dewyl de Blaas ligt buiten de bepaaling van het Buikvlies, en voor een gedeelte kan uitvallen zonder hetzelfde. Die egter, waar in de grond zelve des Blaas de Breuk maakt, dat

zeeker een zeldzaam geval is, kan een gedeelte van het Buikvlies, aan deezen grond gehegt, met zig sleepen, dog wordt misschien nimmer hier van omflooten.

§ 1058.

Veele deezer Breuken worden langen tyd gedraagen, zonder eenig ander ongemak, dan eene meer of min moeilyke Pisloozing te veroorzaaken. Sommige integendeel, bevinden zig in het geval van aangroeijing of beklemming, en kunnen zeer flegte gevolgen hebben.

§ 1059.

Inbrengbaare Blaasbreuken, waar ook geplaatst, worden op de gewoone wyze hersteld en binnen gehouden. De oninbrengbaare, moet men, als'er geene dringende toevallen by zyn, door een steunend Verband voor vergrooting beveiligen; en in het geval waar deeze tegenwoordig zyn, onderwerpen aan eene Konstbewerking, overëenkomstig met haare byzondere omstandigheden, en zoo als ik dezelve, by gelegenheid der beschryving van de Breuksnyding, in het *Leerstuk der Heelkundige Kunstbewerkingen*, zal aanwyzen.

*Hernia
ovarîi.*

De Breuk van het Eijer nest.

§ 1060.

Deeze Breuk, die niet dikmaalen voorkomt, bespeurd men meestäl in de Lieschen, en zakt somwylen door tot in de Lippen der Schamelheid. Zy bestaat, of op zig zelfs, of in gemeenschap met een Darm- of Netbreuk.

§ 1061.

In het eerste geval is de Breuk doorgaans eirond, en met haar breedste einde gekeerd naar onderen: Op het gevoel vertoond zig dezelve als een Blaasagtig Lighaam, meer of min opgevuld met Vogt. In het laatste geval zyn de kenmerken duister, om dat het uitgeweeken Eijer nest ligt agter het Net en den Darm, en dus niet dan bezwaarlyk kan onderscheiden worden. Wanneer nogthans, gelyk somwylen gebeurd, de twee laatste Ingewanden inbrengbaar zyn, en het Eijer nest niet, kan men na deeze inbrenging, uit voorgemelde verschynzelen, van derzelver bestaan oordeelen.

§ 1062.

Van alle mooglyke Breuken, is 'er misschien geene die zoo weinig gevaar influit,

fluit, dan deeze; mits dat ze aan zig zelve overgelaaten, en niet verkeerdelyk voor iets anders aangezien, en behandeld wordt. In deeze omftandigheden waarlyk, gelyk ook, wanneer dezelve beklemd wordt, en in ontsteking vervald, kan ze zeer flegte gevolgen hebben.

§ 1063.

Somwylen is de Breuk des Eijerneft, uit hoofde der veelheid van het Vogt, daarin bevat, vry aanzienlyk. In dit geval is dezelve oninbrengbaar, ten zy men alvoorens het verzameld Vogt ontlast heeft, door eene voorzigtige doorbooring van de Bekleedzelen en het Eijerneft, met den driekanten Priem.

*De aangebooren Breuk.**Hernia
congenita.*

§ 1064.

Door deeze verftaat men een Breuk, die kort na de geboorte plaats grypt, tot de Klaffe behoord der Liefch- of Zakbreuken, meeftäl door een gedeelte van den Darmbuis gemaakt word, en waar in de uitgeweeke Deelen, niet omkleed van een Breukzak, met den Bal, in een en denzelfden Kooker van het Buikvlies, welke door het nederzakken des Bals gemaakt wordt, beflooten zyn.

§ 1065.

Als ik zegge, dat eene aangebooren Breuk meeftäl door een gedeelte van den Darmbuis gemaakt wordt, moet zulks inzonderheid verftaan worden van die welke men waarneemt by zeer jonge Kinderen, dat is, van een verfche. In eenen meer gevorderden Leeftyd naamlyk, is het mooglyk, dat men daarin tevens aantreft een gedeelte van het Net, of des Pisblaas.

§ 1066.

Het foortonderfcheidend kenmerk deezer Breuk, is, dat de Bal, of geheel niet, of niet dan bezwaarlyk van het Lighaam des Gezwels kan onderfcheiden worden, welk ook de eindpaal is deezer Zwellings. Ik fpreeke hier enkel van Manlyke Voorwerpen; want by Vrouwlyke kan dit kenmerk geene plaats hebben, en moet men alleen uit den ouderdom der Lydereffe, het verhaal van anderen, en de eironde gedaante der Breuk, zyn befluit opmaaken.

§ 1067.

De behandeling der aangebooren Breuk, in welk eene omftandigheid dezelve

zig ook bevind, verschild in geen en deele van die der gewoone Breuken in overeenkomstige omstandigheden. Het niet bestaan van een gemeene Breukzak slegt in deze, verpligt den Heelmeeſter tot eene byzondere oplettenheid by het doen der Konſtbewerking in het geval van beklemming: dog hier van zal nader geſproken worden by gelegenheid der beſchryving van de Breukſnyding.

De beklēde Breuk.

§ 1068.

Alle Breuken, welke oninbrengbaar zyn uit hoofde eener onēvenreedigheid tusſchen haar *Volumen* en den ingang der Breukzak of van de opening door welke deeze en de Ingewanden zyn uitgeweeken, draagen den naam van BEKLEMD E BREUKEN.

*Hernia
in carcerata*

§ 1069.

De oorzaaken deezer onēvenreedigheid, zyn ſomwylen betreklyk tot de uitgevallen Deelen zelve, ſomwylen tot den Breukzak, en veelmaalen tot den Ring der Buikſpieren, of tot alle andere openingen welke tot de voortkomst der Breuk, gelegenheid gegeven hebben.

§ 1070.

Tot de eerſte deezer oorzaaken behooren, eene verharding van het Net inden hals des Breukzaks in het geval eener Net- of van eene Darm- netbreuk; eene omſlingering van dit vlies, om den uitgevallen Darm in de laaſte omſtandigheid; eenig doorgezwolgen onverteerbaar Lighaam, zig ophoudende in het uitgeweeken gedeelte van den Darmbuis; eene toevallige ontſteking van dit, of van het Net, de Blaas, of welk ander Deel in de Breuk ook begreepen is; eene opvulling van den Darm met ylgeworden Lugt, of verharde Drekſtof; gelyk ook de vorming of ophouding van een Steen, in het verlengde deel des Pisblaas, in het geval eener Blaas- of Blaas- en Darmbreuk.

§ 1071.

Tot de tweede moet men betrekken, de verēnging en verharding van den hals des Breukzaks op één of meer plaatzen, en buiten of binnen de Buiksholte; gelyk ook de verbreeking deezer Zak door uitwendig geweld, in het een of ander gedeelte zyner uitgeſtrektheid, met uitvallng van een gedeelte der Breuk door deeze opening.

§ 1072.

§ 1072.

Tot de laaften kunnen gebragt worden, eene te kleine ruimte van den Ring der Buikspieren, in vergelyking van de hoeveelheid der Ingewanden welke daar door plotslings, en met geweld worden uitgeperst; de veerkragtige vernauwing deezer Ring na voorgaande uitrekking, door de uitgevallen en buiten gebleeven Deelen; eene toevallige ontsteking der Peesvezelen welke dien Ring saamenstellen; en eindelyk, eene toetrekking des meergemelde Rings, door eene krampagtige inkorting der uitwendige schuinze Buikspier.

§ 1073.

Als eene zeer byzondere en zeldzaame oorzaak van beklemming moet men aanmerken, de losmaaking dier vernauwing van den Kooker des Buikvlies by Kinderen, welke zig bevind onmiddelyk boven den Bybal; of van het onderste gedeelte des Schederoks van den streng der Zaadvaten, by Volwassene. Een gedeelte naamlyk der Breuk, hier door gedrongen in den Schedenrok des Bals, heeft men ééns daarin beklemd gevonden.

§ 1074.

De kenmerken der beklemd Breuken, kunnen in *algemeene*, en *byzondere* onderscheiden worden. De eerste bespeurd men by alle deeze Breuken zonder onderscheid; de laatste alleen by deeze of gene derzelve by uitstek.

§ 1075.

De *algemeene kenmerken* zyn inzonderheid, Pyn, zoo in de Breuk zelve als in den Buik; zwellings, eerst van geene, naderhand ook van deeze; aanhoudende Walgingen, of Braakingen; dikmaal hervatte aanvallen van Hik; onophoudelyke benauwtheid, slaaploosheid, en woeling; ontstekenagtige Koorts, met een kleine en ingetrokken Pols; gelyk ook, en vooral wanneer de Ziekte tot het hoogst gekoomen is, klam Zweet, koude Ledemaaten, en eene kleine benauwde Ademhaaling. Somwylen zelfs, gaat in deeze laatste omstandigheid de Breuk van zelfs binnen, verdwynd alle Pyn, en bevind zig den Lyder in schynbaar gunstige omstandigheden, terwyl nogthans zynen Dood zeeker, en kort aanstaande is.

§ 1076.

De *byzondere kenmerken* zyn even zoo verschillend, als het verschil is der
Dee-

Deelen, in de Breuk begreepen. Wy zullen slegts de voornaamsten daar van aanwyzen.

§ 1077.

Eene beklemde Netbreuk, die altoos van minder dringende toevallen vergezeld gaat dan geklemde Darmbreuken, is in 't algemeen niet zeer pynlyk, weinig gespannen, en zonder belemmering van den Stoelgang of Pisloozing. Somwylen egter, en vooräl wanneer de Breuk versch is, wordt de gantsche Buik zoo pynlyk, dat de geringste aanraaking onverdraaglyk is voor den Lyder. In dit geval ook, bespeurd men doorgaans Walgingen en Braakingen, inzonderheid na het gebruik van Voedzelen; en is de Zieke Koortfig, woelend, onderhevig aan allerlye krampägtige Toevallen, en onöphoudelyk verplicht tot eene vooröverkromming van het Lighaam.

§ 1078.

In eene geklemde Darmbreuk, is de Pyn scherp, de spanning aanzienlyk, de Braaking aanhoudend en van een galägtige aart, de Koorts hevig, de Buikpyn levendig, en de ontlasting van de stof des afgangs, langs den natuurlyken weg, veeläl onmooglyk. Ik zegge, *veeläl onmooglyk*, om dat in het tweede geval § 1043. beschreeven, deeze ontlasting niet wordt afgebrooken dan in het uiterst tydperk der Ziekte, wanneer de gantsche Darmbuis zig bevind in eenen staat van ontsteking; en zulks alleen gemeenzaam is in het eerste. De Drekbraaking, door veele, als een ander kenmerk deezer Breuken opgegeeven, is van gelyken niet zoo zeer eigen aan hetzelfde geval, dan aan het eerste, en ben ik hieröm met stilzwygen voorbygegaan.

§ 1079.

Wanneer een gedeelte van het Net en den Darmbuis, in eene beklemde Breuk begreepen zyn; vind men gemengde kenmerken, dat is te zeggen, gedeeltelyk die van § 1077, gedeeltelyk die van § 1078, en is de opvolging der toevallen meer of min langzaam, naar maate dat een kleiner of grooter gedeelte der Darmen, in de Breuk beslooten is.

§ 1080.

Als in eene Blaasbreuk beklemming plaats heeft, wordt de Pis in het uitgewee-ken gedeelte van den Blaas opgehouden, de Blaas zelve vervalld in ontsteking, en hier van ontspruiten Pisöpftopping met alle derzelve gevolgen. Deeze derhalven inzonderheid, moet men als de kenmerken dier beklemming aanmerken.

§ 1081.

§ 1081.

Alle beklemde Breuken zyn gevaarlyk: De eene egter, is zulks meerder dan de andere. De gevaarlykste van allen zyn de versche en kleine Darmbreuken, vooräl wanneer dezelve by jonge, sterke, en bloedryke Menschen plaats grypen.

§ 1082.

Omtrent de behandeling kan men geene algemeene Regelen vast stellen, daar het zeker is, dat dezelve bepaald wordt, door de oorzaaken zelfs der klemming, en de blykbaare omstandigheden in dewelke zig de uitgeweeke Deelen bevin- den. De volgende byzonderheden, moeten ten deezen opzigte vooräl in agt genoomen worden.

§ 1083.

Wanneer de beklemming afhangt van eene Krampagtige inkorting der uitwendige schuinze Buikspier, een geval, dat inzonderheid door eene beurtelingsche vermindering en vermeerdering der byzynde toevallen gekend wordt, is het *Heulsap* het voornaamste Hulpmiddel. Men bediene zig naamlyk van hetzelfde in kleine dog dikmaalen herhaalde giften inwendig; en uitwendig, onder enkel weekmaakende Pappen, over de Breuk en Buik aangelegt, terwyl men tevens gebruik maakt van kleine, lauwe, weekmaakende Darmspuitingen.

§ 1084.

In beklemmingen, veröorzaakt door ophooping en verharding van drekstof in het uitgevallen gedeelte des Darmbuis, bespeurd men veelmaalen verbaazende uitwerkingen van het *Engelsch purgeerzout* opgelost in Water, en van tyd tot tyd gegeeven in zulk eene hoeveelheid als de Maag best verdraagen kan. Weekmaakende Pappen, op de Breuk aangelegt, en het inblaazen van *Tabaksrook* door den Endeldarm, zyn in dit geval insgelyks voordeelig. Eene ongewoone zwaarte en hardheid der Breuk, hardlyvigheid, voor en alëer dezelve pynlyk wordt, gelyk ook de traage voortkomst en aanwasch van alle toevallen, moet men als zoo veele foortönderscheidende verschynzelen deezer beklemming aanmerken.

§ 1085.

Dat soort van beklemming welk veröorzaakt wordt door eene toevallige ontsteking van de Breuk of den Buikring, draagt alle kenmerken der ontsteking §. 450.

beschreeven, en bespeurd men het meest by kleine en versche Breuken van den Darmbuis; by dezulke, welke langen tyd door een Breukband binnen gehouden zynde uitwyken; gelyk ook, in het geval van uiterlyke beleedigingen op de Breuk zelve toegepast. In deeze omstandigheid, die buitengemeen gevaarlyk is, dienen herhaalde Aderlaatingen, verkoelende en weekmaakende Klysteeeren, Pappen van denzelfden aart, op den Buik zoo wel als op de Breuk aangelegt; Bloedzuigers, geplaatst op de laatste, en in den omtrek des Spierings; en het herhaald gebruik van *drooge Koppen* in de Lenden en op het Hyligbeen.

§ 1086.

Als de beklemming inzonderheid afhangt van ylgemaakte Lucht in den uitgeweeken Darm beslooten; een geval, dat door de zeer groote spanning, veerkracht, en Lugtgolving der Breuk, ten tyde van het beproeven der inbrenging, wordt aangewezen, moet men vooräl gebruik maaken; van dikmaal hervatte besprengingen met koud Water, van dergelyke omslagen, van het aanleggen van Ys of Sneeuw, zulks mooglyk zynde, en in 't algemeen, van alles wat in staat is, om de voorgemelde Lucht te verdikken en de veerkracht des Darms te herstellen. Eene enkele Aderlaating in het geval van Bloedrykheid, Jeugd, of zeer groote Levenskrachten; weekmakende, dog nauwlyks warme Darmspuitingen, van tyd tot tyd hervat; en het gebruik van zeker *pynstillend en windbreekend Mengzel*, 't welk ik hierna beschryven zal, moeten intusschen niet verzuimd worden.

§ 1087.

Indien in elk der gestelde gevallen, de aangewezen Hulpmiddelen van geene uitwerking altoos zyn, en de byzynde Toevallen meer toe dan afneemen, wordt de Kunstbewerking onmybaar, als geene andere omstandigheden dezelve verbieden. De byzonderheden hier toe betreklyk, zullen we op haare plaats aanwyzen.

De aangegroeide Breuk.

§ 1088.

In veröuderde, verwaarloosde, of meermaalen beklemd geweest zynde Breuken, gebeurt dikwyls eene aangroeijing der Deelen aan elkander, of aan den Breukzak, die dezelve geheel of ten deele oninbrengbaar maaken, na dat ze algemeen

meen is, of gedeeltelyk. Breuken welke zig bevinden in deeze omftandigheid, heeft men den naam gegeven van A A N G E G R O E I D E.

*Hernia
accreta.*

§ 1089.

Van alle mooglyke Breuken, is miffchien geene zoo vatbaar voor dergelyk een aangroeiing, als de Netbreuk. Deeze waarlyk, niet behoorlyk in agt genomen, doet zulks zeer fchielyk.

§ 1090.

Deeze aangroeiingen zyn niet altoos van denzelfden aart, maar dan eens draadagtig, dan eens vleezig, dan eens fponsagtig. In de twee laafte gevallen zynze altoos zeer uitgebreid, nauwkeurig, en niet dan met veel moeite en gevaar los te maaken. In het eerfte geval zynze doorgaans flymagtig, of kunnen ten minften ligtelyk met den Nagel, of een ftomp werktuig verbrooken worden.

§ 1091.

Het was te wenfchen, dat men in alle voorkoomende Breuken van deeze foort, by dewelke zig verfchynzelen opdoen van klemming, van vooren zeeker ware van den juiften aart der aangroeiing, uit hoofde van den invloed hier van, op de behandeling. Ten deezen opzigte egter, ontbreken ons de noodige kenmerken, en kan men flegts uit de gedeeltelyke of geheele oninbrengbaarheid der Breuk befluiten, of deeze aangroeiing bepaald of algemeen is.

§ 1092.

Het gevaar deezer Breuken, algemeen genoomen, is niet groot, doordienze zeldzaam vallen in beklemming. Dit egter plaats grypende, zynze veelmaalen gevaarlyker dan andere, om datze nauwlyks vatbaar kunnen zyn voor eenige Kunstbewerking.

§ 1093.

Haare behandeling beftaat meeftal in het gebruik van een *Schortband*, om den aanwafch zoo veel mooglyk zy te beteugelen. 'er Zyn nogthans gevallen, waarin men dezelve volkoomen heeft ingebracht, na eene geduurige horifontaale ligging van het Lighaam, eene aanhoudende fchraale Eetregel, en het dikmaalig herhaalen van fterke Purgeermiddelen. Deeze handelwys derhalven, moet in alle gevallen waar zulks zyn kan, beproefd worden.

§ 1094.

Beklemde Breuken van deeze foort, moet men op dezelfde wyze behandelen als andere, en overëenkomstig met haare meestblykbaare oorzaaken. Omtrent de Konstbewerking, koomen verscheiden gewigtige byzonderheden in aanmerking, welke wy ter zyner plaatze nader zullen aantoonen.

De Verzworene Breuk.

§ 1095.

Beklemde Breuken, dezulke welke altoos buiten zyn, en eenige beleediging ondergaan, vervallen somwylen in verzwearing, en maaken alsdan een Gezwel, waarin men, eerst de kenmerken van Ontsteking, en naderhand die der Verëtering, op eene meer of min blykbaare wyze, waarneemt. In de laatste omstandigheid inzonderheid is het, dat men aan dezelve den naam geeft van VERZWOOREN *Hernia*
suppurata. BREUK.

§ 1096.

Netbreuken, zyn voor deeze ontäarting meer vatbaar dan Darm- of Blaasbreuken. De reeden hier van moet gezogt worden, gedeeltelyk in het maakzel van dit Vlies, gedeeltelyk in zekere toevallige Verhardingen, welken in deszelfs uitgeweeken gedeelte dikmaalen plaats grypen.

§ 1097.

Eene vooräfgaande ontsteking der uitgeweeken Deelen, bekend uit derzelver gewoone verschynzelen; en vooräl het gevoel eener meer en meer toeneemende Vogtgolving, zyn de voornaame kenmerken deezer Breuken.

§ 1098.

Haare behandeling verschild niet van die der Ettergezwellen in het algemeen, dan voor zoo veel betreft zekere omzigtigheden omtrent de aangedaane Deelen, welke inzonderheid eischen zeer zagte Balzemächtige, en bederfweerende Hulpmiddelen. Een ruim gebruik van den Koortsbast, en eene voedende Eetregel, zyn ter bepaaling der Verëtering, ter beteugeling der byzynde Sluipkoortsen, en ter ondersteuning der in dit geval altoos zeer verzwakte Levenskrachten, van eene volstrekte noodzaaklykheid.

De Verstorven Breuk.

§ 1099.

VERSTORVEN BREUKEN, zyn doorgaans het gevolg van Beklemde, welke of door verwaarloozing, of door eenige andere oorzaak, in eenen hoogen graad van Ontsteking vervallen zyn.

*Hernia
gangranosa*

§ 1100.

Derzelver kenmerken zyn deeze. De Breuk, te vooren gespannen, hard, en zeer pynlyk, wordt week, deegagtig, klein, onpynlyk, en veelal miskleurig in haare oppervlakte. Somwylen zelfs verdwynd dezelve geheel in één enkel oogenblik, en houden alle toevallen op der beklemming. In dit geval, en ook als zulks geene plaats grypt, maar de Breuk bestendig buiten blyft, is de bedrieglyke kalmte waarin den Lyder zig bevind, van eenen zeer korten duur, en verschynen 'er wel haast, zeer stinkende Stoelgangen, of aanhoudende Drekbraakingen in het geval van Darmbreuk, en byna altoos, eene zeer gespannen Buik, gezonken Pols, een flauw Gezigt, koude der Ledemaaten, koud Zweet, zeer groote Benauwtheid, hernieuwde aanvallen van Hik, blauwe of zwarte vlekken in de dekkende bekleedzelen der Breuk, scheiding van deezen, ontlasting van Drek, door de openingen hier van afhanglyk, en dergelyken.

§ 1101.

Alle deeze Breuken zyn gevaarlyk; de eene egter is zulks meerder dan de andere. De uitgebreithed der Verfterving, door sommige als de regelmaat van dit gevaar aangemerkt, schynt zulks niet te zyn dan toevallig, dewyl veeltids eenen zeer geringen graad derzelver den Dood veroorzaakt, en de schynbaar wanhoopendste vernielingen der uitgeweeke Deelen, en van derzelver bedekzelen, of geheel hersteld worden, of niet dan eene Drek-pypzweer nalaaten.

§ 1102.

Nauwlyks kan men over den aart der Verfterving, in deeze gevallen oordeelen, dan na het doen der Breuksnyding, of de van zelfs gebeurende ontblooting der uitgevallen Ingewanden. By deeze gelegenheden, vind men dezelve dan eens gezond of ontsteken, en bezet slegts met eene enkele vlek die verdagt is; dan eens blyven de overige omstandigheden dezelfde, en is deeze vlek volstrekt

Gg 3

koud.

koudvuurig; fomwylen eindelyk is het getal deezer vlekken veelvuldig, of heeft de Verfterving eene zeer aanmerklyke uitgebreithed. Alle deeze verſcheidenden, gevoegt by den verſchillenden aart der Deelen welke de Breuk maaken, bepaalen niet alleen de voorzegging, maar ook de behandeling deezer Breuken, en onderwerpen derzelven aan zeer veele, en groote veranderingen, welke wy in het Leerſtuk der Heelkundige Kunſtbewerkingen, onder het opſchrift der Breukſnyding, tot welke dezelve inzonderheid behooren, zullen voordraagen.

§ 1103.

Dit alleen, moet ik ter deezer plaatze aanmerken; dat, wanneer de Natuur zelve, als men by een dergelyk geval geroepen wordt, de afſcheiding van het verſtorvene bewerkt heeft, en 'er eene opening is in de Bekleedzelen, door dewelke de Drek in het geval van Darmbreuk, een rot ſtinkvogt en ontäart vetvlies in het geval van Netbreuk, de Pis in het geval van Blaasbreuk, en een wyeächtig vogt in het geval eener Breuk van het vrouwelyk Eijerneſt, ontlaſt wordt, met vermindering van de toevallen der beklemming; dat, zegge ik, alſdan moet gebruik gemaakt worden van eene plaatzing des Lighaams, welke de ontlaſting begunſtigt; van vlakke, drooge, en niet drukkende Verbanden; van eene zagte, niet opvullende, dog voedende Eetregel; van dikmaal herhaalde weekmaakende Darmſpuitingen; gelyk ook, van een welverzaadigd afkookzel des Koortsbaſt, veelmaalen daags, en in kleine giften, toegediend.



HEDENDAAGSCHE

ALGEMEENE OEFFENENDE

HEELKUNDE.

VYFDE LEERSTUK.

VERHANDELING

DER

BEEENZIEKTEN.

H h

IN.

I N H O U D.

De Beenziekten in 't algemeen.

I HOOFTDEEL. *De Beenbreuken.*

De Beenbreuken in het algemeen.

- *Breuk der Neusbeenderen.*
- — *des Fukboogs.*
- — *der Onderkaak.*
- — *van het Sleutelbeen.*
- — *des Schouderblads.*
- — *van het Opperarmbeen.*
- — *van de Beenderen des Voorärms.*
- — *van het Elleboogs-witsteekzel.*
- — *der Beenderen van de Voorhand, der Naband,*
en der Vingeren.
- — *van het Borstbeen.*
- — *der Ribben.*
- — *— Wervelbeenderen.*
- — *van het Hylig- en Staartbeen.*
- — *der Heupbeenderen.*
- — *van het Dyëbeen.*
- — *der Knieschyf.*
- — *— Scheen en Kuitbeenderen.*
- — *— Beenderen van den Voet, en der Teenen.*

II HOOFTDEEL. *De Ontwrigtingen.*

De Ontwrigtingen in het algemeen.

- *Ontwrigting der Onderkaak.*
- — *van het Hoofd.*
- — — *— Sleutelbeen.*
- — — *der Ribben.*
- — — *van het Armbeen.*
- — — *des Voorärms.*

De Ontwrigting der kleine Ellepyp.

- — — — — *Voorband.*
- — — — — *van den Duim.*
- — — — — *der Vingeren.*
- — — — — *van den Dyë.*
- — — — — *— de Knieschyf.*
- — — — — *des Scheenbeens.*
- — — — — *van den Voorvoet.*
- — — — — *der Teenen.*

3 HOOFTDEEL. *De Afwykingen der Beenderen.*

De Afwykingen in 't algemeen.

- *Afwyking der Bekkeneelsbeenderen.*
- — — — — *Neusbeenderen.*
- — — — — *Saamenstellende deelen van de Onder-*
kaak, by Kinderen.
- — — — — *des Tongbeens.*
- — — — — *van de voorëinden der Ribben.*
- — — — — *— het Zwaardwyze Kraakbeen.*
- — — — — *der Ongenaamde Beenderen van het Hylig-*
Been.
- — — — — *— Schaambeenderen.*
- — — — — *van het Staartbeen.*
- — — — — *der kleine Ellepyp.*
- — — — — *— Voor- en Nakandsbeenderen.*
- — — — — *des Kuitbeens.*
- — — — — *der Beenderen van den Voor- en Navoet.*

4 HOOFTDEEL. *De Ontäartingen van de Zelfstandigheden der Beenderen.*

De Ontäarting van de Zelfstandigheid der Beenderen in
het algemeen.

- *Brosheid der Beenderen.*
- *Weekheid der Beenderen.*

I N N H O O U D.

De Engelsche Ziekte.

— *Beenknobbel.*

— *Zwelling der Beenëinden.*

— *Winddoorn.*

Het Beenbederf.

— *Vleesch Been-gezwel.*

De Tak- en Bladwyze verhevenheden der Beenderen.

— *Vermindering van de Zelfstandigheid der Beenderen
door opneeming van Beenstof.*

— *Beenpyn.*

5 HOOFDDEEL. *De gebrekkige of geheel onmoglyke beweging der
Geleedingen.*

*De gebrekkige of geheel onmoglyke beweging der Ge-
wrigten, in het algemeen.*

— *Gewrigts-verstyving.*

— *Kraaking der Gewrigten.*

— *Verlapping der Banden.*

— *Verstuiking.*

— *Mankheid.*

HEDENDAAGSCHE

ALGEMEENE OEFFENENDE

HEELKUNDE.

VYFDE LEERSTUK.

VERHANDELING DER BEENZIEKTEN.

Der Beenziekten in het Algemeen.

§ 1104.

BEENZIEKTEN, noemt men alle die gebreken der Beenderen, welke den zaamenhang van derzelver deelen verbreeken; haare onderlinge vereeniging los maaken; derzelver zelfstandigheid veranderen; of de natuurlyke beweegbaarheid der Gewrigten in wanorde brengen.

§ 1105.

De *Beenbreuken* derhalven, de *Ontwrigtingen*, de *Afwykingen*, de ontäartingen van de zelfstandigheid der Beenderen, en de gebrekkige, of geheel enmoog

Hh 3.

*Morbi
Ossium.
lye.*

lyke beweging der geleedingen, behooren alle tot dezen. Zie hier, eene meer byzondere beschryving van elk deezer Ziekten, in het afgetrokkene.

I. H O O F T D E E L.

De Beenbreuken.

§ 1106.

Fractura. **E**EN BEENBREUK, is eene verbreeking van den saamenhang der Beenderen, in twee of meer groote stukken; afhanglyk, strikt genoomen, van eene uiterlyke, en meer of min geweldig werkende oorzaak.

§ 1107.

Gemeenlyk worden de Beenbreuken onderscheiden in drie soorten; in *Eenvoudige* naamlyk, *Meervoudige*, en *Saamengestelde*.

§ 1108.

*Fractura.
Simplex.*

Eene *EENVOUDIGE* BEENBREUK, zegt men dat plaats heeft, wanneer eenig gegeeven Been, op niet meer dan eene plaats gebrooken is, zonder merklyke beleediging der naastliggende Deelen.

§ 1109.

*Incompleta.
Completa.*

Wanneer in Deelen, waarin twee Beenderen gevonden worden, het eene Been geheel blyft, en het andere gebrooken wordt, behoord deeze Breuk tot de Klasse der *Eenvoudige*, dog verkrygt alsdan den naam van *ONVOLKOOMEN*, in onderscheiding van de *VOLKOOMEN*, die eene verbreeking ondersteld van beiden. Sommige Heelkundigen hebben oök het eerste soort deezer Breuken beschreeven onder den naam van *Enkele*, en het laaste, onder dien van *dubbele Beenbreuken*.

§ 1110.

*Fractura
composita.
Fractura
completa.*

Als een Been, op meer dan eene plaats tevens gebrooken is, wordt zulks eene *MEERVOUDIGE* BREUK geheeten; en men geeft den naam van *SAAMENGESTELDE*, aan de genen, welke gepaart gaan met Toevallen, niet geneesbaar door de eigen behandeling der Beenbreuk. Hieromtrent egter moet men aanmerken,

ken, dat geene Breuk deezen naam toekomt, ten zy de toevallen van eenig merklyk belang zyn; vermits 'er by geene mooglykheid eene Beenbreuk kan ondersteld worden, niet in zekere maate verzeld van Kneuzing, Spanning, of Ontsteking.

§ IIII.

Eene andere verdeeling der Beenbreuken, is gegrond op derzelver verschillende gedaante; en ten deezen opzichte zegt men, dat 'er DWERSCHE zyn, SCHUINZE, en LANGWERPIGE. Ik moet egter bekennen, dat de eerste soort my toefchynd, niet te bestaan dan denkbeeldig, en dat alle Beenderen, meer of min schuins breekende, volstrekt onvatbaar zyn voor dezelve. Of de langwerpige Breuk, op zig zelve genoomen, immer gezien is dan in platte Beenderen, is by my nog twyffelagtig.

*Fractura
transversa,
obliqua &
longitudi-
nales.*

§ IIII2.

De gantsche verbreeking eens Been, in kleine stukken, 't zy met, 't zy zonder verlies van zelfstandigheid, wordt VERBRYZELING geheeten.

*Comminu-
tio.*

§ IIII3.

Wy hebben in de bepaaling der Beenbreuk § III06 gezegd, datze door eenig uiterlyk geweld werdt toegebracht; en dit geweld beschouwd als een der voornaamste haarer voortbrengende oorzaken. Thans moet ik 'er byvoegen, dat 'er in het gestel zelve van den Lyder eene andere oorzaak kan plaats hebben, die met de voorige medewerkt; en deeze is eene zieklyke broosheid der Beenderen, afhankelijk vooräl van eene ongesteltheit der Vogten.

§ IIII4.

De uitwerkzelen der Beenbreuken zyn verschillend, naar de verscheidenheid der gebrooken Beenderen; naar den verschillenden aart zelve der Beenbreuk; naar den staat der afgebrooken stukken, en derzelver gedaante; naar derzelver getal en grootheid; naar de plaats alwaar de Beenbreuk voorvald, en de natuur der Deelen in haaren omtrek gelegen; en eindelyk, naar den staat zelve van den Lyder.

§ IIII5.

Met betrekking inderdaad, tot elk deezer byzonderheden is het waar, dat groote Beenderen, welke veel Merg in zig bevatten, ingevalle ze eene saamengestelde Breuk ondergaan, meerder onheilen veroorzaaken dan kleine: dat de minst schuinze Beenbreuk

breuken, gemaklyker hersteld en bevestigd worden, dan die zulks meerder zyn: dat in Breuken, waarin de verdeelde stukken nog met het geheel verbonden zyn, de nabuurige Deelen minder te lyden hebben, en de toevallen geringer zyn, dan wanneer dezelve gantschelyk zyn afgescheiden: dat scherp gepunte beenbrokken, meerder wanordes veroorzaaken, dan die stomp zyn: dat, als het getal der Beenschilfers, of derzelver uitgestrektheid groot is, de omliggende Deelen merklyk meerder worden aangedaan, dan als het tegengestelde plaats heeft: dat, als 'er groote Vaten, of aanmerklyke Zenuwen in de nabyheid van de Breuk liggen; of dezelve dicht by een Gewrigt plaats grypt; zeer schaadelyke toevallen kunnen gebooren worden: dat eindelyk by oude, zwakke, of zieklyke Menschen, de Beenbreuken meerder gevolgen naar zig sleepen, en bezwaarlyker geheeld worden, dan by jonge, gezonde, en sterke.

§ III 6.

De plaatslyke verschynzelen welke de Breuk vergezellen, het verlies by voorbeeld van steunzel, en der beweeging; de verkorting des Deels; deszelfs wanschiklyke gedaante; deeze verschynzelen zegge ik, verschaffen zeer zeekere kenmerken der Beenbreuken, mits dat het Gevoel tevens de Breuk waarneemt; het Gehoor kraaking bespeurd; de Reeden, de kragt vergelykt der oorzaak met den ouderdom des Lyders, de bekende sterkte van het Been, en het Jaargetye; en men zig nauwkeurig onderrigte, omtrent den voormaligen staat van het Deel, in het welke men ondersteld dat de Breuk plaats heeft, zoo wel als van dat, welk daar mede, ter anderer zyde van het Lighaam overëenstemd.

§ III 7.

De eenvoudigheid, meervoudigheid, saamengesteltheid, en duuring der Beenbreuk; het getal, de gedaante, en grootheid der Beenbrokken; de natuur der omliggende Deelen, en de aangelegenheid van derzelver werkingen; het Jaargetye, de ouderdom, en de gesteltheid des Lyders; bepaalen inzonderheid, het gemak en de moeilykheid der genezing; en of dezelve van langen of korten duur, volkoomen of onvolkoomen zyn zal.

§ III 8.

Ter geneezing der Beenbreuken moet aan drie aanwyzingen voldaan worden. Men moet naamlyk de gebrooken einden, zoo nauwkeurig als immer mooglyk is aan elkander voegen. Men moet dezelve, in den eens gegeven stand met alle zorg-

zorgvuldigheid bevestigen. De Lyder eindelyk, moet indervoegen bestierd worden, dat de vereeniging des Beens, dat is, de vorming en volmaaking van het BEENWEER, onbelemmerd geschieden konne.

Callus.

§ 1119.

Om aan de eerste aanwyzing, algemeen genoomen, te voldoen, bediend men zig van de uit- en tegenrekkingen; waaromtrent de volgende byzonderheden moeten in agt genoomen worden. 1. De Lyder zo wel als den Heelmeeſter, en de Helpers, moeten dus geplaatst zyn, dat de eerste alle mooglyk gemak gegeven worde; en de laaften op eene onbelemmerde wyze kunnen werken, zonder verplicht te zyn, om ſtaande de bewerking van ſtand te veranderen. 2. Het lydend Deel, moet men, zo na doenlyk eenen ſtand geeven, niet meer hellende naar eene volſtrekte buiging, dan uitſtrekking; op dat alle Spieren, welke de Breuk omringen, eenen gelyken graad hebben van ſpanning. 3. De uit- en tegenrekkende vermoogens, moeten in kragt volmaakt aan elkander beäntwoorden; of althans zeer weinig onderling verſchillen. 4. Beide deeze vermoogens, moeten worden toegepast, dan eens op het Deel zelve waarin de Beenbreuk plaats grypt, dan eens op de volgende Deelen, en wel zoo verre van de Beenbreuk, als mooglyk zy. 5. De Handen alleen, moeten de werktuigen zyn waar mede de rekkingen gedaan worden; en moet men zig nimmer bedienen van ſtroppen of konſttuigen. 6. Men moet altoos indagtig zyn, om de uit- en tegenrekkingen langzaam aan te leggen, ten einde men de Spieren den noodigen tyd geeve ter verlenging. 7. Men moet dezelve tot zoo verre voortzetten, dat de einden der gebrooken Beenderen vry zyn; en zonder merklyke wryving op elkanderen te maaken, kunnen herſteld worden. 8. En eindelyk, moet de herzetting geſchieden, met alle mooglyke oplettenheid voor de zagte Deelen welke de Breuk omringen, door de hand zelve van den Heelmeeſter, hier toe, naar eiſch der byzondere omſtandigheden, op eene verſchillende, en niet wel bepaalbare wyze bewoogen.

§ 1120.

Ter bereiking van het tweede Oogmerk, dat de bevestiging inſluit der herſtelde Beenëinden, diend gedeeltelyk het Verband, gedeeltelyk de plaatzing des Deels, gedeeltelyk die van het gantſche Lighaam.

§ 1121.

Het Verband der Beenbreuken bestaat uit Drukdoeken, Spalken, en Windzels, die naar de verscheidenheid der Breuk zelve, en het verschil des Deels waarin ze voorvald, op verschillende wyzen moeten gemaakt, en aangelegt worden. Om trent dit stuk derhalven, kan ik geene andere algemeene Regelen voorschryven, dan met betrekking tot de Spalken, welke altoos van eene vaste, dog niet geheel onbuigbaare stof saamengesteld, en zoo lang zyn moeten, dat door dezelve tevens de naastliggende Gewrigten bedwongen worden. De noodzaaklykheid van het laatste waarlyk, is zoo groot, dat ik hierop nauwlyks genoeg kan aandringen, nog my, met te veel nadruk verklaaren, tegen die zeer styve, smalle, en korte Spalken, welke by de meeste onzer Heelmeesters in gebruik zyn, en zoo veele verwoestingen aanrigten.

§ 1122.

De plaatsing des Deels, en van het gantsche Lighaam, moet aan het gemak des Lyders, en de zekerheid der herstelde Beenbreuk beäntwoorden. Men bediend zig hier toe van Sjerpen, Kussens, en eene meest horifontaale ligging somwylen, van den Lyder, op een vast Bedde of Matrassen. Dat het gebruik der eersten inzonderheid te pas komt, in de Beenbreuken der bovenste, en der laaften, in die van de benedenste Ledemaaten, is iets, 't gene ik nauwlyks behoeve te doen opmerken. De Strooärmen, Beenlaaden, en meer andere voortgelyke Werktuigen, door de Schryvers ter bepaaling van sommige Beenbreuken aangepreezen, zyn in alle gewoone omstandigheden van het leeven zoo belemmerend als noodeloos; en kunnen slegts in één enkel geval, dat is, als de Lyder na het herstellen der Beenbreuk, eene aanmerklyke plaatsverändering ondergaan moet, toegelaaten worden.

§ 1123.

Men besluit dat de Breuk wel hersteld, het Verband goed aangelegd, en het Deel behoorlyk geplaatst is, als de algemeene gedaante des Deels overéénkomt met die van het gezonde; als de pijn geweeken, of althans grootelyks vermindert is; als de warmte van het Deel boven en onder het Verband maatig, en 'er of geheel geene, of zeer weinig bolle zwelling aanwezig is; gelyk ook, wanneer geenig gedeelte des Lighaams, of van het gebrooken Deel, op eene pynlyke wyze gedrukt wordt.

§ 1124.

§ 1124.

De laatste aanwyzing, de bestiering naamlyk van den Lyder, ter herëeniging des Beens, en volmaaking van het Beenweer, besluit in zig, de regeling der Levenswys, de verandering der Verbanden, en de behandeling der gewoone Toevallen.

§ 1125.

De Levenswys moet dus worden ingerigt, datze verkoelend is, rustverwekkend, en verkwikkelyk. Alles wat eenigermaaten het Lighaam verhitten, en de Hartstogten ontrusten kan, moet vermyd worden. Ingevalle van Bloedrykheid vooräl, of van eene te vooren gehouden onmaatige Eetregel, is zulks ten uitersten noodzaaklyk; en in deeze omstandigheid ook, voegd men by de Levenswys, de Aderlaating, en zeer zagte Buikzuiveringen.

§ 1126.

Het is bezwaarlyk te bepaalen, hoe dikmaalen de Verbanden der Beenbreuken moeten veranderd worden; vermits zulks meestäl afhanglyk is van eenige bykomende toevallige omstandigheden. In 't algemeen egter, moet deeze verandering nimmer geschieden buiten noodzaaklykheid; en deeze heeft plaats, als het Verband meer of min ontwikkeld wordt; als het lydend Deel zeer pynlyk is; of, wanneer deszelfs bovenste en onderste uiteinden merklyk gezwollen zyn. Buiten deeze omstandigheden waarlyk, daar men nog eene zeer lastige Jeukte, ontvelling en aanmerklyke Kneuzing kan byvoegen, is het best dat men zeer zeldzaam verbinde, om te minder gevaar te loopen van de herstelde Beeneinden te verplaatzen.

§ 1127.

De behandeling der gewoone Toevallen, moet aan de verscheiden hoedaanigheden van deeze beantwoorden, en kan derhalven tot geene algemeene Regelen gebragt worden. Gelyk egter dezelve meerendeels bestaan, in Pyn, Spanning, Ontsteking, Koorts, Stuiptogtige beweegingen inzonderheid in den Slaap, Slaaploosheid, en dergelyken, kan men deeze dikmaalen te hulp koomen, door Ontlastende, verkoelende, en Rustverwekkende Geneesmiddelen; gelyk ook door verzagtende, oplofende, verkoelende, of zagtelyk Saamentrekkende Vogten, met dewelke het Verband by aanhoudenheid moet besproeid worden.

§ 1128.

Tot hier toe is alles wat ik van de behandeling der Beenbreuken gezegd hebbe, alleen betreklyk tot de eenvoudige, en kan niet voldoen in dezulke, welke uit hoofde eener byzynde Wonde, zwaare Kneuzing, Bloedvliet, Verbryzeling, of verlies van Zelfftandigheid, tot de Klasfe behooren der Saamengeftelde. Het is derhalven noodig, dat ik hier ömtrent de meest weezenlyke aanmerkingen mededeele.

§ 1129.

Als 'er een Wond is by de Beenbreuk, zoo is deeze afhanglyk van de werking der kwetsende Oorzaak, of van de einden der gebrooken Beenderen zelve, welke de Huid en Spieren doorbooren. In het laaste geval is de herftelling zeer moeilyk, en vordert niet alleen fterke uitrekkingen, maar ook fomwylen het vergrooten der Wonde door eene infnyding; het gebruik der hefboom van GALENUS; of de afzaaging van het uitfteekend Beendeel. In beide gevallen, moet de Wond met balfemächtige middelen behandeld, en het Deel verbonden worden met den Boekband, van tyd tot tyd bevogtigt met oplofende Stovingen.

§ 1130.

Indien dit foort van Beenbreuken in de nabyheid der Gewrigten voorvald, en gepaart gaat met eene groote verfcheuring der Banden en Peezen, is de afzetting des Deels, onderfteld dat dezelve uit hoofde der plaats, of van eenige andere omftandigheid niet verbooden is, het zeekerst hulpmiddel. Eene zeer zorgvuldige behandeling egter, heeft sommige deezer Breuken, vooräl by jonge en gezonde Menfchen, zonder de Afzetting geneezen. De Heelmeester derhalven moet ömtrent dit ftuk nimmer met verhaasting befluiten, maar zyne keuze vestigen op eene zorgvuldige vergelyking van alle die omftandigheden, welke of deeze Konftbewerking begunftigen, of dezelve betwiften.

§ 1131.

De Kneuzingen verzellen altoos, in eenen zekeren graad, de Beenbreuken; maar zyn fomwylen zoo aanmerklyk, datze al de oplettenheid vorderen van den Heelmeester. Sluitende Verbanden moeten in dit geval vermyd, en de Breuk enkel fteunend omvangen worden van den Boekband, op dezelfde wyze als voren, met oplofende Stovingen bevogtigt. De algemeene middelen, de Aderlaating by voorbeeld, de Buikzuiveringen, verkoelende en verdunnende Geneesmiddelen

middelen, moet men hier byvoegen; en, als de Kneuzing eene groote verzaaming gemaakt heeft van Vogten, welke niet wykt voor de werking deezer Hulpmiddelen, is men genoodzaakt te besluiten tot de insnydingen. Wanneer in gevallen van deezen aart, de Spanning en Zwelling van het beleedigd Deel, buitengemeen groot zyn, is men dikmaalen verplicht de herstelling der gebrooken Beenderen tot zoo lang uit te stellen, dat dezelve merendeels geweeken, of althans genoeg vermindert zyn, om deeze bewerking, behoudens alle mooglyke vyligheid, te doen plaats grypen. In deeze zelfde omstandigheid, doet eenen stomphoekig geboogen stand der boven- en onderliggende Gewrigten veel voordeel, en moet men deeze nimmer verönnagzaam.

§ 1132.

De Bloedvliet, even als de Wonde, is van tweeërlye oorzaaken afhanglyk. Dezelfde kragt naamlyk, die het Been gebrooken heeft, kan den saamenhang verdeelen eener Slagäder: hetzelfde kan ook gebeuren door de einden der gebrooken Beenderen. In het eerste geval moet men de Bloedvliet tegen gaan voor de teregtbrenging. In het laatste is zulks somwylen niet mooglyk; en moet men eerst de uitstekende Beeneinden op hunne plaats brengen. Indien de geöpende Slagäder niet toegankelijk is voor de hand des Heelmeesters, en de Bloedvliet derhalven, langs geene der gewoone wegen kan gestuit worden, schiet 'er niets over dan de Afzetting.

§ 1133.

De slagäderlyke Vaten, by gelegenheid eener Beenbreuk geöpent, storten niet altoos hun bloed buiten het Lighaam, maar somwylen alleenlyk in de vakjes van het celwyze Weefzel. Dit geval gebeurd inzonderheid als de Huid geheel blyft, en het Vat verbrooken wordt door de einden zelve der Beenderen. Eene groote, schielyke, en van tyd tot tyd toeneemende Zwelling, zonder kenmerken van Ontsteking; de verändering van den Polsslag somwylen; en de bekende ligging des Vats, vergeleeken met de plaats der Beenbreuk, zyn in dit geval onze voornaame wegwyzers, en alleen in staat om ons over het bestaan deezer uitstorting te doen oordeelen. Het eenig hulpmiddel in deeze droevige omstandigheid is de binding van het Vat na eene voorafgaande ontblooting deszelve met het Snymes; en kan deeze geene plaats hebben, de Afzetting.

§ 1134.

Van alle mooglyke Beenbreuken, zyn 'er misfchien geene gevaarlyker, dan waarin de zelfftandigheid des Beens in kleine ftukken verbreizeld, en de zagte Deelen verscheurd zyn. In deeze omftandigheid inderdaad, is het nimmer raadzaam, langs den gewoonen weg de geneezing te beproeven, uit hoofde der zeer doodelyke toevallen welke altoos deeze Breuken opvolgen, en die men best voorkomt door eene tydige Afzetting. Is egter den Lyder onwillig om zig aan deeze Kunstbewerking te onderwerpen; of word men 'er eerst bygeroepen, wanneer reeds eenige deezer toevallen aanwezig zyn; aldan moet men de losfe Beenbrokken met alle behoedzaamheid wegneemen; de overige zoo na doenlyk, by elkander voegen; de infnydingen, die tot het een en ander noodig zyn, niet verwaarloozen; een los, balzemächtig, en bederfwearend verband aanleggen; eene gemaklyke plaatzing aan het beleedigd Deel geeven; en gebruik maaken van de Aderlaating, Buikzuivering, en van zeer fterk verkoelende, zoo wel als rustverwekkende Geneesmiddelen.

§ 1135.

Een Beenbreuk met verlies van zelfftandigheid; dat is te zeggen, waarby een meer of min merklyk gedeelte van de gantsche lengte des Beens, in zyne geheele dikte verlooren gaat; veröorzaakt in Deelen waarin maar één Been plaats heeft, eene verkorting; die hetzelfde vervolgens onbekwaam maakt tot het verrigten der werkingen, door de Natuur daaraan voorgeschreeven. Hetzelfde gebeurd in de gelykfoortige dubbele Beenbreuken van Deelen welke twee Beenderen influiten. Om dit derhalven te verhoeden, moet men, buiten den gewoonen toefstel, geduurende den gantschen tyd der behandeling, het Deel in eenen uitgestrekten ftand tragten te houden, door middel van eenige der Werktuigen, hier toe byzonderlyk uitgedagt, en die ik by eene andere gelegenheid zal aanwyzen. Men heeft naamlyk voorbeelden, waarin men op deeze wyze, en door de gunftige medewerking der Natuur, de geneezing bezorgd heeft van Beenbreuken, waar by het grootfte gedeelte van het Lighaam des Beens verlooren was, behoudens zelfs de natuurlyke lengte des Deels en deszelfs werkingen.

§ 1036.

Dit zy genoeg voor zoo veel betreft de befchouwing der Beenbreuken in het algemeen. De volgende onderdeelingen zullen een meer byzonder verflag van elk derzelve in het afgetrokkene, influiten.

§ 1137.

De Breuk der Neusbeenderen.

§ 1137.

Weinig Schryvers hebben de BREUK DER NEUSBEENDEREN, die inderdaad niet zeer zeldzaam is, met genoegzaame nauwkeurigheid beschreeven. Een ^{Fractura ossium nasi.} slag met een Degen, met een Stok, of een val op eenig uitstekend hard Lichaam, zyn derzelve meest gewoone oorzaaken.

§ 1138.

Deeze Breuken zyn *Eenvoudig*, *Meervoudig*, *Saamengesteld*, *Volkoomen*, of *Onvolkoomen*. Somwylen zyn de Neusbeenderen schuins, somwylen dwersch, en somtyds ter eener of anderer zyde gebrooken. In eenige gevallen zyn dezelve in kleine stukken verbreizeld; de Kraakbeenderen zelve van den Neus, daar van afgescheiden; het Snotvlies verscheurd; of de loodlynige plaat van het Zeefbeen tevens verbrooken. Deeze laatste omstandigheden, gelyk ook eene zeer groote schudding der Hersenen, of uitstorting van Bloed binnen de Bekkeneels holte, welke somwylen met deeze Breuken gepaart gaan, maaken dezelve dikmaalen zeer zorgelyk.

§ 1139.

Het Gezigt en Gevoel beiden, doen ons over het bestaan deezer Breuken oordeelen. Het Gezigt naamlyk wyst ons aan, of het bovenste gedeelte der Neus ingedrukt is, en het eene of andere Neusgat, naar de eene of andere zyde van het Aangezigt afwykt. Het Gevoel, geholpen door een met Linnen bekleede ingebragte Sonde, en de plaatsing des Duims en van de voorste Vinger der Linkerhand, op het buitenste gedeelte van den Neus, verschaft een vry onbedrieglyk kenmerk, door het waarneemen der verplaatsing, en van de kraaking der gebrooken Beenderen.

§ 1140.

De eenvoudige breuk der Neusbeenderen is niet gevaarlyk, en somwylen zelfs Hylzaam, door het verhinderen van de voortplanting der Schudding; de verhoeding van Ettergezwellen tuschen het Snotvlies en de Neusbeenderen; gelyk ook door het voorkomen van Uitstortingen tuschen de voorste kwabben der Hersenen, of op dat gedeelte van het harde Hersenvlies welk de binnenste oppervlakte be-

bekleed van het Zeef en Voorhoofdsbeen: toevallen allen, welken den Lyder somwylen zeer fchielyk doen omkoomen.

§ 1141.

Ter herftelling deezer Breuken, doet men den Lyder zitten op een Stoel van bekwaame hoogte, met zyn aangezigt gekeerd naar het Daglicht, terwyl zyn Hoofd rust tegen de Borft van een Helper, die agter hem ftaat, en het Voorhoofd befluit in beide zyne handpalmen. De Heelmeeftter alsdan, voor den Lyder fttaande, verzeekert zig van de plaats en Natuur der Beenbreuk; brengt de Pink zyner eene hand, een fmalle Spatel, een Hefzyzer, een ftevige pennefchagt, of een daar toe vervaardigd Stokje, met Linnen bekleed, in de Neusholte, tot aan de plaats alwaar hy de Breuk heeft waargenoomen; en drukt hier mede de ingeweeken Beenftukken voorzigtiglyk naar buiten, intuffchen dat hy tevens, met den Duim en de voorfte Vinger der andere Hand, ter zyde den Neus aangelegt, by wyze van tegenwerking, de verplaatfte Beendeelen, hunnen Natuurlyken ftand doet herneemen.

§ 1142.

Als beide Neusbeenderen, door dezelfde Oorzaak, gelyktydig gebrooken zyn, moet hetzelfde handwerk ook aan beide zyden voltrokken worden.

§ 1143.

Somwylen gebeurd het, dat 'er eene Breuk is der Neusbeenderen, zonder dat 'er eenige verplaatzing befpeurd wordt der gebrooken ftukken. Somwylen daarentegen, is 'er waarlyk verplaatzing, en geen het minfte blykbaare kenmerk van deeze. In het eerfte geval is het genoeg, den Neus te dekken met eene Drukdoek, in eenig oplofend middel bevogtigt, en gefteund door den vierhoofdigen Slingerband. In het laafte, dat altoos afhanglyk is van eene byzynde aanmerklyke kneuizing, moet men op gelyke wyze verbinden, en daar nevensgebruik maaken van de Aderlaating, Buikzuiveringen, en verkoelende Geneesmiddelen.

§ 1144.

Altoos, wanneer de Breuk gepaart gaat met eene Wonde der Bekleedzelen, en verbryzeling der Beenderen, moet men de losfe beenbrokjes voorzigtig met een tangetje wegneemen, en de overige, zoo goed doenlyk herplaatzen, om afte wagten dat de Natuur deeze hereenige, of de verëttering haar uitwerpe.

§ 1145.

§ 1145.

Na de herstelling, is het geenzints noodzaaklyk, dat 'er eenige Sondes, Steekwieken, Sponzen, Stokjes, of dergelyken, in de Neusholten gebragt worden, om de verplaatzing der herstelde Beenbrokken te beletten. Alle deeze zoogenaamde Hulpmiddelen zelfs, vergrooten eerder de Toevallen, dan datze dezelve verminderen. De eenvoudigste behandeling, is hier, gelyk in alle andere gevallen, de beste, en moet altoos verkooren worden.

§ 1146.

Van welk een soort de Breuk der Neusbeenderen ook zyn mooge, zoo dra dezelve gepaart gaat met Toevallen, welke een beleedigd Hersfengestel aanwyzen, moet men meerder zorg draagen voor deeze, dan voor de Breuk zelve. In het Leerstuk der Wonden, zyn omtrent de kenmerken en behandeling deezer beleedigingen, de meest noodwendige byzonderheden aangewezen.

De Breuk des Jukboogs.

§ 1147.

DE BREUK DES JUKBOOGS heeft dezelfde oorzaaken als andere Beenbreuken. Zy kan ook, even gelyk deezen, *Eenvoudig* zyn of *Saamengesteld*. Doorgaans worden de stukken binnenwaards ingedrukt; en dit is het noodzaaklyk gevolg van de natuurlyke plaatzing deezer Boogs. Somwylen egter gebeurd het, dat een gedeelte deszelve buitenwaards wykt, terwyl het overige zynen stand blyft inneemen.

*Fractura
arcus zygo-
matici.*

§ 1148.

De bezwaarlyke beweging der Onderkaak; eene scherpe plaatslyke Pyn; de spanning der Slaapspier; en eenige ligte Stuipagtige trekkingen in de spieren van het Aangezicht; zyn derzelve gewoone kenmerken.

§ 1149.

Gelyk byna geene Schryvers eenig gewag van deeze Breuk gemaakt hebben, en my dezelve nog nim mer is voorgekoomen, ben ik verpligt het voorstel te volgen van DUVERNYE, en ter herstelling aan te pryzen, het plaatzen van een stuk Hout, tuschen de agterste Maaltanden, en hier op de Onderkaak sterk te doen aansluiten. De uitzetting naamlyk der saamengetrokken Slaapspier, drukt in dit

K k

ge-

geval het ingeweeken gedeelte naar buiten, en steld het in de mooglykheid om te hereenigen met het andere.

§ 1150.

Een drukdoek, in Brandewyn nat gemaakt, en door eene eenvoudige Kinband verzeekerd, maakt al den toefel van het Verband. In faamengeftelde gevallen egter; dat is te zeggen, wanneer 'er eene Kneuzing of Wonde by is, moet men gebruik maaken van de algemeene middelen, gepaart met oplofende, of Balzematige aanlegzels.

*Fractura
maxilla
inferioris.*

De Breuk der Onderkaak.

§ 1151.

De Onderkaak kan gebrooken worden, by de een of ander zyner hoeken, in het middenftuk, of ter zyden. De Breuk kan zyn eenvoudig, meervoudig, fchuins, of loodlynig. Somwylen zelfs wordt dit Been, door een fchoot in kleine ftukken verbreizeld. Somwylen gaat de Breuk gepaart met eene wonde der buitenfte en binnenfte bekleedzelen, of met eene zeer groote kneuzing.

§ 1152.

Van welk eenen aart deeze Breuken ook zyn mooge, men kend dezelve aan de onderlinge verplaatzing der Tanden; aan de ongelyke oppervlakte van het Voetftuk der Onderkaak; en aan de Kraaking welke de weêrzydfche ftukken maaken, alsze door de Vingren des Heelmeesters, in eene tegengestelde ftreeklyn bewoogen worden.

§ 1153.

Eene fcherpe Pyn, verzeld dikwyls met ftuiptrekking der Lippen, en met Kwylvloed, zyn de meefl gewoone toevallen deezer Beenbreuken.

§ 1154.

Deeze Toevallen zyn meer of min gevaarlyk, naar maate de Breuk zelve eenvoudig is, of faamengefteld. Men heeft alles te dugten, ingevalle de gebrooken ftukken zeer verre van elkander zyn afgeweeken, uit hoofde der Uitreking, of ongelyke verfcheuring des onderkaakfche taks van het vyfde paar Zenuwen, die veeltyds gevolgt wordt van zeer grievende pynen, geweldige Stuiptrekkingen, en ondraaglyke Oorruifchingen. Somwylen ook, bederven in dit geval

val de Tanden, en koomen 'er zeer zwaare Oogöntstekingen niet alleen, maar ook Bloedstortingen. Het laatste Toeval is afhanglyk van de verscheuring van dien Tak der uitwendige Kaakslagäder, welke de naam draagt van *Kastak*.

§ 1155.

In de herstelling deezer Breuken, plaatst men den Lyder op dezelfde wyze, als in die der Neusbeenderen. By de Loodlynige Breuk, met weinig verplaatsing der Stukken, drukt men met den Duim der eene Hand, op de naastliggende Tanden der verhevendste zyde, en laat de overige Vingeren het Voetstuk deezes Beens afloopen, om van dien kant alle onëffenheden gelyk te maaken. In gevallen, waarin de gebrooken stukken over elkander zyn geschooten, moet 'er eene meer of min sterke uit- en tegenrekking plaats grypen. Ten dien einde, bekleed den Heelmeester, de Wysvinger zyner eene, en de beide voorste Vingeren zyner andere Hand met Linnen. Hy brengt de eerste, langs den grond der Mond, tot zoo verre agter de laatste Maaltand van die zyde welk het minst van de Breuk verwyderd is, dat ze steund tegen den Wortel van het Kroonswyze Uitwas; en drukt het zelve hier mede naar agteren. Met de twee voorste Vingeren zyner andere Hand, onder de Tong geplaatst, en den Duim deezer zelfde Hand, die hy beneden de Kin aanlegt, trekt hy ter gelyker tyd, het andere gedeelte der Onderkaak, voorwaards; en doet, zoo draa hy bespeurd, dat de stukken haare natuurlyke plaats herneemen, de Onderkaak naderen aan de Bovenkaak, dog niet meer dan genoeg is, om in 't vervolg het gebruik toe te laten van vloeibaare Voedzelen. Wanneer de Kaak in drie stukken gebrooken is, en het middenstuk, by wyze van een hellend vlak, onder de Tong verhoolen ligt; een geval, dat altoos verzeld is van verbreeking des binnenste bekleedzels van den Mond, en meestäl ook van de Huid; trekken de zydedeelen deezes Beens, van weêrskanten agter- en buitenwaards, en behoeft men slegts het middenstuk, met de twee voorste Vingeren van beide handen voorwaards om te kantelen, en somwylen iets nederwaards te drukken; zoo dat de Tandboog en het Voetstuk der gantsche Onderkaak, van de eene zyde tot de andere, twee volmaakte, of nagenoeg evenwydige Lynen maaken.

§ 1156.

Na de herstelling van 't eene en andere geval, wordt eene langwerpige dubbele drukdoek, van het eene einde, tot omtrent derzelver midden ingesneden, en in Brandewyn nat gemaakt, aangelegt. Men overdekt deeze, met eene andere die

dikker is, of met een Bordpapieren spalk, naa de gedaante der Kaak gesneden en geboogen, en den Band van SORANUS.

§ 1157.

Het kauwen, spreken, en Lagchen, zyn alle beweegingen welke moeten verboden worden. Den Lyder moet zoo veel mooglyk zy, alle gelegenheden hier toe benoomen worden, en niet leeven dan van vloeibaare Voedzelen.

§ 1158.

Wanneer de Breuk eenigerhanden toevallen verwekt heeft, moet men de noodige hulpmiddelen daar voor aanwenden. Als 'er Tandén uit haare Kasfen geschooten zyn, kan men dezelve daar weder inzetten, en de hereeniging daar van, aan de Natuur beveelen. Indien de gebrooken stukken zoo los zyn dat dezelve door het Verband alleen niet genoeg kunnen gesteund worden, is het goed de overeenstemmende Tandén aan elkander te verbinden met een Zilveren of gouden draad en dergelyken.

§ 1159.

Beenbreuken van deeze foort, gepaart met eene wonde van het binnenste der Mond, vorderen eene byzondere oplettenheid in de behandeling. De Wond naamlyk, moet tweemaalén daags verbonden worden met plukzel, nat gemaakt in een mengzel van witte Wyn en Roozenhoonig; en dit overdekt men met eenige kleine stukjes fyne Spons, die, zoo draaze met Speekzel doordrongen zyn, van anderen worden afgewisfeld.

De Breuk van het Sleutelbeen.

§ 1160.

*Fraçtura
clavicula.*

Als het Sleutelbeen gebrooken is, bespeurd men altoos eene merklyke verplaatsing der stukken. Het foort onderscheidend kenmerk deezer Breuk is, dat de Arm op de Borst vald, de Onderärm naar vooren schiet en vooröver kanteld, en de Lyder, of weinig, of geheel geene magt heeft om zynen Arm op te ligten.

§ 1061.

De herstelling deezer Breuk is gemaklyk, vooräl in magere Onderwerpen; maar het is moeilyk de herstelde stukken op hunne plaats te houden. De reeden hier van

van is, de dunheid van het Been, de onmooglykheid om de plaats der Breuk met een Verband te omvangen, en de werking van de zwaarte des Arms, die altoos tragt om het buitenste deezer stukken te verplaatzen.

§ 1162.

Ter herstelling van het gebrooken Sleutelbeen, doet men den Lyder op eene laage Stoel zonder Rugleuning, of op een Bank, nederzitten. Een Helper, agter hem staande, zet een zyner Kniën op eene tusschen gelegde Drukdoek, tegen den Ruggraat, tusschen de onderhoeken der Schouderbladen, en omvat met de een en ander zyner Handen de beide gewrigten der schouderen. Het is deeze Helper, die gelyktydig de uittrekking en tegentrekking doet, door de Schouders naar agteren te trekken, op hetzelfde Oogenblik, als hy het Lighaam voorwaards drukt. De Heelmeeester, die voor den Lyder staat, bespeurende de genoegzaamheid der uittrekking, brengt door middel zyner Vingeren de einden des gebrooken Beens tegen elkanderen, en doet dezelve dus bevestigen door een ander Helper, terwyl de eerste alles in dezelfde staat van rekking blijft houden, en hy zig gereed maakt tot den aanleg van het Verband.

§ 1163.

Dit Verband bestaat uit eene zekere hoeveelheid Plukzel, gelegd boven en beneden het Sleutelbeen, ter opvulling der daar zynde holten; uit twee langwerpige en eenigzints dikke Drukdoeken, ter zelfder plaatze aangelegt; uit een grooter Drukdoek, welke al het vorige overdekt; uit het *nederdaalend Koornair-Verband* ter bepaaling van den gantschen toefstel; en uit het *Verband van BRASDOR*, ter weerhouding der agterwaards gebragte Schouderen.

§ 1164.

Om te beter het herstelde te bevestigen, en de nadeelige werking der Zwaarte van den overéénstemmenden Arm te verhoeden, moet de Onderärm, dermaaten in den Armband geplaatst worden, dat dezelve geboogen is, en de Elboog naar vooren ziet; en niet, gelyk meest altoos de gewoonte is, naar agteren.

De Breuk des Schouderblads.

§ 1165.

Het Schouderblad, hoe zeer ook door verscheiden Spiëren beschermd, is egter

vatbaar voor Beenbreuken. De gemeenste zyn, die van deszelfs Lighaam, van zynen graat, en van den Opperschouder. Het Ravenbekswyze Uitsteekzel, en de Hals des Schouderblads, worden bezwaarlyk gebrooken; en men kan 'er zelfs byvoegen, nauwlyks anders dan door de werking eener zeer saamengestelde Oorzaak.

§ 1166.

Het Lighaam des Schouderblads, kan in verscheiden stukken van verschillende gedaanten breeken, zonder eenige merkbaare verplaatzing. Dus is het ook gelegen met de dwersche Breuk van deszelfs Graat; waarin de stukken op geenerlye wyze van elkander kunnen wyken, uit hoofde van derzelver groote oppervlakte.

§ 1167.

By de geheele afbreeking integendeel van den bovenhoek deezes Beens, gebeurd altoos verplaatzing, en wordt het bovenste stuk van het andere afgetrokken, door de werking alleen van de eigen Opligter des Schouderblads. Hetzelfde is somwylen waar, met betrekking tot de Breuk des Opperschouders, waar van het uiterste stuk eenigermate naar beneden kan verplaatst worden, zoo door de natuurlyke zwaarte van den Arm, als door de inkorting dier vleeschbundels van de Driepuntige Armspier, welke aan dit einde zyn vast gehegt.

§ 1168.

De kennis van alle deeze soorten van Beenbreuken is doorgaans vry moeilyk, uit hoofde der meestäl daar by zynde Zwelling, Kneuzing, en Uitstorting. Het onbedrieglykst kenmerk is de kraaking: dog om deeze te bespeuren, moet de Arm op verschillende wyzen bewoogen, en ter gelyker tyd, de gantsche oppervlakte des Schouderblads, nauwkeurig met de Vingeren onderzocht worden.

§ 1169.

Het is niet gemaklyk, de herstelling te doen deezer Breuken, ingevalle de stukken eene merklyke verplaatzing ondergaan hebben; om reeden dat het Schouderblad bedeed is met zeer sterke Spieren, en men bezwaarlyk de noodige uitrekkingen kan te werk stellen.

§ 1170.

Om egter hier in zoo veel mooglyk zy te slaagen, doet men den Arm des Lyders tot zoo verre opligten, dat de hand op het Hoofd ligt, en de Neus zig bevind

vind tegen over den vouw des Elboogs. Een Helper, bevestigt dezelve in deezen stand, inmiddels dat den Heelmeester alle poogingen te werk stelt, om de gebrooken stukken met zyne Vingeren saamen te voegen. In de Breuken ook van den Opperschouder, verslapt men de driepuntige Armspier, door het opligten van den Arm; en men brengt de toppen der Vingeren, zoo ver als doenlyk is, onder de vereeniging des opperschouders met het sleutelbeen; of wel, men stoot het Oppersarmbeen loodlynig naar boven, om door het hoofd zelve van dit Been, het afgebrooken stuk te herstellen.

§ 1171.

Zoo dra de herstelling der Breuken van het Lighaam des Schouderblads, van den graat, of van den Bovenhoek dezes Beens verrigt is, bevestigt men de herstelde stukken met de Handen, terwyl een Helper de Arm voorzigtiglyk naar beneden brengt, en zynen natuurlyken stand doet herneemen. Op de gantsche uitgestrektheid van het Schouderblad legt men een dikke drukdoek, van gelyke grootte en gedaante als het Deel zelve; in eenig oplosfend geneesmiddel nat gemaakt. Men overdekt deeze met een stuk Bordpapier, van grootte als de Drukdoek, en in een zelfde middel bevogtigt, om zig te beter te kunnen voegen naar de gedaante van het Schouderblad. Dit Bordpapier moet bedekt worden met eene vierkante Drukdoek; en den gantschen toestel beslooten met het *Verband des Lighaams* en den *Schouderband*, of het *Sterverband*. Men brengt vervolgens de Arm, zoo dicht aan de Ribben als mooglyk is, en ondersteund dezelve door den Armband.

§ 1172.

In de Breuken van den Opperschouder, van het Ravenbekswyze uitsteekzel, en van den hals des Schouderblads, verschilt het Verband eenigermate van het vorige. De Schouder naamlyk, wordt in deeze gevallen gedekt met het *Koornair-Verband*, en de Arm meer opwaards geschoord door voorgemelde Armband.

§ 1173.

By alle Breuken van het Schouderblad, moeten de Aderlaatingen, naar eischer omstandigheden, meer of minder herhaald worden. De eetregel, moet matig zyn; zoo ten opzigte der hoeveelheid, als van de hoedaanigheid der Voedzellen; en meer overhellen naar het schraale dan naar het ruime. Eene volstrekterust van den overéénstemmende Arm daarënboven, moet met de grootste zorgvuldigheid in agt genomen worden.

De

*Fractura
offis hume-
ri.*

De Breuk van het Opper-Armbeen.

§ 1174.

Het Opperarmbeen kan gebrooken worden aan zyn bovenste gedeelte, in het midden, en in zyn onderste uiteinde. De Breuk kan eenvoudig zyn, of saamgesteld; en met veel of weinig verplaatzing der gebrooken stukken.

§ 1175.

Men verzeekerd zig van het een en ander, door de gewoone Kenmerken, en regeld hier na de Behandeling.

§ 1176.

Ter herstelling doet men den Lyder zitten op eene Stoel van bekwaame hoogte, en plaatst agter denzelven een Helper, die het bovenste gedeelte omvat van den Opperarm, met beide zyne handen. Den Heelmeeester zelve ondersteund met zyne Handen de gebrooken einden van het Armbeen, en doet ter gelyker tyd, den Arm tot zoo verre opligten, datze met het Lighaam, een hoek maakt van veertig graden. Een tweede Helper, die de Hand omvat van den Lyder, ondersteund hier door deszelfs Onderarm, die stomphoekig moet geboogen zyn. Een derde eindelyk, den Opperarm omvattende, onmiddelyk boven het Gewrigt des Voorarms, doet als dan gelyktydig met den eersten Helper, de noodige uitrekkingen. Zoo draa deeze tot zoo verre geslaagd zyn, dat de gebrooken einden elkander niet meerder raaken, worden dezelve te regt gebragt door de Heelmeeester zelve, die hier toe beide stukken in eene tegengestelde rigting beweegt, en dus juist aan elkander voegt als mooglyk is. Staande deeze teregtbrenging moeten de genen aan wien de rekking is toevertrouwd, zagtelyk, en gelykmatig toegeeven, op dat de over elkander gestelde Beenëinden, zig onderling kunnen aanraaken.

§ 1177.

Het Verband is verschillend naar de verscheidenheid zelve van de Beenbreuk, en het onderscheid der plaats welke deeze inneemt.

§ 1178.

In de eenvoudige Breuk van het Lighaam des Armbeens, omvangt men de plaats der Beenbreuk met eene enkele kringwyze Drukdoek van genoegzaame lengte

lengte en breedte, in Brandewyn, of Water en Azyn nat gemaakt. Een Windzel van twee Vingeren breedte, en omtrent vier Ellen lengte, wordt als dan met drie kringswyze omgangen, welke elkander nauwkeurig bedekken, ter plaatze van de Breuk aangelegt; en met krulwyze slagen geleid naar boven. Op dezelfde wyze, en met een zelfde Windzel, maakt men weder, ter plaatze van de Breuk, drie kringswyze omgangen, en vervolgt naar beneden met krulwyze. Beide deeze Windzels bedekt men vervolgens met drie Bordpapieren of Spaanen Spalken, van binnen bekleed met maatig dikke Drukdoeken, in lengte gelyk aan den Operärm, en wier breedte zoo is ingerigt, datze dit Deel van alle zyden als in een kooker influiten. Deeze Spalken kan men of met een derde Windzel, of met drie linden Banden bevestigen.

§ 1179.

In de faamengestelde Breuken van hetzelfde gedeelte deezes Beens, gelyk ook in allerlye Breuken van deszelfs bovenste en onderste Uitëinden, moet men eerst eene enkele gespleeten Drukdoek, en over deeze, den Boekband aanleggen. In die van het bovenste Uitëinde, vult men alvorens de holte des Oxels op met Vlas, Plukzel, of een Spons; doet de buitenste Spalk over den Schoudertop heen gaan, en bevestigt den gantschen toestel met den *Koornair*. Deeze Breuken naamlyk, hoe nauwkeurig ook hersteld, zyn ligt onderhevig aan verplaatsing, en moeten om deeze reeden, meer dan de overige bezorgd worden. Als de Breuk is in de nabyheid van het Gewrigt des Voorärms, moet men den Boekband steunen met twee stukken Bordpapier, gesneden, en, na voorgaande bevoegtiging geboogen, naar de gedaante van het gewrigt in den stand eener stomp. hoekige buiging, en van het Verband voor de Aderlaating.

§ 1180.

In alle deeze gevallen, word de Onderärm geplaatst in een Sjerp, die zoo kort als mooglyk is zyn moet in de minst schuinze Beenbreuken, en langer in de genen welke zulks meerder zyn. Men verhindert op allerlye wyzen de beweeging des Arms ter zyden, om de verplaatsing der herstelde stukken te verhoeden.

De Breuk van de Beenderen des Voorärms.

§ 1181.

*Fractura
Antibrachii*

De Beenderen van den Voorärm, kunnen elk op zig zelve, of beide te gelyk
L 1 gebroo.

gebrooken worden, en deeze Breuken, zyn in het eerfte Geval moeilyker te kennen dan in het laafte.

§ 1182.

Die der groote Ellepyp egter, zyn gemaklyker te onderscheiden dan die der kleine, om dat deeze met meerder Spieren gedekt is dan gene.

§ 1183.

Om zig te verzeekeren van de Breuk der kleine Ellepyp, omvat men met de eene Hand het bovenfte gedeelte des Onderärms, terwylmen met de andere, de Hand des Lyders weêrkeurig beweegd naar de zyde der Voor- en Agteröver-kanteling. Indien men, ftaande deeze bewegingen befpeurd dat de kleine Ellepyp weêrftand bied aan de Hand die deszelfs bovenfte gedeelte vaft houd, kan men verzeekeren dat dezelve geheel is. Zy is integendeel gebrooken, als men deeze tegenftand niet waarneemt, en het geluid befpeurd, veröorzaakt door de wryving der gebrooken ftukken op elkander.

§ 1184.

Van welk eenen aart de breuken van de Beenderen des Onderärms ook zyn moogen, zy geneezen nauwlyks anders dan met verlies der voor- en agteröverkanteling van de Hand. Deeze byzonderheid moet den Heelmeester altoos in 't oog houden, en hier na zyne voorzegging inrigten.

§ 1185.

Gelyk deeze Breuken enkel of meervoudig, en met of zonder merklyke verplaatzing der gebrooken ftukken kunnen zyn, is 'er eenig verfchil in derzelver behandeling, vooräl met betrekking tot de uit en tegenrekkingen.

§ 1186.

Als de kleine Ellepyp alleen gebrooken is, en, gelyk doorgaans gebeurd, de ftukken geweeken zyn naar de groote, doet de Heelmeester de hand des Lyders wippen naar de zyde van den Pink, om het benedenfte deel der kleine Ellepyp op te ligten, en drukt zelfs met het vlak zyner handen, geplaatst in de nabylheid van de Breuk, de buitenfte oppervlakte des onderärms. De fpiere naamlyk van beide deeze oppervlakten, dus genoodzaakt om zig te plaatzen tusfchen de beide Ellepypen, dryven het ingeweeken gedeelte des Beens naar buiten, en herftellen op deeze wyze de Beenbreuk.

§ 1187.

§ 1187.

Als de groote Ellepyp alleen gebrooken is, en de kleine geheel blyft, wordt de hand gewipt naar de zyde van den Duim; en de Spieren des onderärms op dezelfde wyze geperst tusfchen de beide Beenderen.

§ 1188.

In de meervoudige Breuk deezer Beenderen, dat is te zeggen, alsze beide gebrooken zyn, moeten de uit en tegenrekkingen aan de ftrekking van den Onderarm zelve beantwoorden. Ten deezen einde wordt de Voorarm en Hand geboogen; en het eerfte deezer Deelen tegen gehouden door een Helper, terwyl een ander, met meer of minder kragt de uitrekking doet, onmiddelyk boven het Gewrigt van de Voorhand. De herftelling gefchied op voorbefchreeven wyze, door den Heelmeester zelve.

§ 1189.

Schoon men ter behandeling deezer drie gevallen, even zoo veele verfchillende Verbanden heeft aangepreezen, is deeze zeer eenvoudige toefstel genoegzaam. Men omvat naamlyk den Onderarm ter plaatze van de Breuk met eene gefpleeten drukdoek, in warme Brandewyn, of Water en Azyn nat gemaakt. Aan de binnen en buiten zyde van dit Deel, worden aldan gelegd twee zeer dikke drukdoeken, welke met deszelfs lengte overëenkoomen, dog niet veel breeder zyn, dan de onderlinge afftand is der beide Beenderen. Men plaatst op elk deezer drukdoeken een Spaanen of dikke Bordpapieren Spalk, in lengte gelyk aan den Onderarm, maar een weinig breeder dan deeze. Dit alles word eindelyk bevestigd met een Windzel, lang genoeg om den Onderarm tevens en de Hand te bewinden, in welks holte men te vooren eene vierkante drukdoek geplaatst heeft, en wier Vingeren ten halven geboogen zyn.

§ 1190.

Het Deel wordt na dit alles, indiervoegen geplaatst in den Armband, dat de Arm, nog te veel, nog te weinig geboogen is, en de Hand eenen ftand heeft, even zoo veel hellende naar de voor- als agterover-kanteling.

De Breuk van het Elleboogs uitsteekzel.

*Fractura
olecrani.*

§ 1191.

Het *Elleboogs uitsteekzel* wordt doorgaans dwersch gebrooken, en in dit geval

trekken de uitstrekkende Spieren des Onderärms, het bovenste stuk meer of minder opwaards, en doen hetzelfde naar evenreedigheid afwyken van het onderste.

§ 1192.

Deeze Breuk, alsze niet verzeld gaat met eene groote kneuzing en zwelling, gelyk veelyds het geval is, laat zig zeer gemaklyk onderscheiden, en gaat altoos gepaart met eene belemmerde uitstrekking des Onderärms.

§ 1193.

In de behandeling koomen nog uitrekkingen te pas, nog tegenrekkingen; men moet enkel het opgetrokken stuk met de Vingeren doen naderen tot het andere, en het in zyne plaats bevestigen door een dikke, smalle, en kringswyze drukdoek, onmiddelyk boven hetzelfde aangelegt, en het verband voor de Aderlaating.

§ 1194.

De herééniging der gebrooken Beendeelen, behoort in dit geval het Oogmerk niet te zyn des Heelmeefters, maar alleen de inkrimping van het peesächtig uitbreidzel der driehoofdige Armspier, 't welk veeläl gedeeltelyk gebrooken, gedeeltelyk uitgerek is.

§ 1195.

Het is ter beryking van dit Oogmerk, dat men geduurende de eerste veertien Dagen, den Lyder veroordeeld het Bed te houden, en zyne uitgestrekte Arm te leggen op een Kussen, met de Hand een weinig hooger dan de Elboog.

§ 1196.

Na verloop van deezen Tyd, en als het gezegde uitbreidzel genoeg is ingekrompen, buigd men zagtelyk den Elboog; en kan men zelfs den Lyder eenige ligte beweegingen toelaaten. Het voorgemelde Verband intusschen, wordt agtervolgd tot de volkoomen Geneezing zyn beslag heeft; dat is te zeggen, tot dat het peesächtig Uitbreidzel der driehoofdige Spier, zyne Veerkragt genoeg herkreegen heeft, om aan de werking te weêrstaan van derzelver Vleeschächtig gedeelte.

§ 1197.

In die Breuken van dit Beendeel, welke met eene zwaare Kneuzing, Wyeächtige Uitstorting, of aanmerklyke Bloedvlek vergezeld zyn, moet men zig bedienen van

van den Boekband, gestadig nat gehouden met eene sterke smelting van het *Ammoniak Zout* in Azyn en Water, of met den *Geest van Minder*, in eene zekere maate vermengt met het laaste. Zoo draa deeze toevallen geweeken zyn, en niet eerder, kan men in dit geval van de te vooren beschreeven behandeling gebruik maaken.

De Breuk der Beenderen van de Voorhand, der Nahand, en der Vingeren.

§ 1198.

DE BREUK DER BEENDEREN VAN DE VOORHAND, geschied zeldzaam, dan door zeer zwaare kneuzende Werktuigen, of Schietgeweer; en in beide deeze gevallen behoord de Breuk doorgaans tot de Klasse der Verbryzeling, en word ligtelyk gevolgt van Ontsteking, Verzweering, Beenbederf, of Versterving. In deeze droevige omstandigheden, is de Afzetting het eenig hulpmiddel. Indien men nogthans reeden meend te hebben, om een gunstiger uitslag te vermoeden, 't zy uit hoofde der Jaaren en gesteltheid des Lyders, 't zy uit aanmerking van den graad der beleediging, hersteld men de gebrooken Beenderen zoo goed als doenlyk is, en gaat de dreigende Toevallen te keer door de Aderlaating, de Levenswys, en Verkoelende Geneesmiddelen. Aan de Hand zelve wordt eene gemaklyke, en verzeekerde plaatsing gegeven; en men Verbind met oplofende, verslappende, en pynstillende Plaatsmiddelen.

*Fractura
osium
carpi.*

§ 1199.

DE BREUKEN DER NAHANDSBEENDEREN, worden by magere Menschen gemaklyk gekend, hersteld, en bevestigd. By Vetten sluit het een en ander eenige zwaarigheden in, uit hoofde der Kneuzing en Opzwellling van het Vetvlies. In het eerste geval brengt men de Hand in zulk eenen stand, datze geenerlye beweegingen aan de gebrooken Beenderen toelaat; en de volkoomen heeling wordt in eenen zeer korten tyd voltrokken. In het laaste, voorziet men eerst in de plaatslyke wanördes van het Vetvlies, door de Aderlaating, Eetregel, en oplofende aanlegzels, en behandelt naderhand de Beenbreuk op dezelfde wyze als vooren.

*Fractura
osium me-
tacarpi.*

§ 1200.

Wat belangt de BREUK VAN DE KOOTJES DER VINGEREN; deeze word even gemaklyk gekend, hersteld, en bevestigd als die van de Nahandsbeenderen.

*Fractura
phalangum
manus,*

Die van den Duim alleenlyk, vorderen eenige meerdere oplettenheid; om dat dit Deel, het voornaamste is van de Hand, en veröndent tot de meeste beweegingen. In de eerste deezer Breuken, omwind men den Vinger met een enkel Drukdoekje, in eenig geeftryk Vogt nat gemaakt: aan de binnen en buitenzyde derzelve legt men eene langwerpige Drukdoek, overdekt met een gelyk stukje Bordpapier: men besluit eindelyk alles met een smal Windzel; houd alle Vingeren in eene flauw geboogen gestalte; en ondersteund de Hand door den Armband. In het tweede Geval moet men in agt neemen, dat de Duim, naa de teregtbrenging, niet te verre af gebragt wordt van de Vingeren. Hy moet meer geboogen zyn dan uitgestrekt. Anders verschild den toefstel niet van die der andere Vingeren. Het Verband moet een *Koornair* zyn, en het Windzel een duim breedte hebben. De Hand wordt geplaatst in den Armband; en men doet eene volstrekte rust in agt neemen.

§ 1201.

Alle Beenbreuken der Vingeren hebben dit byzonders, datze, hoe saamengesteld zy ook zyn moogen, in de meeste gevallen, door eene oplettende behandeling zeer wel geneezen worden. Ik verzeekere zulks by ondervinding, en kan niet genoeg aandringen op het neemen van zorgvuldige Proeven ten deezen opzigte.

De Breuk van het Borstbeen.

§ 1202.

*FRACTURA
sterni.*

De BREUK VAN HET BORSTBEEN gaat doorgaans gepaart met indrukking der gebrooken stukken. Derzelve gewoone Toevallen zyn Pyn, die zig by de inademing verheft, Hoest, Bloedspuwing, Braaking, Hartklopping, en eene uitstorting van Bloed in het Middenschot.

§ 1203.

Men kan hier uit het gevaar deezer Breuken afleiden, en reeden geeven waarom dezelve zoo dikmaalen van den Dood agtervolgt worden.

§ 1204.

Het algemeen gevoelen der Heelkundigen wil, dat men de herstelling beproeve door eene zydelingsche drukking op de Ribben; en zoo dit niet voldoende is, door de ingedrukte stukken op te ligten met een Hefzyzer, na dat men alvorens het Been ontbloot heeft door eene insnyding.

§ 1205.

§ 1205.

Het Verband is eenvoudig, en bestaat, buiten de behandeling der gedaane in-
fnyding, uit twee vierkante drukdoeken in Brandewyn bevoigt, een Servet,
en den Schouderband.

§ 1206.

Men moet de toevallen verhoeden door de Aderlaating, Buikzuiveringen,
en verkoelende Geneesmiddelen; en altoos indagtig zyn het dreigend gevaar des
Levens, om niet door eene te gunstige voorzegging, zyne eigen eer, en die der
Heelkunde te benadeelen.

§ 1207.

Het kan gebeuren, dat de gebrooken en ingedrukte stukken van het Borst-
been, zoo weinig ruimte tusfchen elkanderen overlaaten, dat men 'er geen Hef-
zyzer kan inbrengen om dezelve op te ligten. In dit geval beproefd men de her-
ftelling door behulp van den Bodemtrekker; of men fteld een Trepaankroon op
het vaste gedeelte des Beens, in de nabyheid van de Breuk, en bediend zig van
de hier door gemaakte opening, ter inbrenging van het Hefzyzer.

§ 1208.

Van eene zelfde doorbooring des Borstbeens, willen de Schryvers dat men ook
gebruik maake, als men vermoed, dat de Breuk verzeld is van eene Uitftorting
in het Middenschot. Het voorftel is niet onaanneemlyk; dog kan alleen gevolgt
worden van Heelmeefters, kundig genoeg om de toevallen deezer Uitftorting, te
onderscheiden van die der Borstholten.

De Breuk der Ribben.

§ 1209.

De BREUK DER RIBBEN, is niet zeldzaam, en gefchied altoos op tweeder-
lye wyzen. De einden naamlyk der gebrooken Ribben, wyken of inwaards naar *Fractura*
de zyde der Borstholte, of Uitwaards naar de zyde der Bekleedzelen. In het *costarum.*
eerfte geval, wordt het eene *inwaardsche*, in het laafte, eene *uitwaardsche* Breuk
geheeten.

§ 1210.

Wanneer de gebrooken einden wyken naar de zyde van de Borstholte, is de
Breuk

Breuk afhanglyk van eene kragt, regtstreeks werkende op de plaats zelve van deeze. Alsze integendeel geweeken zyn naar den kant der Bekleedzelen, worden altoos de twee einden der Ribben naar elkanderen gedrukt door Oorzaaken, gedeeltelyk werkende op het Borstbeen, gedeeltelyk op de Ruggraat. Zelden echter, is de een en ander deezer verplaatsingen aanmerklyk, uit hoofde der Boogwyze gedaante van de Ribben, en de verééniging deezer met het Borstbeen en de Rugwervelen.

§ 1211.

Alle Ribben zonder onderscheid, worden niet even gemaklyk gebrooken. De eerste waare by voorbeeld, en de laatste Onwaare Ribben, breeken zeer zeldzaam. De eerste, om datze beschermd worden door het Sleutelbeen; de laatste, om datze dryvend zyn, en hieröm wyken voor de daar op werkende beleedigende Vermogens. Van de overige worden geene ligter gebrooken dan de waare, om datze tusschen twee vaste punten inliggen; en van vooren weêrhouden worden door het Borstbeen, van agteren door de Rugwervelen. Somwylen wordt niet meer dan eene enkele Rib gebrooken; somwylen breeken 'er twee, drie, vier, of meerder.

§ 1212.

De kenmerken deezer Breuken, zyn de ongelykheid van oppervlakte, de kraaking, de pyn, en eene bezwaarde Ademhaaling. De twee laatste verschynzelen, zyn het minst blykbaar in de uitwaardsche Breuken, om dat alsdan de gebrooken einden geene prikkeling van het Borstvlies veröorzaaken.

§ 1213.

Gelyk de Verplaatzing, zoo is ook de ongelykheid van oppervlakte doorgaans van weinig aanbelang. Wat de kraaking betreft, deeze moet men niet verweren met de lugtgolving, afhanglyk somwylen van eene enkele kneuzing der zagte Deelen.

§ 1214.

De Voorzegging deezer Breuken is verschillend, naar de verscheidenheid zelve van deeze. De Inwaardsche by voorbeeld, is gevaarlyker dan de Uitwaardsche. Die welke verzeld zyn met hevige Pynen, en moeilyke Ademhaaling, of, wanneer 'er Beenschilfers zyn, welke de tusschenribbige Zenuwen beleedigen, of de Vaten openen onder denzelfden naam bekend, zyn de gevaarlykste van allen.

§ 1215.

§ 1215.

In de herstelling moet men het foort der Breuk wel in agt neemen, en hier na zyne behandeling inrigten. Als de gebrooken einden der Ribben naar binnen ge-weeken zyn, moet men op eene tegengestelde wyze te werk gaan, als de werking geweest is der oorzaak; dat is te zeggen, men moet met beide zyne Handen het voorste en agterste einde der Ribben tot elkanderen drukken, om het ingewee-kene naar buiten, en in een zelfde vlak te brengen met de overige Ribben. In de buitenwaardsche Breuk integendeel, moet men de stukken naar binnen pers-schen, tot zy haaren natuurlyken stand hernoomen hebben; dog hier by wel agt geeven, dat deeze drukking niet geschiede op de plaats zelve van de Breuk, maar ter zyden, om door de kwetzing der spieren en van andere Deelen, geene toe-vallen te veröorzaaken. In dat foort deezer Breuken eindelyk, waar by geheel geene, of immers geene merkbare verplaatzing bespeurd wordt, is alles wat on-der den naam van herstelling voorkoomt, noodloos en schadelyk.

§ 1216.

Het Verband in alle deeze gevallen, bestaat in eene groote vierkante Drukdoek, in eenig geeftryk Vogt nat gemaakt, en gelegd op de plaats zelve van de Breuk. Twee andere Drukdoeken, agt dwersche Vingeren lang, drie breed, en een Duim dik, worden in de buitenwaardsche Breuk deezer Beenderen, gelegd aan weërzyde van de gebrooken einden; en in de inwaardsche, by het Borstbeen, en de Rugwervelen. Dit alles wordt op zyne plaats gehouden door het *Verband des Lighaams*, en den *Schouderband*.

§ 1217.

De Lyder wordt vervolgens, naar eisch der byzynde toevallige omstandighe-den, eens of meermaalen adergelaaten, en onderworpen aan eene strenge Leef-regel. Hy moet in eene half zittende gestalte het Bedde houden, en zig van veel spreekken, lagchen, en andere dergelyke beweegingen onthouden. Men kan hier byvoegen, dat de Buik, van tyd tot tyd, moet ontleedigd worden door zag-te Klyfsteeren; de byzynde Hoest gestild door olie en slymägtige Geneesmiddelen; en het Verband niet veränderd worden, voor het van zelve los gaat, of den Zie-ken eenig ongemak veröorzaakt.

§ 1218.

Wanneer, by gelegenheid deezer Breuken, het Borstvlies gekwetst, of eenige

M m

tus-

tusfchenribbige Slagäder geöpent is, en het Bloed wordt uitgestort in de Borstholte, moet men ter plaatze van de Beenbreuk, eene opening maaken die tot in deeze zelfde holte doorgaat, en de Bloedvliet te keer gaan op de best mooglyke wyze. Dit geval egter is zorgelyk, en in de nabyheid van den Ruggraat, doodelyk.

*Fractura
vertebra-
rum.*

De Breuk der Wervelbeenderen.

§ 1219.

Wanneer na een val, of eenigerlye andere belediging, eene bepaalde en scherpe Pyn gevoeld wordt ter eene of andere plaatze van den Ruggraat, en men door het drukken der Vingeren eene kraaking of verplaatzing bespeurd van Beenbrokken, is men zeeker van de *Breuk der Wervelbeenderen*.

§ 1220.

Het is egter nauwlyks mooglyk, eenige andere deezer Breuken te ontdekken dan die van de Graatägtige uitsteekzels, om dat deeze alleenlyk vatbaar zyn voor het onderzoek der Zintuigen. Het bestaan derzulken welke het Lighaam der Wervelen inneemen, tekend niet dan door eene geschonden of geheel vernietigde beweging der Deelen onder de beledigde plaats gelegen, of door bykoomende Stuiptrekkingen, onwillige ontlastingen van de Pis en Afgang, derzelver belet- te uitloozingen, en meer andere Toevallen van een beledigd Rugmerg.

§ 1221.

De teregtbrenging van de eerste deezer Breuken, geschied alleen, en zonder hulp van uitrekkingen, door de Vingeren des Heelmeesters. Men bevestigt het herstelde, door eene Drukdoek in warme Brandewyn bevogtigt; door twee andere dikke en smalle Drukdoekjes, gelegd aan weêrzyden van het gebrooken Uitwas; en door het *Verband des Lighaams* met den *Schouderband*. De herstelling der laaften is niet minder nutloos dan bezwaarlyk. De verscheuring des Rugmergs hier by tegenwoordig, maakt dezelve vroeg of laat doodelyk.

*Fractura
osfisacriæ
coccygis.*

De Breuk van het Hylig en Staartbeen.

§ 1222.

Het Hyligbeen kan gebrooken worden in zyn bovenste gedeelte, of in de na-
by-

byheid van deszelfs vereeniging met het Staartbeen. Beide deeze Breuken zyn doorgaans verzeld van aanmerklyke toevallen, en kunnen verschriklyke Verzwelingen in het Vetvlies van het Bekken veroorzaaken.

§ 1223.

In het eerste geval; dat is te zeggen, als de Breuk zig bevindt aan het bovenste des Hyligbeens, moet men de stukken zoo veel mooglyk zy, met de Vingeren te regt brengen, en door eene driekante Drukdoek, van een *T verband* gesteund, bevestigen. In het tweede geval brengt men de voorste Vinger der eene Hand, met Olie besmeerd, in den Endeldarm, en drukt hier mede, het ingeweeken gedeelte naar buiten; terwyl de andere Hand, aangelegt op de agterste oppervlakte deezes Beens, de gescheiden stukken, zoo nauwkeurig als mooglyk is by een voegd. Men bevestigt de herstelde Beendeelen door eene driekante Drukdoek, en het *T verband*; en laat den Lyder, geduurende de eerste 14 Dagen, op de eene en andere zyde, by verwisseling het Bedde houden; of als hy verkiest somwylen op te zitten, gebruik maaken van een Stoel met eene doorgaate zitting, ten einde 'er geene drukking geschiede op de Beenbreuk.

§ 1224.

In de *Breuk van het Staartbeen*, die geene mindere toevallen naar zig sleept dan de voorgaande, is de behandeling volmaakt gelyk aan die van het onderste des Hyligbeens, en moet ook het Verband op gelyke wyze worden aangelegt.

§ 1225.

By alle deeze Breuken zonder onderscheid, voorkomt men de Toevallen, door de Aderlaating en Levenswys; men bezorgt eene gemaklyke ontlasting der uitwerpzelen door Klyfsteeren; en voorziet in de plaatslyke Toevallen, door Oplosfende, en Geestryke Hulpmiddelen.

De Breuk der Heupbeenderen.

§ 1226.

DE BREUK DER HEUPBEENDEREN valt zeldzaam voor, dan ingevolge de treffing van eenig Schietgeweer; en is alsdan saamengesteld met eene Wonde. *Fractura ossium ilii.* Zy geschied op verscheidenerlye wyzen, dat is te zeggen in de Loodlyn, dwersch, M m 2 schuins

fchuins, en dergelyke. In het tweede geval wordt fomwylen het bovenste stuk opwaards getrokken, door de werking inzonderheid der Buikspieren.

§ 1227.

Gelyk de Zwelling in deeze gevallen altoos zeer aanmerklyk is, kan men de Breuk zelve zeer bezwaarlyk kennen. Deeze Zwelling is daar van afhanglyk, dat de Oorzaak welke de Breuk voortbrengt, altoos groot genoeg is om tevens eene zwaare Kneuzing te maaken in de Spieren, Vliezen, en peesagtige Uitbreidzels, welke hier in een groot aantal tegenwoordig zyn.

§ 1228.

De toevallen deezer Beenbreuken, zyn buiten de plaatslyke pyn, kneuzing en verscheuring der zachte Deelen, de Spanning, Ontsteking, en verharding des Onderbuiks, Hardlyvigheid, Buikpynen, Opstopping van de Pis, Braakingen en dergelyken. Men begrypt dat alle deeze Toevallen dringend zyn, en een merklyk gevaar te kennen geeven.

§ 1229.

Het is veel moeilyker, om de Beenbreuken waar van wy thans spreekten, te bevestigen, dan te herstellen. Om het laaste te doen, plaats men den Lyder op den kant van een vast Bedde, met de beleedigde zyde opwaards. Men legt een Kussen onder het bovenste des Lighaams, en een ander onder de Dye, het Been, en den Voet; zoo dat de Heup zelve niet ondersteund wordt, en de plaats der Breuk eenigzints doorzakt. Door dit middel worden de Buik- en Bilspieren gebragt in eenen staat van verflapping, en de herstelling der gebrooken Beenderen, geschied als van zelve.

§ 1230.

Het Verband bestaat uit drie trapswyze Drukdoeken, of uit eene enkele zeer dikke Drukdoek, nat gemaakt in eene Smelting van het *Ammoniakzout*, in Azyn, Water en Brandewyn, en bevestigt door een Windzel, dat drie Vingeren breed, agt of negen Ellen lang is, en gedeeltelyk om het Bekken, gedeeltelyk langs de Lieschen geleid wordt.

§ 1231.

De zoogenaamde algemeene Middelen, de Aderlaating inzonderheid, zyn hier zeer noodig, ter afweering der Ontsteking, die in deeze gevallen by uitstek te vree-

vreezen is. Dus is het ook met het gebruik van verkoelende, verdunnende, en Pynstillende Geneesmiddelen.

De Breuk van het Dyebeen.

*Fraçtura
femoris.*

§ 1232.

Het Dyebeen, hoe schynbaar sterk het ook zyn mooge, en met hoe veele Spieren gedekt, is egter vatbaar voor Beenbreuken, en mischien zelfs meerder dan andere Beenderen. Dit bewyft eenigermaten de Theorie van PORTERFIELD ten opzigte van de breekbaarheid der Beenderen, die ingevolge van deeze, grooter is in dezulke, welke veel, dan weinig vaste zelfstandigheid bezitten.

§ 1233.

De Breuken van het Dyebeen zyn enkel, meervoudig, of saamengesteld; en kunnen of deszelfs Lighaam, of den grooten Draaijer, of den Hals, of het onderste Uitëinde inneemen. Wy zullen elk derzelver afzonderlyk in overweeging neemen, om te beter het verschil te doen kennen dat 'er is in derzelver Kenmerken en Behandeling.

§ 1234.

De enkele Breuk van het lighaam des Dyebeens, verschild ten opzigte van deszelfs algemeene kenmerken, zoo weinig van de Beenbreuken der overige Ledematen, dat het der moeite niet waardig is, dezelve hier aan te wyzen. Men kan hetzelfde zeggen omtrent de overige. Van meer belang is het, aan te merken, dat dezelve, hoe wel ook te regt gebragt, altoos genegen is tot verplaatzing, en men om deeze reeden, haar nooit met te veel oplettenheid kan behandelen. De boogwyze gedaante des Beens, en de zeer groote kragt der Spieren, welke hetzelfde van alle zyden omringen, geeven hier toe aanleiding.

§ 1235.

De beste wyze, om dit soort van Beenbreuken te behandelen, is deeze. Legt den Lyder op een vast Bed, met het gebrooken Deel naar vooren, en gekeerd op deszelfs buitenzyde. Doet de Heup, Dye, het Been, en den Voet, alle stomp-hoekig geboogen, rusten op twee vaste en niet zeer dikke Kussens, op welker bovenste men het meeste gedeelte des Verbands in die orde als hetzelfde moet aangelegt worden, geplaatst heeft. Laat de uitrekking geschieden door een Helper

die met beide zyne Handen het onderste einde van den Dye omvat heeft; en de tegenrekking door een ander, die hetzelfde doet aan het boven einde. Hersteld zelve, met alle mooglyke oplettenheid, de Beenbreuk, zoo dra gy zeeker zyt van de genoegzaamheid der uitrekking; en bevestigt het herstelde, door eene zeer nauwkeurige aanlegging des Verbands, 't welk enkel bestaat uit een Boekband van genoegzaame lengte en breedte om de gantsche Dye in te sluiten, en drie spaanen Spalken van dezelfde uitgestrektheid ten opzigte der lengte, en zoo breed als genoeg is om dit Deel, naa eene behoorlyke aansluiting van alles met drie linden Banden, als in eene doorgaande en onafgebrooken houten Kooker te bevatten. Dat de eerste deezer Spalken zoo lang zyn moet, datze zig uitstrekt van de Heup tot het Kniegewrigt; de tweede, van de onderste graat des Heupbeens tot aan den bovenrand der Knieschyf; de derde van de Liesch tot aan den binnen knokkel des Dyebeens; en ze allen met even lange, iets breeder, en dikker Drukdoeken moeten voorzien zyn; dat de eerste eindelyk, voor de herstelling, onmiddelyk na de voorgemelde banden op het Dyekussen moet gelegd, en de twee laatste, na de aanlegging des Boekbands, hier moeten bygevoegd worden, is iets 't gene men wel moet aanmerken.

§ 1236.

Zoo veele andere byzonderheden in de behandeling deezer Breuken zyn; dat het verband aangelegt worde, wel doordrongen met eene smelting van het *Ammoniakzout* in Azyn en Water; dat het, geduurende de eerste 8 of 14 Dagen, naar maate der byzynde Kneuzing, onophoudelyk met ditzelfde middel nat gehouden worde; dat men zorg draage, om de Knie en Voet nimmer te laten doorzakken; dat men, als de toevallen der kneuzing geweeken zyn, ter besproeiing des Verbands gebruik maake van enkele Brandewyn, of Kalkwater, ter verhoeding van ontvellingen, die hier zeer dikmaalen plaats grypen; gelyk ook, dat men zig niet binde aan den gewoonen tyd, door de Schryvers bepaald ter volkoomen geneezing deezer Breuken, maar den Lyder ten minsten 10 of 12 weeken, en somwylen zelfs langer, doet het Bedde houden, om alle verschuiving der herëenigde eindden te verhoeden. Het gebruik van Krukken daarönboven, in den eersten tyd naa de geneezing; en van eene Handstok in den tweeden, moet nimmer verzuimd worden. Als de Breuk verzeld is van eene merklyke Kneuzing en Uitstorting, of den Lyder jong, sterk, en bloedryk is, behoord men gebruik te maaken van de Aderlaating, eene strenge Eetregel, en verdunnende zoo wel als verkoelende Geneesmiddelen. In het geval van Stoelgang, moet een plat Steekbekken, met

met veel omzigtigheid, en al drukkend op het Bedde, onder het agterfte des Lyders geschooven worden.

§ 1237.

De *Breuken van den hals des Dyebeens* zyn dikmaalen beschouwd als Ontwrigtingen, en men heeft zeer voornaame Heelkundigen, welke zig niet altoos voor deez misflag hebben kunnen hoeden. Men kan nogthans van derzeiver bestaan oordeelen, uit de verkorting van het Been, en deszelfs gemaklyke verlenging by de minste uitrekking; uit de verdikking van de Bil der beleedigde zyde, afhanglyk van de opreizing des grooten Draaijers; uit den buitenwaardschen stand van den Voet; uit het onvermoogen van den Lyder om zig te kunnen steunen op het aangedaane Been; uit de gemaklykheid waarmede de Dye voor en agterwaards gebragt wordt, en datze ligter van de andere Dye kan verwyderd dan geboogen worden; uit het begunstigen van de beweeging des Deels, als men de groote Draaijer met de Hand terug drukt; uit het gekraak der gebrooken einden, by zekere beweegingen welke men de Dye doet ondergaan; en eindelyk uit de geringe wanordes welke in de gewoone beweegbaarheid des Deels plaats grypen.

§ 1238.

Deeze Breuken zyn tot hier toe beschouwd als ongeneeslyk. Ze kunnen egter, behoudens zelfs de beweeging van het gewrigt, en zonder eenige nablyvende Mankheid, hersteld, bevestigd, en geheeld worden, door deeze zeer eenvoudige toefstel.

§ 1239.

Men legt den Lyder in eene volmaakt Horifontaale plaatzing op een vast Bed, of Matrassen, met de Beenen regt uitgestrekt, en zoo na doenlyk is gevoegt by elkanderen. Een helper, ter zyden den Lyder staande, omvat zoo veel hy kan, met beide zyne Handen, de zyde-deelen van het Bekken, zonder eenige pooging te doen tot uitrekking. De Heelmeeſter zelve, geplaatst aan het voet-einde der Legerſtede, omvat met zyne eene Hand, de Hiel, met zyne andere, de Rug van den Voet, en doet door eene zagte en langzaame uitrekking, gevolgt van eene halve binnenwaards draaijing des Voets, zonder eenige andere medehulp, de gebrooken Beenderen haare natuurlyke plaats herneemen. Onmiddelyk na de teregtbrenging, en terwyl de Heelmeeſter de beide Voeten nog met zyne Handen aan een houd, wordt een dubbel gevouwen half Laken, om de Heupen, eene kringwyze Drukdoek boven de Knokkels der Dyebeenderen, en eene dergelyke

gelyke Drukdoek boven de Enklauwen, dermaaten aangeslooten, dat het welgestelde Been, als tot eene onverplaatsbaare Spalk diend voor het gebrooken, en den Lyder buiten de mooglykheid gesteld word, om het een of ander, op eene nadeelige wyze te kunnen beweegen. De overige byzonderheden der behandeling, met betrekking vooräl tot het gemaklyk maaken der onvermydelyke ontlastingen, en tot den Tyd dat de Lyder verplicht is het Bed te houden, verschillen in geen en deele van die der Breuken van het Lighaam des Dyebeens, welke wy zoo aanstonds beschreeven hebben, en kunnen derhalven hier uit ontleend worden.

§ 1240.

In de *Breuken van den grooten Draaijer*, die uit hoofde eener meer merklyke misstand, en duidelyker gevoel van kraaking, veel gemaklyker kenbaar zyn dan de voorige, kan men met het meeste voordeel gebruik maaken van dezelfde behandeling, en insgelyks de geneezing voltrekken zonder eenig gevolg van Mankheid.

§ 1241.

De *Breuken van het onderste einde des Dyebeens*, zyn vry zorglyk, meestäl verzeld met veel Zwellings, en moeten alleen met den Boekband. gesteund van twee bordpapieren Spalken, naar de gedaante van het Kniegewrigt gesneden en geboogen, behandeld worden. Oplossende Stovingen, zyn in dit geval van de uiterste noodzaaklykheid; men kan hetzelfde zeggen van de Aderlaating, de Levenswys, en verkoelende Geneesmiddelen.

*Fraclura
patella.*

De Breuk der Knieschyf.

§ 1242.

De Knieschyf kan overdwersch breeken, of naar de lengte: het laatste geval egter is veel zeldzaamer dan het eerste.

§ 1243.

Gelyk in de dwersche Breuk van dit Been, de twee stukken genoeg van een wyken om eene blykbaare ledige ruimte te maaken tusfchen elkander, is het niet moeilyk om zig van derzelver bestaan te verzeekeren.

§ 1244.

§ 1244.

Zeldzaam zyn deeze Breuken afhanglyk van de onmiddelyke werking van eenig beleedigend vermoogen op de Knieschyf zelve. Doorgaans worden dezelve veroorzaakt door eene fterke en fchielyke inkorting der uitftrekkende Beenspiereu, by gelegenheid der poogingen welke men doet om zig te weêrhouden, als men in het gevaar is van te vallen.

§ 1245.

Somwylen gebeurd 'er op het oogenblik dat de Breuk plaats grypt, eene bloederige, fomwylen eene Wyeägtige Uitftorting in het Vetvlies, en zweld het Kniegewrigt zoodaanig, dat men nauwlyks in ftaat is, om over de waare natuur des gevals te oordeelen. In enkele gevallen zelfs gefchied nog het een nog het ander, en kan men uit het verfchynzel § 1243. gemeld, terftond zyn befluit opmaaken.

§ 1246.

Sommige Heelkundige beweeru de volftrekte Geneesbaarheid deezer Beenbreuken; andere ontkennu dezelve. Ik ben verzeekerd datze alle gelyk hebben, dog onder zekere voorwaarden. De Breuken der Knieschyf, naamlyk, zyn geneesbaar, wanneer door eenigerlye oorzaak, hoedaanig die ook zyn mooge, de uitftrekkende Spiereu van het Been, of geheel niet, of niet genoeg kunnen werken op het bovenftuk deezer Beens, om hetzelve te verwyderen van het onderfte. Zy zyn ongeneesbaar, wanneer het tegengeftelde plaats heeft, en deeze zelfde Spiereu hunne geheele kragt behouden, gelyk in meest alle voorkoomende gevallen waar is.

§ 1247.

De behandeling derhalven, moet altoos dermaaten worden aangelegt, als of men onzeeker ware van de uitkomst, en eene geheele aaneengroeiing der gebrooken ftukken bedoelde. Dus doende, heeft men zig zelve niets te verwyten, hoedaanig ook de uitkomst zyn mooge. Noodzaaklyk egter is het, dat men den Lyder niet in het gevaar brenge eener Gewrigtsverftyving, en hieröm de volgende voorfchriften zorgvuldig in agt neeme.

§ 1248.

Doet den Lyder, geduurende den tyd van 3 of 4 Weeken, het Bedde houden, in eene meer zittende dan horifontaale ligging. Omflaat in het geval eener byzyn-

de aanmerklyke Zwellling en uitstorting, het gantsche Kniegewrigt met den Boekband, en doet denzelven bestendig nat houden, met eene koude oplosfende Stoving. Hersteld in het geval waar geene Zwellling plaats heeft, onmiddelyk de gebrooken stukken der Knieschyf met de Vingeren; en doet hetzelfde in de tegengestelde omstandigheden, zoo dra de Zwellling geweeken, de Uitstorting opgelost, en de Pyn merendeels verdweenen is. Bevestigd alsdan in beide gevallen, het herstelde, door twee dikke en halve kringswyze Drukdoeken, gelegd onmiddelyk boven en beneden de Knieschyf; door het Verband, bekend onder den naam van *Kiaftre*; en door eene lange, breede, en eenigzints stevige spaanen Spalk geplaatst langs het agterste van het Kniegewrigt, en met een kringswys windzel, matiglyk aangeslooten. Verwissel ten einde van den gestelden Tyd, of zoo dra gy zulks raadzaam oordeeld, deezen gantschen toestel, met het voorgemelde Verband alleenlyk, gelegd over eene vierhoofdige enkele Drukdoek die het gantsche gewrigt insluit; en vergun den Lyder van tyd tot tyd eenige ligte, in het eerst afgebrookene, en vervolgens, meer of min aanhoudende beweegingen. Geef denzelven eindelyk, ter ondersteuning, in den eersten tyd Krukken, vervolgens eene stevige Handstok, waarop hy met beide zyne handen rusten kan, en doet hem ten laasten alle beweegingen oeffenen zonder eenig ander steunzel dan een windzel, in de gedaante eener cyffer 8 gelegd om het Kniegewrigt.

*Fractura
Tibiae & fibulae,*

De Breuk der Scheen en Kuitbeenderen.

§ 1249.

De Scheen- en Kuitbeenderen kunnen elk afzonderlyk, of beiden te gelyk gebrooken worden; en deeze Breuken kunnen voorvallen, aan derzelve bovenste of onderste gedeelte, of in het midden.

§ 1250.

Zelden vind men beide gebrooken op dezelfde plaats; ten minsten wanneer niet het breekend vermoogen regtsstreeks gewerkt heeft op de plaats der Beenbreuk.

§ 1251.

De Breuk van het Scheenbeen is gemaklyk te kennen, dewyl dit Been van voren niet gedekt is met eenigerhande Spieren, en de wangestalte doorgaans zeer aanmerklyk is.

§ 1252.

§ 1252.

Het is niet hetzelfde met de Breuken van het Kuitbeen, vooräl wanneer het Scheenbeen is geheel gebleeven. Om zig in dit geval te verzeekeren van den staat der zaaken, moet men met de eene hand, de Voet naar binnen kantelen, en met de andere, het bovenste gedeelte van het Kuitbeen omvangen, hetzelfde eenigzints drukkende naar het Scheenbeen. Dus doende bespeurd men doorgaans de op elkander wryving der gebrooken beendeelen.

§ 1253.

Ter behandeling deezer Beenbreuken wordt vereischt, dat men zorgvuldig in agt neeme, of één derzelver afzonderlyk gebrooken is, dan of ze zulks beide zyn; gelyk ook, of de verplaatzing der gebrooken einden, gering is, of aanzienlyk. Onderstellen we in de eerste plaats, dat de Breuk beide Beenderen inneemt; en de gebrooken stukken, meer of min, naar de lengte des Deels voorby elkander geschooven zyn. In dit geval is de meest goedgekeurde behandeling der He-
dendaagfchen, de volgende.

§ 1254.

De Lyder wordt te Bed gelegd op dezelfde wyze als in de Breuk van het Dyëbeen; dat is te zeggen, met het beleedigd Deel op zyde, en gekeerd naar het voorste van de Legerstede. Een der Helpers, na dat de Knie altoorens ter helft geboogen is, omvat met beide zyne Handen, het bovenste gedeelte van het Been, onmiddelyk beneden het Kniegewrigt. Een ander Helper, doet hetzelfde aan het onderste gedeelte, boven het gewrigt van den Voorvoet, zyne Duimen kruiffende, op of boven den binnen Enklauw. De Heelmeeſter zelve, die gelykerhand het Been omvat in de nabylieid van de Breuk, beveeld alsdan het doen eener langzaame, allengskens toeneemende, genoegzaam ſterke, en gelykmatige uitrekking; en herſteld door zekere gepaſte beweegingen, de gebrooken einden, zoo dra hy beſpeurd dat dezelve genoeg verwyderd zyn, om niet meer te wryven op elkanderen.

§ 1255.

Het Verband beſtaat uit den *Boekband van SHARP*, en de Spalken van denzelfden Heelmeeſter. Het gebrooken Deel ligt geduurende de gantſche behandeling op een Kuffen.

§ 1256.

Ik hebbe gezegd, dat deeze Behandeling, de meest goedgekeurde was der Hedendaagschen, en moet 'er nu byvoegen, datze inderdaad den voorrang zoude hebben voor alle anderen, indien altoos onze Lyders vermoogende Lieden waren; als alle Heelmeefters zig in de mooglykheid bevonden om daar van gebruik te maaken; en wanneer dergelyke Beenbreuken niet zoo dikmaalen verzeld gingen van wonden aan de buiten- of binnen zyde des Beens, gelyk ook van zeer aanmerklyke Kneuzingen, Verzweeringen, en dergelyke. Alle deeze omftandigheden waarlyk in 't gemeen, en elk derzelve in 't byzonder, doen de waarde daarvan, merklyk verminderen, en pleiten ten fterktften voor de volgende Behandeling, die alle gemak en zekerheid influit als de voorige, zonder onderhevig te zyn aan derzelve onvolkomenheden.

§ 1257.

Legd den Lyder, in eene na genoeg Horifontaale plaatzing, en ruglings op een vlak gespreid Bedde. Doet de herftelling op dezelfde wyze, en met dezelfde omzigtigheden als vooren. Verbind met den *Boekband*; eenige op elkander liggende enkele Drukdoeken, ter opvulling der ledige ruimte, tuffchen het onderfte der Kuit en de Hiel; en drie lange fpaanen Spalken, voorzien met haare Drukdoeken, en aangeslooten door linden Banden. Plaatft het dus verbonden deel, op een Kaf-Kuffen als zulks mooglyk is, en indien niet, op een ander, lang genoeg om zig te kunnen uitftrekken, van even boven het Kniegewrigt, tot 2 of 3 vingeren breed beneden den Voetzool. Verzeekerd dit Kuffen om het Been met drie Linden Banden, na dat gy alvorens de Hiel hebt doen rusten op eene Spons. Buig vervolgens de Voet, byna regthoekig; verzeeker denzelven in dien ftand, door een dubbel gevouwen smal ftrookje linnen, met zyn midden gelegd tegen het voorfte gedeelte van den Voetzool, kruislings geleid naar boven, en ter eener en anderer zyde vaft gefpeld aan het Kuffen. Voorziet eindelyk, in de noodige bewegingen des Lyders ter ontlafting van den Stoelgang in een ondergestooken plat Bekken, door eene Beddekwaft of Touw te hegten aan de Zoldering der Legerftede, juift boven de Borft van denzelven, om zig hier aan, zoo veel daar toe noodig zy, en niet meerder, te kunnen opligten; en in de gevolgen eener drukking van het Dek op de Teenen, door hetzelfde uit te fpreiden over een Hoepel, met zyne einden gehegt aan de onderfte zyde deelen van meergemelde Legerftede.

§ 1258.

§ 1258.

In die Breuken van het Scheen- en Kuitbeen beiden, waar by geene merklyke verplaatzing der Gebrooken stukken gevonden word, gelyk ook in die van het Scheenbeen alleenlyk, is het nauwlyks noodig dat men gebruik maake van Uitrekkingen, uit hoofde der als van zelfs gebeurende herstelling, zoo dra slegts als men het Deel eene gemaklyke en half geboogen ligging geeft. In de Breuken van het Kuitbeen, is alle uitrekking volstrekt nutloos, en moet men alleen de Voet binnenwaards doen overkantelen, ter herstelling der van een geweeken Beenëinden. Het Verband in de twee eerste gevallen, verschild in geenen deele van het voorige: in het laatste geval is een kringswys verband genoegzaam, op zyn meest gesteund van twee Bordpapieren Spalken.

De Breuk der Beenderen van den Voet, en der Teenen.

§ 1259.

De Breuk der Beenderen van den Voorvoet, merendeels afhanglyk zynde, van ^{Fractura ossium tarsis} geweldig werkende Oorzaaken, wordt doorgaans gevolgt van verscheidenerlye zeer nadeelige Toevallen; en vorderd derhalven, van den beginne af, eene strenge Leefregel, Aderlaatingen, verkoelende en Pynstillende Hulpmiddelen, oplofende aanlegzels, en somwylen zelfs insnydingen. In zeer eenvoudige Breuken egter van deeze soort, en die met geene merklyke Kneuzing gepaart gaan, kan men ingevalle van verplaatzing, door eene zachte drukking de Herstelling beproeven, en het herstelde, door een steunend Verband bevestigen.

§ 1260.

Wat betreft de Breuk der Beenderen van den Navoet, deeze word gemaklyk ^{Fractura ossium metatarsi} heréénigt door de Voet eene goede plaatzing te geeven, en haar door eenig Verband dus te bevestigen, datze aan geenerlye beweegingen is bloot gesteld.

§ 1261.

Het is hetzelfde met de Breuken van de Kootjes der Teenen, uitgezonderd die van den grooten Teen, welke uit hoofde van deszelfs aangelegenheid, een meer ^{Fractura phalangum pedis} nauwkeurig Verband vorderd, en met meerder kracht moet ondersteund worden. Gespleeten Drukdoekjes, Kringswys aangelegde Windzels, en Spalkjes van dun Hout, of eenigzints stevig Bordpapier, zyn in deeze gevallen de saamenstellende deelen des Verbands.

II. H O O F T D E E L.

De Ontwrigtingen.

§ 1262.

Luxatio. ONTWRIGHTING is de uitwyking van het beweeglyk einde eens Beens, uit de holte in dewelke hetzelfde natuurlyker wyze bewoogen wordt, gepaard met verandering van die beweging.

§ 1263.

Het verschil der Ontwrigtingen wordt afgeleid, van derzelver duuring, van het foort der Geleding in welke zy voorvallen, van de plaats welke de ontwrigte Beenhoofden inneemen, van de Ziekten en Toevallen welke de Ontwrigting vergezellen, en van de Oorzaaken die de verplaatzing der Beenderen bewerkt hebben.

§ 1264.

De verschillende duuring der Ontwrigtingen, doet dezelve onderscheiden in *Versche* en *Veröuderde*. De laatste zyn moeilyker dan de eerste, en dikmaalen zelfs onherstelbaar.

§ 1265.

Gelyk 'er twee voornaame foorten zyn van Geledingen, de Kniegeleding naamlyk, en de Scharnier; en de laatste veel meer geslooten is dan de eerste, kan men ligtelyk begrypen, dat de Ontwrigtingen van genen, merklyk verschillen moeten van deezen, en dat het even dus gelegen is met derzelver gevolgen.

§ 1266.

Met betrekking tot de plaats welke de ontwrigte Beenhoofden inneemen, onderscheid men de Ontwrigtingen, in *Volkoomene* en *Onvolkoomene*. Eene VOLKOOE N O N T W R I G T I N G is, waarin het hoofd van een gegeven Been, geheel verwyderd is van de holte waarin hetzelfde bewoogen werd: eene ONVOLKOOE N, wanneer het staan blyft op den rand dier Holte, of in eenige nabuurige Holligheid van dezelfde geleding huisvest. Het laatste geval egter kan geene plaats hebben dan in Scharnier geledingen, in die des Elboogs by voorbeeld, het Kniegewrigt, en dergelyken.

§ 1267.

§ 1267.

Een ander verschil, op ditzelfde beginzel gegrond, is, dat sommige Ontwrigtingen gezegd worden te geschieden naar binnen, andere naar buiten; sommige naar boven, andere naar beneden. Deeze uitdrukkingen, die haare eigen verklaring medebrengen, vorderen geene opheldering. Ik zal alleen aanmerken, dat de lyn van zwaarte des Lighaams, de regelmaat is der twee eerste, en het toppunt van een staand Mensch, dat des laatste.

§ 1268.

Ten aanzien der ziekten, en toevallen, welke de Ontwrigtingen vergezellen, onderscheid men dezelve in *Enkele*, *Meervoudige*, en *Saamengestelde*. De ENKELE ONTWRIGHTING, is de verplaatsing van een eenig Been, zonder eenigerhande nevensgaande toevallen. De MEERVOUDIGE, de verplaatsing van twee of meer Beenderen, in eenen en denzelfden tyd. De SAAMENGESTELDE eindelyk, die verzeld is van Ontsteking, Uitsorting, Zwellings, Verzwearing, Wonden, Beenbreuk, Versterking, Verlamming, Slaaploosheid, Koorts, en dergelyken.

*Luxatio simplex.**Luxatio composita.**Luxatio complicata.*

§ 1269.

De oorzaken der Ontwrigtingen, zyn of *uit-* of *inwendige*. Sterke poogingen, geweldige uitrekkingen, slagen, vallen, en dergelyke, behooren alle tot de eerste. De laatste bevatten de Stuiptrekkingen; de Slapheid der Banden; de Verlamming der Spieren, geholpen door de zwaarte des Lighaams, of van het Deel alleenlyk; de te groote verzaamling van het Lidvogt; de zwellings van de hoofden der Beenderen; en wat dergelyke meer zyn.

§ 1270.

De kenmerken deezer Gebreken, worden onderscheiden in *gemeene* en *eigene*. Gene ontmoet men, in alle Ontwrigtingen zonder onderscheid: deeze, bepalen zig alleen tot derzelve byzondere foorten.

§ 1271.

Eene tegennatuurlyke holte, ter plaatze alwaar het hoofd des Beens moest huisvesten; eene dergelyke verhevenheid, op de plaats die het uitgeweeke Beeneinde inneemt; de verkorting of verlenging des Deels; deszelfs wanschiklyke gedaante, en onvermoogen ter beweeging; de Pyn eindelyk, altoos, of by zekere gelegenheden daar by tegenwoordig; zyn de gemeene kenmerken van alle Ontwrigtingen.

gen. Men moet nogthans, met opzigt tot deeze kentekenen aanmerken, dat dezelve allen, of immers de meesten, gelyktydig moeten plaats grypen, om daar uit, een onbedrieglyk besluit te kunnen trekken. Want, gelyk de veränderte gedaante des Gewrigts, by voorbeeld, van veele andere oorzaaken, en zelfs van eene aangebooren mismaaktheid kan afhangen, is de enkele invalling van hetzelfde, niet genoeg om te besluiten tot het bestaan eener Ontwrigting; maar moet 'er tevens, eene evenreedige uitzetting bespeurd worden op eene andere plaats, en wel voornaamlyk op die, welke meer of min, regtstreeks tegen die der invalling overstaat. Het is hetzelfde met de Pyn, de Onbeweeglykheid, en de Verkorting of Verlenging des Deels, welke alle, in het afgetrokkene beschouwd, van geheel andere Oorzaaken, van eene Kneuzing naamlyk, van Ontsteking, van Beenbreuken, en dergelyke, kunnen afhangen.

§ 1272.

De eigen Kenmerken onderscheiden in 't algemeen, de volkoomen Ontwrigtingen van de onvolkoomen; de inwendige Oorzaaken derzelve van de uitwendige; en wyzen tevens de plaats aan, alwaar het uitgeweeten hoofd des Beens huisvest.

§ 1273.

Eene tegennatuurlyke verhevenheid, ter plaatze van het Gewrigt; de geringe verändering des Deels in de gedaante en uitgestrektheid; de hevigheid der Pyn; en de gelyke vatbaarheid tot beweeging naar alle zyden; zyn de kenmerken eener onvolkoomen Ontwrigting.

§ 1274.

Het gevoel eener levendige Pyn by de buiging van het Gewrigt; de veränderte gedaante des Deels; eene tegennatuurlyke holte ter eener, en dergelyke verhevenheid ter anderer zyde; moet men als de gewoone verschynzelen eener volkoomen Ontwrigting aanmerken.

♦ § 1275.

De kenmerken der Ontwrigting, van eene inwendige Oorzaak afhanglyk, zyn verschillend, naar de verscheidenheid zelve deezer Oorzaaken.

§ 1276.

Het gevoel eener ledige holte in den omtrek des Gewrigts, tuschen het hoofd des Beens en zyne holte; de gemaklykheid der herstelling, en ligte vatbaarheid tot we-

weder uitvalling; de verlenging van het Deel; deszelfs vermagering; en de weinige Pyn welke den Lyder waarneemt; zyn de tekenen eener Ontwrigting, afhanglyk van de verlamming der Spieren.

§ 1277.

De Pyn, de Zwelling van het Gewrigt, de verkorting des Deels na voorgaande verlenging, en deszelfs wanschiklyke gedaante, wyzen het bestaan aan eener Ontwrigting, veröorzaakt door de verflapping der Banden. In deeze soort, 't gene men wel moet aanmerken, is het Deel niet zoo vermagerd als in de voorige, en de moeilykheid der herstelling, even groot als by die het gevolg zyn der werking van uiterlyke oorzaaken.

§ 1278.

Stuiptrekkingen, eene Ontwrigting vooräfgaande; de moeilyke herstelling en zeer groote pynlykheid van deeze, zyn zoo veele aanwyzende tekenen van de afhanglykheid der ontwrigting van voorgemelde Ziekten.

§ 1279.

Een geluid, gelyk aan het kneeden eener vetägtige aarde, by gelegenheid der herstelling; de tegenstand, die men in dezelfde bewerking waarneemt; en de onmooglykheid deezer somwylen; zyn vry onbedrieglyke bewyzen van het aanwezen eener Ontwrigting, veröorzaakt door de verdikking en ophooping van het Lidvogt.

§ 1280.

De vermeerdering eindelyk van den omtrek des Gewrigts, door eene harde en onindrukbaare Zwelling; en de geringe verändering in den natuurlyken stand van het Deel, zyn de kenmerken der Ontwrigting, afhanglyk van de zwelling der Beenhoofden.

§ 1281.

Om de plaats te kennen, die het hoofd van een ontwrigt Been inneemt, is het genoeg aan te merken, dat het uiterste einde van een dergelyk Been, altoos gekeerd is naar de tegengestelde zyde van het uitgeweeken hoofd; dat is te zeggen, dat als by voorbeeld, dit einde naar buiten ziet, de Ontwrigting naar binnen is; als het Deel eene verkorting ondergaat, de Ontwrigting naar boven, en, hetzelfde verlengd zynde, naar beneden plaats heeft.

O o

§ 1282.

§ 1282.

De voorzegging der Ontwrigtingen, wordt inzonderheid ontleend uit derzelver weezenlyke verscheidenheden. De veröuderde Ontwrigtingen derhalven, zyn bezwaarlyker te herstellen dan de versche. De Ontwrigting van Beenderen, door een Kniegewrigt verëenigt, sluiten minder gevaar in, dan die geled zyn door een Scharnier. De onvolkoomen Ontwrigting, is minder moeilyk dan de volkoomen. De Enkele zyn minder zorglyk, dan de meervoudige, en zoo wel de een als ander, minder dan de saamengestelde. Dus zyn ook, die van inwendige oorzaaken afhangen, altoos zeer moeilyk, en veelmaalen ongeneeslyk, uit hoofde van de bezwaarlyke, of onmooglyke wegneeming der oorzaaken. Dezulke eindelyk, welke gegrond zyn op eene ophooping en verdikking van het Lidvogt, geneezen moeilyker, dan die haaren oorsprong ontleenen uit eene verflapping der Banden.

§ 1283.

De Geneezing der Ontwrigtingen, vordert de herstelling van het hoofd des Beens in zyne holte; de bevestiging van hetzelfde ter dier plaatze; en de verhoeding of wegneeming der Toevallen.

§ 1284.

De herstelling geschied, door uitrekking, tegenrekking, en de geleiding van het hoofd des Beens in zyne holte.

§ 1285.

Om alle deeze bewerkingen onbelemmerd, en met het meeste gemak voor zig zelve en den Lyder te verrigten, moet de laafte dermaaten geplaatst worden, dat men het Deel vrijelyk, en met zekerheid kan behandelen; dat is, hy moet in alle Ontwrigtingen der bovenste Ledemaaten op eene Stoel zitten, en te Bedde liggen in die der onderste. De uit en tegenrekkende vermoogens, moeten even als by de Beenbreuken, zoo na doenlyk, in kragt aan elkander beäntwoorden: zy moeten aangewend worden, dan eens in de nabyheid der Ontwrigting, dan eens op den meest mooglyken afstand: haare werking moet evenreedig zyn aan den trap van afwyking der Beenderen, en den verschillenden weêrstand der Spieren: ook moeten dezelve geschieden, zoo veel mooglyk is, met de Handen; en niet dan in zeer zeldzaame, of in zekere byzondere gevallen, door behulp van Werktuigen.

Do

De geleiding van het hoofd des Beens in zyne holte, behoord men altoos te doen, langs denzelfden weg door dewelke het is uitgeweeken, en met zoo min verhaasting, zoo veel voorzigtigheid, als maar eenigermaten mooglyk is.

§ 1286.

Dat de herstelling volkoomen zy, besluit men uit het afwezen, of de zeer merklyke vermindering der Pyn welke de Ontwrigting vergezelde; uit het verdwynen der zwelling, van het hoofd des Beens afhanglyk; uit de herkreegen natuurlyke gedaante van het Deel, zoo ten opzigte van het gewrigt zelve, als van al het overige; gelyk ook, uit de merklyke verbetering, of geheele herstelling der beweeging.

§ 1287.

De herstelling wordt fomwylen belet, door eene Beenbreuk in de nabyheid der Ontwrigting, door Ontsteking, Zwelling, Bloedvliet, of Stuiptrekkingen. In alle deeze gevallen, kan men in den eersten Tyd niet anders doen, dan door alle mooglyke Hulpmiddelen de geneezing bewerken van alle deeze nevensgaande Ziekten, en de Ontwrigting behandelen met verflappende aanlegzels. Het laaste geval egter, lyd ten deezen opzigte, fomwylen eenige uitzondering; en kan zelfs eischen dat de Ontwrigting ten spoedigsten hersteld worde; om dat de Stuiptrekking kan afhangen van eene drukking en uitrekking der Zenuwen, ingevolge de plaatsing van het uitgeweeken Beendeel, op of tegen deeze.

§ 1288.

De bevestiging der herstelde Beenderen, geschied inzonderheid door het Verband, en eenigermaten ook, door de plaatsing van het Deel.

§ 1289.

Het Verband, dat naar maate van de verscheidenheid des Deels, verschillend zyn moet, is noodzaaklyker in de Ontwrigtingen die van eene innerlyke oorzaak afhangen, dan in die welke door eene uiterlyke oorzaak zyn voortgebracht. By de laatste naamlyk, diend het hoofdzaaklyk ter ondersteuning, of aanlegging der Plaatsmiddelen, welke men noodig oordeeld ter geneezing der byzynde Toevallen.

§ 1290.

De plaatsing des Deels moet dus worden ingerigt, dat het nog te veel geboogen
O o 2 is,

is, nog uitgestrekt, en het Bloed gemaklyk kan wederkeeren van den omtrek naar het middenpunt.

§ 1291.

De verhoeding en geneezing der Toevallen, behoord geregeld te worden naar de verscheidenheid des Ouderdoms, en van de Lighaamsgesteltheit des Lyders; gelyk ook naar den verschillenden aart zelve dier Toevallen. By jonge Lieden by voorbeeld, en die van een bloedryk gestel zyn, moet men de hoeveelheid des Bloeds verminderen door de Aderlaating, en den te snellen omloop van hetzelfde maatigen door eene koele Leefregel. De verdunning en oplossing der uitgestorte Vogten, wordt bewerkt door eene dikmaalige besproeiing des Verbands met eene smelting van het *Ammoniaksout*, in Azyn en Water. De Pyn, en hier van afhangende Stuiptrekkingen, behandeld men best met de Aderlaating, en ontlastende zoo wel, als verkoelende, en pynstillende Geneesmiddelen. Dus voorziet men ook in de plaatslyke Ontsteking, en bykoomende toevallige Koortsen, door dezelfde Geneesmiddelen, en weekmaakende of oplosfende Aanlegzels.

§ 1292.

De overige byzonderheden, zoo van de Ontwrigtingen zelve, als van derzelve behandeling, zyn vooräl betreklyk tot elk deezer Ziekten in het afgetrokkene, en behooren dienvolgens, tot het onderwerp der volgende Onderdeelingen.

De Ontwrigting der Onderkaak.

§ 1293.

*Luxatio
maxilla
inferioris.*

De Onderkaak, alsze ontwrigt wordt, ontwrigt altoos naar vooren, zynde de agterwaardsche Ontwrigting onmooglyk, uit hoofde der tegenstand van den beenigen Gehoorweg, en van het Mamwyze uitsteekzel; en de zydwaardsche, uit aanmerking van het kroonwyze uitsteekzel deezer Kaakbeens.

§ 1294.

Eene sterke nederdrukking van het Kinstuk deezer Beens; onmaatig Geeuwen, Lagchen, of Vallen; gelyk ook, eene Krampagtige en zeer sterke inkorting der Tweebuikige Kaakspieren, zyn de meest gewoone oorzaken deezer Ontwrigtingen.

§ 1295.

§ 1295.

Twee foorten van dit gebrek zyn mooglyk: een *Volkoomen* naamlyk, en *Onvolkoomen*. In het eerſte foort, zyn de beide Knokkelwyze uitſteekzels van de Onderkaak, geweeken uit de overéénſtemmende holten der Slaapbeenderen. In het laaſte, heeft niet meer dan een dier uitſteekzels, zyne Gewrigtsvlakte verlaaten.

§ 1296.

Als de Onderkaak in het geval is eener volkoomen Ontwrigting, ſtaat de Mond wyd open, de Kin ruſt op het bovenſte gedeelte van de Borſt, de onderſte Tand wyken veel meer naar vooren, het Speekzel vloeid tegenwillig en in groote veelheid naar buiten, de Slaapſpieren zyn in eenen ſtaat van verſlapping, de Wangen vertoonen zig veel platter dan natuurlyk, de Spraak en Slikking zyn verhindert, en de Mond kan by geene mooglykheid geſlooten worden.

§ 1297.

In de onvolkoomen Ontwrigting, is de Kin geweeken naar de gezonde zyde, de Mond is het meeft geöpent aan den kant der Ontwrigting, de Tand der belee- digde zyde ſtaan niet regt tegen over die der Bovenkaak, maar wyken meerder naar vooren, het Kwyl overſtelpt den Mond des Lyders, en blyft tegen wil en dank uitvloeijen, de Spraak is belemmerd, de Slaapſpier der ontwrigtezyde bevind zig in eenen ſtaat van verſlapping, en de Mond, ſchoon de Lippen niet ver van een ſtaan, kan egter niet geheel geſlooten worden.

§ 1298.

De Toevallen deezer Ontwrigtingen zyn gewigtig genoeg om alle onze oplet- lettenheid te verdienen. Die der eerſte foort egter, zyn zulks meerder dan die der laaſte. Men kan als de voornaamſten deezer toevallen aanmerken, de ſtuip- trekkende beweegingen der naaſtliggende Deelen, de Oorpyn, de Koorts, Slaapzugt, Braaking, Ontſteking, en dergelyken.

§ 1299.

Ter herſtelling der volkoomen Ontwrigting, die gemaklyker geſchied dan die der onvolkoomen, wordt de Lyder gezet op eene Stoel zonder Rugleuning; in- dervoegen dat zyn agterhoofd ruſt tegen de Borſt van een Helper die daar agter ſtaat, en met zyne handen het Voorhoofd omvat, ſtekende zyne Vingeren tus-

fchen elkanderen. De Heelmeester zelve, voor den Lyder fttaande, en zyne Duimen, voor de kwetfing der Tanden, met omgewonden Linnen bevyligd hebbende, brengt dezelve zoo ver naar agteren op de laafte Maaltanden, als mooglyk zy, terwyl zyne vingeren het voetftuk omvatten van de Onderkaak. Eene benedenwaardfche drukking, en naar vooren trekking deezer Kaakbeens, evenreedig aan den trap van knelling, ontwikkelt alsdan deszelfs uitgeweeke Knokkelwyze uitfteekzels, en fteeld haar in 't geval, om door het opligten der Kin, en eene geringe drukking naar agteren, in hunne Gewrigtsholten te fchieten, hierin geholpen zynde door de natuurlyke inkorting zelve der Spieren.

§ 1300.

Men gaat op dezelfde wyze te werk, ter herftelling van de onvolkoomen Ontwrigting deezer Beens, alleenlyk in agt neemende, dat de uitrekking die hier is voorgefchreeven, flegts aan eene, dat is aan de ontwrigte zyde gefchiede; en dat men als de onderkaak niet genoeg afwykt van de bovenkaak, om de Duim op de agterfte Kiezen te kunnen plaatzen, zig altoorens bediene van eene, met Linnen bekleede Spatel, een bekleed Stokje, of iets anders, waar mede men, als met een Hefboom, de beide Beenderen genoeg van een verwyderd, om 'er gemaklyk de Duim te kunnen tufchen brengen.

§ 1301.

In de herftelling van de een en ander deezer Ontwrigtingen, moet men bedagt zyn, om de Duimen te doen fchieten tufchen de buitenfte oppervlakte der Kaakbeenderen, en de binnenfte der Wangen, zoo haafte de Knokkelwyze uitfteekzels gereed ftaan hunne natuurlyke plaats te herneemen; vermits men anders gevaar loopt om dezelve te kwetfen, door de fchielyke inkorting der Spieren, en de hier van afhangende nadering der beide Kaakbeenderen.

§ 1302.

Het verband in beide gevallen, is eenvoudig, en beftaat uit eene Drukdoek, naar de gedaante van de Kaak gefneden, bevogtigt in eenig oplofend mengzel, en gefteund van den Kinband. Meerder toefel is in dit geval niet noodzaaklyk; ten minften, wannneer niet eene zieklyke gefteltheid der Spieren, of van den Beursband, eenige andere oplettenheden vordert in de keuze der Plaatsmiddelen.

*De Ontwrigting van het Hoofd.**Luxatio
capitis,*

§ 1303.

Men kan, noch de mooglykheid, noch de onmooglykheid betwisten, van de Ontwrigting des Hoofds met de eerste of tweede Halswervel. Hoe onbegryplyk dezelve ook zyn mooge, schynd nogthans zekere Waarneeming van DUVERNEY haar te bevestigen.

§ 1304.

In 't algemeen egter, merkt men aan, dat de Atlas aan het Hoofd blyft, schoon deeze van de tweede Wervel is afgeweeken. PETIT zegt waargenoomen te hebben, dat byna in alle gehangene, de eerste Halswervel geheel was afgeweeken van de tweede. DUVERNEY integendeel beweerd, dat in dit geval, de Wervelen wel van elkander wyken, dog nooit de eerste of tweede, maar altoos de derde of vierde.

§ 1305.

Hoe het hier mede ook zyn mooge, het is onmooglyk, dat deeze Ontwrigting in dien zin volkoomen kan genoemd worden, als men zulks gewoon is te zeggen van die des Schouders by voorbeeld, en anderen. Ze is egter groot genoeg, om in meest alle gevallen, den Lyder onmiddelyk te berooven van het Leven. Ik zegge in meest alle gevallen, om dat uit eene waarneeming van DUVERNEY blykt, dat het Onderwerp derzelve eenen geruimen tyd moet geleefd hebben, vermits alle Wervelen van den Hals aan een gegroeid waren.

§ 1306.

Wat men voorzeggen moet blykt uit het gezegde genoegzaam. Omtrent de Geneezing schynd het my moeilyk iets te bepaalen, dewyl men noch kan weten waar de Ontwrigting geschied is, noch door welke middelen men dezelve zal herstellen en bevestigen. CELSUS zegt stellig, dat 'er niets aan te doen, en den Dood des Lyders zeeker is. PETIT redeneerd 'er van uit het mooglyke, dat weinig, of laat ik liever zeggen, geheel niets afdoet. De middelen ook die hy voorschryft, zyn onvermoogend genoeg, om 'er geen vertrouwen op te stellen, en kunnen het ongunstig besluit van CELSUS derhalven, in geenen deele ontzenuwen.

De

*Luxatio
clavicula.**De Ontwrigting van het Sleutelbeen.*

§ 1307.

Beide einden van het Sleutelbeen zyn voor Ontwrigtingen vatbaar. Het voorste egter is zulks meerder dan het agterste. De kleine uitgestrektheid van de gewrigts holte des Borstbeens, de meerder grootte van het overeenstemmend einde des Sleutelbeens, de slapheid van den Beursband, en de veelerlye beweegingen waar aan dit Gewrigt is bloot gesteld, moet men als de voornaamste oorzaken hier van aanmerken.

§ 1308.

De Ontwrigtingen van het voorste einde deezes Beens, geschieden of naar vooren, of naar agteren. In het eerste geval, dat zeer blykbaar is, bespeurd men eene indrukking des gewrigts van agteren; en eene verhevenheid van vooren: de Schouder daarënboven, naderd naar het voorste gedeelte van de Borst, en de oplichting van den Arm is belemmerd. In het laatste voeld men de leedige gewrigts-holte van vooren, en daar agter het uitgeweeken einde des Sleutelbeens. De Schouder in dit geval, vald nog meer naar vooren dan in het eerste; en de oplichtende beweging des Arms is byna gantschelyk vernietigd. Men kan hier nog byvoegen, dat de Ademhaaling moeilyk, de Slikking dikwerf verhinderd is, en de Oogen doorgaans zeer rood zyn, uit hoofde der drukking van het uitgeweeken Beeneinde, op de Lugtpyp, het agtste paar Zenuwen, en de Halsvaten.

§ 1309.

Het agterste einde van het Sleutelbeen ontwrigt alleenlyk opwaards over den Opperschouder; en deeze Ontwrigting, is buiten het geval eener zeer groote verplaatsing, niet zeer kenbaar. Men oordeeld nogthans van dezelve, uit de wange-stalte van den Opperschouder, en de meer of min pynlyke beweegingen van den Arm, vergeleeken met den aart der werking van het beleedigend vermoogen.

§ 1310.

De teregtbrenging, en het Verband, van de twee eerste deezer Ontwrigtingen, zyn vry gelyk aan die van de breuken des Sleutelbeens § 1160 enz. beschreeven, en kunnen hier van voor het meerder gedeelte ontleend worden. Men begrypt ondertusfchen van zelve, dat de Spalken hier niet te pas koomen, en den toefstel voornaamlyk moet werken op den omtrek van het Gewrigt.

§ 1311.

§ 1311.

In de Ontwrigting van het agterste einde des Sleutelbeens, geschieden de uitrekkingen op dezelfde wyze als in die van het voorste, dat is, als in de breuken deezes Beens. De herstelling wordt verrigt door de nederdrukking van het afgeweeke einde.

§ 1312.

Het Verband in dit geval bestaat uit twee kruiswyze drukdoeken, en de *nederdaalende Koornärr*. De Arm wordt geplaatst in den *draagband*, en moet in eene volstrekte rust gehouden worden.

De Ontwrigting der Ribben.

*Luxatio
costarum.*

§ 1313.

De Ribben zegt men, dat in haare saamenleeding met de Rugwervelen, ontwrigten kunnen naar binnen, naar boven, en naar onderen. Men voegt 'er by, dat deeze Ontwrigtingen, of alleen haare geleeding betreffen met de dwersche Uitsteekzels, of tevens die met de Lighaamen deezes Wervelen. Ik voor my ben van gedagten, datze nimmer ontwrigten dan in gevolge eener oorzaak, die geene herstelling toelaat; door eene Slagaderbreuk van de Borst by voorbeeld, door geweldige en aanhoudende hartkloppingen, gelyk ook, door inwendige Gezwellen, en Vogtsverzaamlingen, by de geleeding zelve deezes Beenderen. De kenmerken derhalven, de gevolgen, en de behandeling dier Ontwrigtingen, by de Schryvers gemeld, zal ik met stilzwygen voorbygaan, om dat de eersten niet gegrond zyn dan op eene meer of min sterke verbeeldingskracht, en de laatste meer nadeel dan voordeel influit.

De Ontwrigting van het Armbeen.

*Luxatio
ossis hume-
ri.*

§ 1314.

De groote en veelvuldige beweegingen voor dewelke het Armbeen in het gewrigt des Schouders vatbaar is; de gewoonte zelfs van het voorwaards te brengen wanneer men vald; en deszelfs ondiepe geleeding met het Schouderblad; maken de Ontwrigtingen van hetzelfde, zeer gemeenzaam.

§ 1315.

Het Armbeen ontwrigt misfchien nimmer anders den benedenwaards. Dit egter belet niet, dat het uitgeweeken hoofd zig vervolgens kan plaatzen in de holte van den Oxel, onder het einde der groote Borstspier, op de onderste Rib van het Schouderblad, onder den Graat deezes Beens, of tusschen deszelfs binnenste oppervlakte en de Ribben.

§ 1316.

Van alle deeze Ontwrigtingen, zyn de twee eersten de gemeenzaamste; en vooral die, waar in het hoofd des Beens gevonden wordt in de holte van den Oxel. Onder de agterwaardsche Ontwrigtingen van dit Been, is de eerstgemelde zeldzaamer dan de tweede, en de laatste de zeldzaamste nog van allen.

§ 1317.

Elk deezer Ontwrigtingen heeft haare eigen en foortonderscheidende verschynzelen, welke het zeer noodig is te kennen.

§ 1318.

In het eerste foort, dat is, wanneer het hoofd des Armbeens zig bevind in de holte van den Oxel, wordt 'er eene inwyking gevoeld onder den Opperschouder; dit Uitsteekzel puild veel meer naar buiten dan natuurlyk; de randen van de driepuntige Armspier zyn gespannen; het verplaatste hoofd maakt een Gezwel onder den Oxel; de Arm is een weinig opgeligt, en wykt eenigermaten af van de Ribben; de Elleboog bevind zig altoos in een Staat van buiging, en de pyn welke de Lyder gevoeld, wordt verminderd door het opligten alleen van den Arm, en het meerder buigen van het gewrigt des Voorarms.

§ 1319.

Als het hoofd des Armbeens geweeken is onder de groote Borstspier, is de beweging van den Arm moeilyker dan in het vorige geval; de voeding des Deels word belemmerd; de veranderingen des Gewrigts zyn na genoeg dezelfde als in de vorige Ontwrigting; de Arm staat gekeerd naar agteren; en het hoofd des Beens is voelbaar, onder, of liever agter, het armëinde van voorgemelde Borstspier.

§ 1320.

Ingevalle de Ontwrigting geschied zy op de onderste Rib van het Schouderblad, wordt

wordt de lengte des Arms zichtbaarlyk vermeerderd; zy wykt verder af van de Ribben; en begeeft zig nog naar de eene nog naar de andere zyde, maar is alleen een weinig verheeven. Ten opzigte van deeze foort moet men aanmerken, datze zeer ligt verwandeld in de volgende, uit hoofde der geringe oppervlakte van den Rib des Schouderblads.

§ 1321.

Wanneer het hoofd des Armbeens huisvest onder de graat des Schouderblads, vertoond zig het ravenbekswyze uitsteekzel zeer blykbaar; de inzakking des Gewrigts is veel kenlyker dan in de voorige Ontwrigtingen; de Arm nadert naar de Ribben; en, als men dezelve hier van tragt te verwyderen, vermeerderen de pynen welke den Lyder gevoeld grootelyks.

§ 1322.

Met betrekking eindelyk tot de verplaatzing des Armbeens tusfchen het Schouderblad en de Ribben, bestaan de meest gewoone verschynzelen, in eene bepaalde Pyn beneden het gewrigt van den Schouder; in de ligging des Arms tegen het zydelyke gedeelte van de Borst; in de vermeerdering der Pyn by het opligten van den arm; en in de afwyking des onderften hoek van het Schouderblad van de Ribben.

§ 1323.

De meest algemeene behandeling deezer Ontwrigtingen is de volgende. Men doet den Lyder zitten op eene Stoel zonder Rugleuning. Men buigd zynen voorarm tot zoo verre, datze iets minder dan een regten hoek maakt met den Opperarm, welke laaste na genoeg ten halven is opgeligt. Een of meer Helpers, omvatten het benedenfte gedeelte van den Opperarm, onmiddelyk boven de knokkelwyze uitsteekzels des Armbeens. Een of meer andere Helpers, doen een driehoekig gevouwen Servet, onder den ontwrigten Arm, over de Borst en Rug der maaten heen gaan, dat deszelfs midden over den onderften hoek van het Schouderblad gaat, en de einden aan de tegengestelde zyde des Lighaams, worden vastgehouden. De Heelmeefters zelve, geplaatst aan de buitenzyde des ontwrigten Arms, doet een ander Servet onder den Opperarm doorgaan, welks einden hy faamenknoopt, om door de hier door gemaakte Luts, zyn Hoofd te doen heen gaan. De hand eindelyk wordt gesteund van een byzonder Helper, die zorg moet draagen dat den Onderarm in zynen geboogen stand bevestigd blyft.

Na deeze voorbereiding, wordt het ontwrigte hoofd des Armbeens, door eene evenreedige trekking der weërzydsche Helpers, uit zyne knelling gebragt, en waterpas met de gewrigtsvlakte van het Schouderblad, om door den Heelmeeſter zelve, gedeeltelyk met den Hals, gedeeltelyk met de Handen, opgeligt, en in de gewrigtsholte herbragt te worden.

§ 1324.

Deeze behandeling is eenvoudig, gemaklyk, en in veele gevallen genoegzaam. Ze voldoet egter geenzints in veröuderde ontwrigtingen, in dezulken waarin het hoofd des Armbeen uitermaaten beklemd is, by Menſchen welkers Spierkracht buiten gemeen groot is, nog op plaatzen, waar het ontbreekt aan genoegzaame en daar toe geſchikte Helpers.

§ 1325.

In de drie eerſte deezer omſtandigheden derhalven, is men verpligt den toevlugt te neemen tot het gebruik van Werktuigen, en vooral tot dat van mynen zeer ſchranderen en bekwaamen Konſtgenoot, den Heere B. HUSSEM, t welk alle mooglyke volmaaktheden influit; geenerlye, my tot nogtoe bekende gebreken heeft; en in oneindig veele gevallen van allerlye aart, zonder eenige miſlukking, zoo door dien Heer zelve, als door my, en anderen, beproefd is. Ik zal ter zyner plaatze, eene Beſchryving en Afbeelding van dit Werktuig mede deelen, en tevens aanwyzen hoedaanig hetzelve moet gebruikt worden.

§ 1326.

In de laaſte omſtandigheid, die wel is waar, niet dikwerf, maar egter ſomwylen voorkomt, moet men zig bedienen van eene handelwys, vry algemeen afgekeurd, dog in dit geval de eenige. Men legt naamlyk den Lyder in eenen Horifontaalen ſtand, op den grond neder. De Heelmeeſter zet zig regt tegen over denzelven en plaats zyn regter Hiel in de linker Oxel, als de linker Arm ontwrigt is, en de linker onder de regter, als de regter Arm zig in dit geval bevind, dog niet, dan na dat hy alvorens eene zeer dikke Drukdoek, of een ſmal welgevuld Kuſſentje in dezelve gelegd heeft. Hy omvat vervolgens den Onderärm, boven het gewrigt der Voorhand, trekt den Arm zagtelyk, gelykmatig, en met zoo veel kragt als hem mooglyk en noodig is, tot zig, terwyl hy gelyktydig den Oxel van zig afdrukt. Dus naamlyk, doet hy alleen, en zonder eenige hulp, de uit- en tegenrekkingen, en geeft daarënboven gelegenheid, dat de Spieren zelve, zoo dra

dra het hoofd des Beens zig tegenöver de Gewrigtsholte bevind, en hun Steunpunt na genoeg gelyk wordt aan het natuurlyke, de herftelling bewerken.

§ 1327.

By gelegenheid van alle deeze Bewerkingen zonder onderscheid, moet men wel in agt neemen, dat de rekkende vermoogens van ftreeklyn veranderen, naar maate der verfchillende plaatzingen van het uitgeweeken hoofd des Armbeens. De regelmaat hier van, is de ftand zelve van den Arm, die derhalven, zoo nauwkeurig als immer mooglyk is, moet gevolgd worden.

§ 1328.

Het Verband bestaat kortelyk hierin. Men vuld de holte van den Oxel, wat ook fommige niet zeer geöeffende Schryvers hier tegen moogen inbrengen, losjes op met vlas of zagt plukzel; men onderfteund hetzelve met eene enkele vierhoofdige Drukdoek, welkers midden vald onder den Oxel, en wier einden elkan-der kruisfen op den Schoudertop. Men bedekt eindelyk den gantschen omtrek des Schouders, door het *Malthezer kruis Compres*; en zoo wel dit, als den overigen toefstel, door de *nederdaalende Koornair*. De Onderärm wordt geplaatft in den gewoonen *Draagband*; of gefchoord, door de laafte flag van het Windzel, by wyze eener luts, naar beneden en opwaards gevoerd.

De Ontwrigting des Voorärms.

§ 1329.

*Luxatio
Antibrachii.*

Door deeze verftaa ik bepaaldelyk de gezaamentlyke verplaatzing der groote en kleine Ellepyp, 't zy geheel, 't zy gedeeltelyk, van het overeenftemmend einde des Armbeens.

§ 1330.

Het eerfte foort deezer Ontwrigtingen is niet mooglyk zydwaards, uit hoofde van de groote oppervlakte des Gewrigts in deeze afmeeting, en den weêrftand der Zybanden; hetzelfde moet men vaftftellen van deeze en het tweede foort voorwaards, uit aanmerking van het beletzel dat het Elleboogs uitfteekzel ten deezen opzigte aanbied.

§ 1331.

§ 1331.

De volkoomen Ontwrigting van deeze Beenderen derhalven, geschied altoos agterwaards. De zydwaardsche zyn nooit anders dan onvolkoomen. Beiden ook, wat men hier van zeggen mooge, zyn zeer zeldzaam. Eene niet zeer bekrompen Konstöeffening ten minsten van byna 20 Jaaren, heeft my nog nimmer een eenige aangeboden. Bilyk misschien mag ik hier uit afleiden, dat de meeste voor-gewende Ontwrigtingen deezer Beenderen, slegts ondersteld zyn; en men daar voor meestäl genoomen heeft, eene sterke uitrekking der Spieren, Peezen, en Banden, welke dit Gewrigt helpen saamenstellen, of daar voorby gaan.

§ 1332.

De herstelling zegt men dat geschieden moet, in de volkoomen Ontwrigting, door den Arm, genoegzaam uitgerekt zynde, te doen buigen; en in de onvolkoomen, door, na een zelfde uitrekking, de verplaatste Beenderen te drukken naar de tegengestelde zyde hunner uitwyking. Myn zoo even gemeld gebrek aan Ondervinding, laat my niet toe, om over het vermoogen deezer handelwyzen te oordeelen.

§ 1333.

Het Verband doet men doorgaans bestaan, uit eene *vierhoofdige Drukdoek*, kringwys aangelegd, en een dergelyk Windzel. De Onderärm wordt geplaatst in den *Draagband*.

*Luxatio
Radii.*

De Ontwrigting der kleine Ellepyp.

§ 1334.

Het hoofdje der kleine Ellepyp verlaat somwylen de overeenstemmende knokkel des Armbeens, zoo wel als de zydelyke halvemaanswyze holte der groote Ellepyp, en plaatst zig binnenwaards in den vouw des Elboogs, onmiddelyk agter de pees der tweebuikige Armspier.

§ 1335.

Deeze Ontwrigting vald het meest voor by Kinderen, is niet zeer pynlyk in den beginne, brengt de Hand in een staat van vooroverkanteling, maakt de agteroverkanteling van dit Deel onmooglyk, en belemmerd meer of min, de uitstrekking van den Voorarm.

§ 1336.

§ 1336.

D U V E R N E Y, die het eerst, of althans met de meeste nauwkeurigheid, dit gebrek beschreeven heeft, beschouwd hetzelfde, niet hersteld wordende, als uitermaaten gevaarlijk, en de oorzaak van Verlammingen, bolle Gewrigts gezwollen, en eene Lidzwam. Vyf gevallen van dien aart egter door my gezien, betwisten heel zeer het gevoelen van dien Hoogleeraar, en hebben my zelfs stellig verzekerd van de mooglykheid, dat somwylen niet anders nablyft dan eene onvolkoomen buiging en uitstrekking des Voorärms, met eene belette agteröverkanteling van de Hand; en somwylen, hoewel zeer zeldzaam, alle natuurlyke beweegingen aliepgskens wederkeeren. De Behandeling zeeker heeft hierin veel aandeel, en kan alleen te wege brengen, dat de gevolgen van D U V E R N E Y gesteld, al of niet plaats grypen.

§ 1337.

De herstelling deezer Ontwrigting is eenvoudig; egter niet gemaklyk. Men omvat naamlyk met de eene Hand den Onderärm by het gewrigt der Voorhand, met de andere denzelfden Onderärm by het gewrigt des Elboogs, en plaatst de Duim van deeze Hand op de kleine Ellepyp, by de aanhegting van de Pees der tweebuikige Armspier. Met de eerste Hand brengt men die des Lyders zoo veel mooglyk zy in agteröverkanteling, en drukt ter gelyker tyd met den Duim der laatste, het bovenste einde der kleine Ellepyp buitenwaards. Zoo dra men oordeeld dat de agteröverkanteling genoeg, en het hoofdje der kleine Ellepyp ontkneld is, buigt men het gewrigt des Voorärms, en voltooid hier mede, de herstelling.

§ 1338.

Tot het Verband behooren, eene kringswyze Drukdoek; twee maatig dikke en smalle drukdoeken, kruiswyze gelegd in den vouw des Elboogs; eene tweede kringswyze Drukdoek, gelegd over deezē; en het Verband voor de Aderlaating. De Onderärm en hand, ondersteund men vervolgens door den Draagband, beide gesteld in een middenstaat tusschen de voor- en agteröverkanteling.

§ 1339.

Ik hebbe § 1337. gezegt, dat de herstelling, wel eenvoudig, dog niet gemaklyk was. Ik moet 'er nu byvoegen, dat dezelve, met hoe veel oplettenheid ook ondernoomen, dikmaalen mislukt; en men in dit geval, gelyk ook in die gevallen waar men te laat wordt bygeroepen, doorgaans alle schadelyke gevolgen kan afwee-

weeren, door het aanwenden van weekmaakende Stovingen, Badingen van den zelfden aart, en herhaalde zagte beweegingen van het lydend Deel. Ik spreek in dit alles by Ondervinding; gelyk ook als ik zegge, dat de meeste deezer Ontwrigtingen by Kinderen, daar van afhangen, dat hunne geleiders, alsze zig in het gevaar bevinden van te vallen, ze by de Hand aangrypen, daar door weêrhouden, en de gantsche zwaarte des Lighaams, by gelegenheid der opligting doen werken op de bovenste geleeding der kleine Ellepyp.

De Ontwrigting der Voorhand.

*Luxatio
carpi.*

§ 1340.

De Voorhand, dat is te zeggen, de faamenleeding der Voorhandsbeenderen met die des Onderarms, vooral met de kleine Ellepyp, het geval eenvoudig genoomen, kan ontwrigten binnen of buitenwaards; verstaat hier door, naar de zyde des Handpalms, of naar die van den rug der Hand. De voorwaardsche Ontwrigting naar de kant van den Duim, en de agterwaardsche naar die der Pink, zyn niet mooglyk; althans niet anders dan onvolkoomen, en by wyze van Verrekking, waar van het hier de plaats niet is te spreken.

§ 1341.

De eerste deezer Ontwrigtingen, wordt veelal veroorzaakt door een val op den Handpalm. Derzelve kenmerken zyn, dat de Vingeren geboogen staan; dat men eene verhevenheid bespeurd aan de binnen, en eene inwyking aan de buitenzyde des Gewrigts; en dat den Lyder eene zeer groote pyn gevoeld, als men de Hand rugwaards over buigd.

§ 1342.

De tweede is afhanglyk van een val in den tegengestelden zin; en wordt gekend, aan eene verhevenheid des Gewrigts uitwendig; aan deszelfs inwyking binnenwaards; aan de uitstrekking der Vingeren; gelyk ook, aan het vermeederen der Pyn, als men tragt de Voorhand te buigen

§ 1343.

Beide gevallen gaan dikmaalen vergezeld van aanmerklyke verzaamlingen van Bloed in het Vetvlies, van Wye in de schede der Peezen of Banden, en van Livogt in de holte zelve van den Beursband. In alle deeze omstandigheden is de Pyn groot, de herstelling moeilyk, en de geneezing langduurig.

§ 1343.

§ 1344.

Ter herstelling deezer Ontwrigtingen, plaatst men den Onderärm in eenen stand, even zoo veel hellende naar de voor- als naar de agteröverkanteling; en doet de uit en tegenrekking verrigten door twee Helpers, waar van de eene de Hand, de andere de Voorärm omvat van den Lyder. Zoo draa deeze genoeg zyn, drukt de Heelmeeſter zelve, de verplaatſte Voorhandsbeenderen buitenwaards in de Ontwrigting naar binnen, en binnenwaards in de Ontwrigting naar buiten, doende ter gelyker tyd, de eerſte Helper, de Voorhand buigen in het eerſte geval, en uitſtrekken in het laaſte.

§ 1345.

Het Verband beſtaat uit eene vierhoofdige Drukdoek, welke het Gewrigt omvat der Voorhand; uit twee dikke, lange, en ſmalle Drukdoeken, gelegd naar de lengte des Deels, langs de buiten en binnenzide, over het gewrigt der Voorhand; uit eene vierkante Drukdoek, of een Spons, geplaatſt in den Handpalm, naa dat men de Vingeren ten halven geboogen heeft; uit een Kringswys Windzel, dat al deezen toefſtel inſluit; en eindelyk uit den Draagband, ter onderſteuning van de Hand en den Voorärm.

§ 1346.

In de gevallen egter, § 1343. beſchreeven, moet hetzelfde niets bevatten, dan den Boekband; twee ſpaanen Spalken met haare Drukdoeken, gelegd langs de binnen en buitenzide van het Deel; een Windzel, ter maatige aanſluiting van alles; en den Armband. De Aderlaating by bloedryken; eene ſchraale Eetregel, verkoelende Geneesmiddelen, en oploſſende Stovingen by allen; moeten in deeze omſtandigheden nimmer verzuimd, en zelfs met de grootſte gezetheid aangewend worden.

*De Ontwrigting van den Duim.**Luxatio
pollicis.*

§ 1347.

De Duim ontwrigt, of in de vereeniging van deſzelfs eerſte Kootje met het groot veelhoekig Beentje der Voorhand; of in de ſaamenleeding van dit met het tweede; of in die van het laaſte met het derde.

§ 1348.

De eerste deezer Ontwrigtingen geschied doorgaans, om niet te zeggen altoos, naar de zyde der buiging, of uitstrekking. In het eerste geval is de geheele Duim geboogen, en bespeurd men eene verhevenheid aan de eerste, eene inwyking aan de laatste zyde. Ze wordt hersteld, na genoegzaame uitrekkingen, door het Deel te buigen. In het tweede, is de Duim uitgestrekt, wordt de verhevenheid gezien aan de zyde der uitstrekking, de invalling aan die der buiging. De herstelling geschied, na eene zelfde uitstrekking, door de Duim te brengen in den staat eener volstrekte uitstrekking. Men verbind in het een en ander deezer gevallen met een vierhoofdig Drukdoekje, en de Koornäir. De hand wordt geplaatst in den Armband.

§ 1349.

De twee laatste Ontwrigtingen geschieden op dezelfde wyze, en worden gelyk gekend, hersteld, en behandeld. Als deeze, of de voorige, gelyk dikmaals gebeurd, verzeld zyn van Zwellings, Spanning, Uitstorting, en dergelyken, moet men den Lyder niet kwellen met het herstellen der Ontwrigting, die in deeze gevallen gevaarlyk zyn kan, maar altoorens gebruik maaken van die Hulpmiddelen welke deeze toevallen kunnen wegneemen.

*Luxatio
phalangum
digitorum
manus.*

De Ontwrigting van de Kootjes der Vingeren.

§ 1350.

Het eerste Kootje der Vingeren, vooräl van den Wysvinger en de Pink, kan ontwrigten van het overeenstemmend Nahandsbeen, naar alle zyden. De overige Kootjes ontwrigten voornaamlyk buiten en binnenwaards, zelden terzyden, en mischien niet anders dan met verscheuring der Banden.

§ 1351.

De herstelling geschied, na genoegzaame uitrekking, door het verplaatste eind zagtelyk te drukken naar de tegengestelde zyde der uitwyking. Het verband bestaat uit twee langwerpige Drukdoeken, voorzien met tusschengelegde even lange en breede stukken kaart papier, geplaatst langs de zyde der Ontwrigting, en daar tegenöver; uit eene Drukdoek ter opvulling van de Hand; en een kringwys Windzel van genoegzaame lengte, ter bevestiging van alles.

De

*De Ontwrigting van den Dye.**Luxatio
femoris.*

§ 1352.

De Dye Ontwrigt nooit anders dan onder en binnewaards; maar na de Ontwrigting, blijft het hoofd des Dyebeens staan op het eironde gat des Ongenaamde Beens; of verplaatst zig naar binnen en boven, tegen het Schaambeen; naar buiten en onderen, tegen de zyde van den knobbel des Zitbeens; of naar boven en buiten, tegen de vlakke van het Heupbeen.

§ 1353.

Elk deezer Ontwrigtingen, heeft haare foortonderscheidende kenmerken, welke met de meeste zorgvuldigheid moeten in agt genomen worden; om dat in sommige gevallen, de behandeling hier van grootelyks afhangt.

§ 1354.

Als de Dye beneden en binnenwaards ontwrigt is, vind men het Ontwrigte Been langer dan het gezonde; de Knie eenigzints verheven; deeze en de voet buitenwaards gekeerd; de hoofden van de tweehoofdige Spier gespannen; de Bilplooilaager dan natuurlyk, en in haar midden Stomphoekig geboogen; de Hiel eenigermaten verlengd naar beneden; de groote Draijer laager dan ze zyn moet; en de Dye buitenwaards afgeweeken. De voortgaande beweging daarënboven, is in den eersten tyd onmooglyk; en geschied vervolgens door het beschryven eener halve kring met den Voet.

§ 1355.

In de binnen en bovenwaardsche Ontwrigting, is de Liefch bezet met eene harde Zwelling, gemaakt door het hoofd des Dyebeens; het Been en de Voet staan meer buitenwaards dan in het vorige geval; de Dye is uitgestrekt en korter dan natuurlyk; de groote draijer bevindt zig hooger dan die der gezonde zyde; de Dye kan niet dan met veel pyn geboogen worden; de Bilplooistrekt zig byna regtlynig uit van binnen naar buiten; de Balzak by Mannen, en de Lippen der Schamelheid by Vrouwen, zyn meestal gezwollen; de ontlasting der Pis is belemmerd; het gantsche Deel eindelyk, by gebrek van herstelling, vermagerd, en wordt meer of min onvermoogend ter beweging.

§ 1356.

Als de Ontwrigting geschied is naar buiten en beneden, is de Knie, het Been, en de Voet gekeerd naar binnen; de Dye kan niet, zonder veel pyn te veröorzaken, buitenwaards gebragt worden; het Been is verlengd in een staanden, en verkort in een liggenden stand; de Bil der ontwrigte zyde is dikker dan die der gezonde; de groote draijer is eenigzints gezakt naar beneden, en de Bilplooï hooger dan natuurlyk; de Dye daarënboven, gelyk ook het Been en de Voet, ondergaan eenen zekeren graad van Stompgevoeligheid.

§ 1357.

In het geval eindelyk eener buiten- en opwaardsche Ontwrigting, is de Dye, de Knie, het Been, en de Voet, meer binnenwaards gekeerd dan in het voorige; alle deeze Deelen kunnen, nog uitgestrekt, nog buitenwaards gebragt worden; het Been is geboogen; de Bil verdikt, de Bilplooï opgereezen, en den Lyder kan niet gaan, dan met behulp van Krukken.

§ 1358.

Men moet ten opzigte van alle deeze verschynzelen, aanmerken, dat sommige derzelver zig aanbieden in eenen staanden stand van het Lighaam, sommige in een liggenden, 't zy op den Rug of den Buik; en men derhalven, om een onbedrieglyk besluit te kunnen maaken, het beleedigd Deel, in alle deeze plaatzingen, en wel met de grootste oplettenheid, onderzoeken moet.

§ 1359.

Hoe ongunstig men altoos gedacht heeft over de geneezing van allerlye Ontwrigtingen des Dyebeens zonder onderscheid; hoe zeer ook deeze gedachten schynen bevestigd te worden door de Ontleedkundige beschouwing van het saamenstel des Heupgewrigts; is het egter even zoo zeeker, dat dezelve, ten opzigte van versche gevallen, door eene uiterlyke oorzaak op eene schiele wyze voortgebragt, geschieden kan zonder nablyvende Mankheid; als het zeeker is, datze van dergelyke oorzaaken kunnen voortkoomen, waar aan insgelyks veele ten onregte getwyffeld hebben.

§ 1360.

De herstelling deezer Ontwrigtingen, en derzelver bevestiging, voor zoo veel alle gevallen betreft welke daar voor vatbaar zyn; verschillen in geen deele van die

die der Breuken van den hals des Dyebeens, en van den grooten Draijer, §. 1239. beschreeven; en geschieden derhalven met het grootste gemak zoo wel, als met de meest mooglyke verzeekering eener goede uitflag. Tot het getal deezer gevallen moet men betrekken, die van §. 1359, en van dezelve uitsluiten, alle die afhanglyk zyn van eene zwelling der Banden, van eene ophooping des Lidvogts, van eene val op den grooten Draijer, en in 't algemeen, die, door welke eene Oorzaak zulks ook zyn mooge, op eene langzaame, en byna onmerkbaare wyze, plaats grypen. In deeze omstandigheden waarlyk, is geene herstelling mooglyk, om dat de oorzaken zelve, in haare werking tot zulk eene hoogte geklommen, onoverwinbaar zyn.

§ 1361.

Dat het egter, in de laatste gevallen niet altoos even zeer onmooglyk is om de Ontwrigting te verhoeden, ben ik zeeker door zeer besliffende en meermaalen herhaalde Proefneemingen. De behandeling bestaat, algemeen genoomen, by Volwassenen in eene langduurige horifontaale ligging; by Kinderen, in het gebruik van eene doorgaande Konstlaars, gehegt aan een dergelyk Keurslyf; en in 't byzonder, in het aanwenden van Genees en Heelkundige Hulpmiddelen, tegengefteld aan de van elders bekende heerschende Oorzaak. Deeze hulpmiddelen, dit moet ik hier als in 't voorbygaan aanmerken, bestaan in het geval eener zwelling der Banden, in het gebruik vooräl van oploffende geefstryke Stovingen, Wryvingen, en Baden: in dat van eene ophooping des Lidvogts, in het aanwenden van waterdryvende Purgeermiddelen, van *diuretica*, van plaatsmiddelen gelyk aan de voorigen, van Blaardragten in den omtrek des gewrigts, van een Bytmiddel ter zelfder plaats; gelyk ook, van dikmaal herhaalde, dog voorzigtiglyk gedaane beweegingen.

*De Ontwrigting van de Knieschyf.**Luxatio patellæ.*

§ 1362.

De Knieschyf, indien men zulks eene Ontwrigting noemen mooge, ontwrigt niet anders dan ter zyden; 't zy binnen- of buitenwaards, op de voorste, of na genoeg de zydelyke oppervlakten van de een of ander der knokkels van het Dyebeen.

§ 1363.

Deeze verplaatzing is zeer kenbaar: ze wordt hersteld door het Been uit te strekken,

ken, en de Knieschyf zydelijk te drukken tot in haare natuurlyke plaatzing. Het Verband is meestal overvloedig, om niet te zeggen, nutloos.

*Luxatio
tibia.*

De Ontwrigting des Scheenbeens.

§ 1364.

Het Scheenbeen kan niet volkoomen ontwrigten van het Dyebeen, dan agterwaards, en in gevolge eener zeer groote verflapping, verbreeking, of verzwearing der Banden. In dit geval ruft de voorrand van het Scheenbeen, tegen de agterste oppervlakte van de knokkels des Dyebeens; heeft het geheele Been eene zeer wanvormige gedaante; en kan de Geneezing, wanneer deeze uit hoofde der byzynde Toevallen noodzaaklyk is, niet verkreegen worden dan door de Afzetting. Ik zegge *wanneer deeze uit hoofde der byzynde Toevallen noodzaaklyk is*; om dat sommige dier Ontwrigtingen, van de eerstgemelde oorzaak afhanglyk, dus langzaam, en met zoo weinig wanördes gebeuren, datze met de meest mooglyke vyligheid aan zig zelve kunnen overgelaaten worden, en niet beletten, dat den Lyder vry gelukkig leve, en alle noodzaaklyke beweegingen verrigte, met gebruik te maaken van eene Stelt, te gelyk stevig, en zagt bekleed aan derzelve boven einde.

§ 1365.

De onvolkoomen Ontwrigtingen dezes Beens, geschieden altoos by wyze van kanteling, aan de eene zyde voor- aan de andere agterwaards; en kunnen geholpen worden, door eene ligte uitrekking, en daar op volgende herzetting van de eenigzints verplaatste beenderen. Dit geval, zoo lang hetzelfde plaats heeft, is zeer pynlyk, en maakt somwylen eenen indruk, die ons verpligt gebruik te maaken van oplosfende, van pynstillende, of van versterkende Hulpmiddelen.

*Luxatio
tarsi.*

De Ontwrigting van den Voorvoet.

§ 1366.

De Voorvoet, dat is te zeggen, de geleeding van het Kootbeen met de Scheen- en Kuitbeenderen, kan ontwrigten voorwaards, agterwaards, en terzyden.

§ 1367.

§ 1367.

De twee eersten zyn de gemeenzaamsten. De beide laaften gebeuren niet dan met verbreeking der onderreinden van het Scheen- en Kuitbeen, of met verscheuring der Zybanden.

§ 1368.

In het eerste geval, te weten in de voorwaardsche Ontwrigting, is de Voet lang, de Hiel kort, het eerstgemelde Deel uitgestrekt, en deszelfs buiging onmooglyk.

§ 1369.

In het tweede bevind men alles omgekeerd, en is de Voet kort, de Hiel lang, de uitstrekking ondoenbaar.

§ 1370.

In de Zydwaardsche Ontwrigtingen eindelyk, kantelt de Voet altoos naar de tegengestelde zyde, en bespeurd men tevens eene Breuk van het Scheen of Kuitbeen, welke wy gezegt hebben dat doorgaans daarmede gepaart gaat.

§ 1371.

Alle deeze Ontwrigtingen zyn zorglyk; de laaften egter zyn zulks meerder dan de eersten. De herstelling geschied, door, na genoegzaame uit- en tegenrekkingen, de uitgeweeke Voorvoetsbeenderen te drukken naar den tegengestelden kant der Ontwrigting, en tegelyk de geheele Voet te buigen, uit te strekken, of zydelings te doen overkantelen, naar dat de Ontwrigting geschied zy, naar vooren, naar agteren, of ter zyden. Het Verband bestaat uit twee langwerpige Drukdoeken ter plaatze van het Gewrigt kruislings gelegd over elkander, en gesteund van een Windzel, 't welk terzelfder plaatze een Cyffer 8 beschryft.

De Ontwrigting der Teenen.

§ 1372.

Alle deeze Ontwrigtingen zyn in het zelfde geval als die van den Duim, en der Vingeren, van § 1347, tot § 1351, beschreeven, en kunnen derhalven, voor zoo veel betreft, haare soorten, kenmerken, en behandeling, uit het gene we daar ter plaatze gezegt hebben, begreepen worden.

*Luxatio
phalangum
digitorum
pedis.*

III. H O O F T D E E L.

De Afwykingen der Beenderen.

§ 1373.

Diastasis. **A**FWYKING DER BEENDEREN, steld eene onderlinge verplaatsing van twee of meer Beenderen, niet door eene losse, en diepe, ondiepe, of Scharniergeleding verbonden met elkander.

§ 1374.

De algemeene oorzaaken derzelver, zyn vry gelyk aan die der Ontwrigtingen. Haare kenmerken, gevolgen, en behandeling integendeel, verschillen grootelyks van die deezer zelfde Gebreken, gelyk ook van elkander, en worden inzonderheid bepaald, door de verschillende natuur zelve der afwyking.

§ 1375.

Zoo veele foorten van afwykingen zyn, die der *Bekkeneelsbeenderen*, der *Neusbeenderen*, der *Saamenstellende Deelen van de Onderkaak by Kinderen*, des *Tongbeens*, van de *Voorëinden der Ribben met haare Kraakbeenderen of het Borstbeen*, des *Zwaardwyze Kraakbeens*, der *Schaambeenderen*, der *Ongenaamde Beenderen van het Hyligbeen*, der *kleine Ellepyp*, der *Voor- en Nahandsbeenderen*, des *Kuitbeens*, en der *Beenderen van den Voor- en Navoet*.

§ 1376.

Elk deezer Afwykingen in het byzonder, zullen we in een evenreedig aantal van Onderdeelingen, met eene gezetheid, overéénkomstig met haar meer of minder aanbelang, voordraagen.

*Diastasis
ossium
cranii.*

De Afwyking der Bekkeneelsbeenderen.

§ 1377.

De Bekkeneelsbeenderen kunnen van een wyken, door eene ontwikkeling der Naaden; en wel op eene schielyke wyze, of allengskens.

§ 1378.

In het eerste geval, is de oorzaak altoos uitwendig, en werkzaam geweest op den

den Naad zelve. Dit geval ook, bestaat zeer zeldzaam, indien ooit, op zig zelve, maar is doorgaans verzeld van eene verbreking der Beenderen, door deeze veréénigt.

§ 1379.

Het laafte kan afhangen van een inwendig Waterhoofd; en tevens, zegt men, van zeer sterke, en lang aanhoudende Hoofdpynen. Ik ben nogthans genoodzaakt het laafte in twyffel te trekken, en zelfs zoo lang te ontkennen, tot eene genoegzaame reeks, van niet dubbelzinnige en getrouwe Waarneemingen, zulks op eene besliffende wyze bevestigen.

§ 1380.

De Naaden, meest aan deeze vaneenwyking onderhevig, zyn de Pyl en Kroonnaaden. De Winkelnraad ondergaat dezelve zeldzaam, en nog zeldzaamer de Schubswyze Naaden. De laaften ook, als ze eene enkele reize in dit geval zyn, zyn zulks op eene gantsch andere wyze, en maaken minder eenen afstand van boven naar beneden, dan wel van binnen naar buiten.

§ 1381.

De kenmerken deezer Afwykingen zyn doorgaans vry blykbaar, vooräl in het geval van Hoofdwonden, en het inwendig Waterhoofd. Het gezigt naamlyk in de eerste, het gevoel in de tweede omftandigheid, doen ons alleen genoegzaam oordeelen, van derzelver bestaan en hoegrootheid.

§ 1382.

De geneezing, die alleen in de twee eerste gevallen mooglyk is, wordt inzonderheid bewerkt door eene van zelfs gebeurende onderlinge nadering der afgeweecken Beenderen, zoo draa alle beletzelen ten dien opzichte zyn weggenoomen. Ze wordt geholpen, door het Hoofd eenigzints fluitend te omvangen met den *Hoofdband van HIPPOCRATES*, of den *Zeshoofdigen Slingerband*.

De Afwyking der Neusbeenderen.

§ 1383.

De afwyking der Neusbeenderen van elkanderen, of van het Voorhoofdsbeen, gebeurd zeer zeldzaam zonder nevensgaande verbreking deezer Beenderen. Men kan hetzelfde zeggen van die met de Kraakbeenderen der Neusvleugels, en met eenige andere Beenderen der Opperkaak

*Diastasis
ossum na-
si.*

R r

§ 1384.

§ 1384.

Hoedaanig ze ook plaats grype, haare kenmerken, gevolgen, en behandeling, zyn altoos gelyk aan die der zoo even gemelde Breuken, en eischen geene byzondere oplettenheden.

*Diastasis
maxilla
inferioris.*

De afwyking der saamenstellende Deelen van de Onderkaak, by Kinderen.

§ 1385.

Deeze is alleen betreklyk tot de kraakbeenige saamenvoeging van de zyde deelen deezes Beens in het midden van de Kin, en wordt somwylen veröorzaakt door een val; meermaalen egter is ze het gevolg van zekere Verloffingen, waarin men genoodzaakt geweest is, één of meer vingeren in den Mond te brengen, om het Hoofd te doen gebooren worden.

§ 1386.

Gemaklyk is het, dit gebrek te kennen, en te herstellen; maar eenigzints moeilyk, om hetzelfde als het hersteld is, te bevestigen. De gewoone Slingersband naamlyk, hier toe meestäl aangepreezen, is van weinig uitwerking, en ligt onderhevig aan verplaatzing; zoo uit hoofde van de geringe uitgestrektheid der Onderkaak, als om de onvermydelyke beweegingen van dit Deel, by het zuigen en schreijen van het Kind. Het is derhalven best, zig te bedienen van twee lange en smalle strooken welklevende dog niet harsächtige Pleister; waar van de eene op de wyze van het verëenigend Verband voor de langwerpige Wonden, dwersch over de Onderkaak wordt aangelegt; en de tweede, van onderen opwaards, langs de zyde deelen der Kaak, en over de Wangen dermaaten gelegd wordt, dat derzelver beide einden elkander kruisfchen op het bovenste gedeelte van het voorhoofd.

*Diastasis
ossis hyoidei.*

De Afwyking des Tongbeens.

§ 1387.

Een der hoornen van het Tongbeen zegt men, kan afwyken van het overeenstemmend verlengzel des Schildwyze Kraakbeens van het Strottenhoofd, en gevolgen hebben die uitermaaten gevaarlyk zyn.

§ 1388.

Derzelver oorzaaken worden inzonderheid gebragt tot eene uiterlyke drukking, en

en het fchielyk doorzwellen van een harde en groote Brok. Haare kentekenen bestaan in een fchielyk voorkoomend onvermoogen om eenigerlye voedzelen door te zwelgen, eene bestendige neiging tot doorflikking, en het gevoeleener kleine harde verhevenheid, die pynlyk is op het aanraaken.

§ 1389.

Wat ook van dit alles zyn mooge; de herstelling wil men dat gedaan kan worden, door de twee voorste Vingeren der eene Hand te plaatzen op, en in de nabijheid van de voorgemelde verhevenheid; door de Wysvinger der andere Hand, langs het zydelyk gedeelte der Tong te brengen tot aan het einde des verlengzel van het Schildwyze Kraakbeen; en eindelyk, door met deezen Vinger het einde des Tongbeens naar beneden te drukken als het opwaards, en met de Vingeren der andere hand zulks te doen naar boven, als het nederwaards is afgeweeken.

*De Afwyking van de voorëinden der Ribben**Diaflasis costarum.*

§ 1390.

De afwyking van de Vooreinden der Ribben met haare Kraakbeenderen, of tegelyk met deeze van de zydelyke indrukzels des Borstbeens, is zeer zeldzaam, en wordt van meest alle Heelkundige Schryvers met stilzwygen voorby gegaan. Ik zoude zeeker het zelfde gedaan hebben, indien my niet de eerste deezer verplaatzingen, met betrekking flegts tot eene enkele Rib, ééns was voorgekoomen, en ik dus verzeekerd was van haare mooglykheid. Het geval is ligt te kennen, uit eene kleine harde verhevenheid ter plaatze der afwyking; word hersteld door eene zachte en tegelyk agterwaardsche drukking te maaken op het einde der Ribbe; en bevestigt door den aanleg eener dikke Drukdoek, het *Verband des Lighaams*, en den *Schouderband*.

De Afwyking van het Zwaardwyze Kraakbeen.

§ 1391.

Diaflasis cartilaginis ensiformis.

Deeze is doorgaans het gevolg eener Val met het voorönderste gedeelte van de Borst, op eenig uitstekend hard Lighaam. Ze veröorzaakt, drukking, of kwetzing van de Maag en der Lever, en hier van ontspruiten, aanhoudende Braakingen, de Hik, Maagpynen, Flauwten, Uitstortingen van Bloed in de Buikholte, met derzelver gevolgen, en dergelyken. Deeze Toevallen, gevoegd by het ge-

voel eener indrukking, ter plaatze der verééniging van dit Kraakbeen met het Borstbeen; en den meer buitenwaardschen stand van deszelfs onderste uiteinde; moet men tevens beschouwen, als de meest beslissende Kenmerken deezer verplaatzing. Derzelve herstelling is moeilyk, en somwylen zelfs onmooglyk, uit hoofde der byzynde Kneuzing, Uitstorting, en Zwelling. Ze wordt beproefd, door de punt van het zwaardwyze Kraakbeen binnenwaards te drukken, en het bovenéinde buitenwaards te brengen, door deszelfs zyranden zoo veel mooglyk zy te vatten tusschen den Duim en Wysvinger. Is deeze behandeling vrugtloos, en zyn de toevallen dringend, alsdan moet men met zeer veel voorzigtigheid, het meergemelde Kraakbeen ontblooten door eene insnyding, en zig van deeze bedienen ter herstelling. In minder gevaarlyke omstandigheden daarën tegen, laat men het geval aan de Natuur over, en beteugeld slegts de Toevallen, door het gebruik van ontlastende, verkoelende, en Pynstillende Geneesmiddelen.

De Afwyking der Ongenaamde Beenderen van het Hyligbeen.

*Diastasis
ossum in-
nominato-
rum ab osse
sacro.*

§ 1392.

De Ongenaamde Beenderen wyken misschien nimmer van het Hyligbeen, dan by Vrouwen, en ingevolge eener zeer moeilyke Verlosfing. Eene tegennatuurlyke beweegbaarheid, Pyn, en kraakend geluid, ter plaatze hunner verééniging, gepaart met onvermoogen in het staan, en de voortgaande beweging, zyn de gewoone Kenmerken deezer afwyking. De herstelling en bevestiging geschieden gelykelyk, en beide op eene langzaame wyze, door eene volstrekte rust in een liggenden stand van het Lighaam; door het Bekken te omvatten, en van tyd tot tyd meerder te vernauwen, met een Kringswys Verband, of met een Staalen Beugel, bekleed met Leder, of met eenige andere zagte zelfstandigheid: en door een aanhoudend gebruik te maaken van versterkende Geneesmiddelen, zoo wel als van dergelyke Stovingen, Baden, en wat dies meer zy.

*Diastasis
ossum
pubis.*

De Afwyking der Schaambeenderen.

§ 1393.

Van deeze moet ik in het weezenlyke alles zeggen, wat ik gezegt hebbe van de vorige. De Oorzaaken, de kenmerken, de gevolgen, en de behandeling, verschillen niet van elkanderen. Het eenige dat hier in aanmerking komt, zyn de plaats-

plaatslyke verschynzelen, die in het vorige geval, aan de agter-zyde deelen van het Bekken, in dit, aan deszelfs voorste gedeelte bespeurd worden, en gemakkelijk van zelve begreepen worden.

§ 1394.

Als een byzonder foort deezer afwyking moet men beschouwen, die afhangt van de doorsnyding der Kraakbeenhegting, in de Konstbewerking van SIGAULT, ter begunstiging eener anderzints onmooglyke Verlossing. In dit geval naamlyk moet men zig bedienen van den Band des Beroemden CAMPERS, die tegelyk de van een geweeken Beenderen by een brengt, en gelegenheid geeft om de gemaakte Wonde, met zeer veel gemak te kunnen verbinden: een Werktuig waarlyk, zoo voortreflyk, als eenvoudig.

De Afwyking van het Staartbeen.

*Diastasis
offis coccy-
gis.*

§ 1395.

DE AFWYKING VAN HET STAARTBEEN, wordt vry algemeen beweerd, dat geschieden kan op tweërlye wyzen, naar buiten naamlyk, en naar binnen; of, om my meer nauwkeurig uit te drukken, naar agteren, of naar vooren.

§ 1396.

Het eerste geval is doorgaans toegeschreeven aan moeilyke Verlossingen, uit hoofde der verbeelde drukking van het hoofd des Kinds, tegen dit Been. Ik kan egter bezwaarlyk gelooven, dat hier van voorbeelden te vinden zyn; en hebbe dezelve ten minsten, voor zoo veel myn geheugen, en myne aantekeningen toedraagen, nog nimmer aangetroffen. Zoo lang ook (dit is eene byzondere aanmerking van voorgenoemden Hoogleeraar) het hoofd bekneld staat, drukt het niet tegen het Staartbeen; en als het doorschiet, is de Verlossing zoo schielyk volëindigt, dat het geen de minste dusdaanig naadeelige werking daar op hebben kan. Mischien egter is het waar, dat de Vroedvrouwen veel hier aan toebrengen, door, met de terugdrukking deezes Beens, de Verlossing te willen verhaasten: dog dit is een geval, 't welk niet op rekening kan gesteld worden van de Verlossing zelve.

§ 1397.

De voorwaardsche Afwyking, is altoos het gevolg van een uiterlyk geweld,

werkende bepaaldelyk op het bovenste gedeelte des Staartbeens. De agterwaardsche moet noodzaaklyk afhangen van eene dergelyke oorzaak, haare kragt inzonderheid oeffenende op den punt van dit Been. Het eerste geval gaat meestäl verzeld met Kneuzing van het peesächtig uitbreidzel der Lenden; en wordt gevolgd, van Ontsteking en Zwellling niet alleen, maar ook veelmaalen van aanmerklyke Verzweeringen. Het laatste, de mooglykheid daar van ondersteld zynde, kan niet anders dan een zeer zeldzaam verschynzel zyn; om reeden, dat het Staartbeen ter deezer plaatze, vry dun en buigbaar zynde, den gemaakten indruk niet schynd te kunnen voortplanten tot aan het bovenstuk, met zoo veel kragt als genoeg zyn zoude om dit van het Hyligbeen te doen afwyken. Dit gebrek derhalven, zal ik aanmerken als de vrugt eener weelderige verbeeldingskragt, die niet verdiend dat we ons een oogenblik daar mede ophouden.

§ 1398.

Dezelfde Afwyking, de voorwaardsche naamlyk, wordt gekend aan de pyn die er is by het hoesten en de ontlasting der uitwerpzelen, vergeleeken met den aart der toegebragte beleediging, en den buitenwaardschen stand van den punt des Staartbeens. De Toevallen welke deeze doorgaans opvolgen, zyn Ontsteking, Verzweering, en Beenbederf.

§ 1399.

Ter herstelling wordt aanbevoolen, het opligten van het inwaards gedrukte gedeelte des Staartbeens, met de Wysvinger der regter Hand te brengen in den Endeldarm, naa dat men dezelve alvorens besmeerd heeft met Olie, Pomade, of dergelyken. Ik hebbe op deeze behandeling niets anders aantemerken, dan datze geschieden moet met veel voorzigtigheid, en men tevens het onderste einde van het Been, met twee of meer vingeren der linker Hand inwaards drukken moet.

§ 1400.

De Verbanden, welke hier doorgaans worden voorgeschreeven, kan ik niet zien dat van eenig nut zyn, dan ter bepaaling der noodig gekeurde aanlegzels, in nevensgaande aanmerklyke Kneuzingen. De rust is noodzaaklyk; gelyk ook eene schraale en weekmaakende Eetregel, of het dikmaalig gebruik van zeer zachte Laxermiddelen. Versterkende Stovingen, Berookingen van denzelfden aart, dergelyke Dampbaden, en het zitten op een doorgaat Kussen, zyn altoos, en zonder een gebepaaling, aanprysbaar.

*De Afwyking der groote en kleine Ellepyp.**Diastasis
radii &
ulnae.*

§ 1401.

Deeze, van sommige gesteld, van anderen tegengesprooken, kan geene plaats grypen, dan aan de zyde der Voorhand, en alleen buiten- of binnenwaards, niet naar vooren of naar agteren. Hoedaanig dezelve ook geschied zy, altoos gaatze gepaart met eene verrekking der Banden; doorgaans ook met eene wyeächtige verzamling in deeze, en de schede der voorbygaande Peezen; en eischt hieröm inzonderheid, oplosfende aanlegzels, matig sluitende verbanden, en eene bestendige rust van het beleedigd Deel.

*De Afwyking der Voor- en Nahandsbeenderen.**Diastasis
offium car-
pi & meta-
carpi.*

§ 1402.

Een of meer der Beenderen van de Voorhand, kunnen door een slag of val, binnen of buitenwaards verplaatst worden. Hetzelfde is waar omtrent die van de Nahand.

§ 1403.

Beide deeze verplaatzingen zyn kenbaar, aan eene meer of min groote en harde verhevenheid aan de zyde der uitwyking, en eene evenreedige holte aan de tegengestelde zyde. Men hersteld dezelve, door eene zachte drukking te maaken op de uitgeweeken Beenderen, na dat men de Hand alvorens, zoo veel mooglyk zy, heeft doen uitrekken. Het Verband bestaat uit twee dikke en vierkante Drukdoeken, nat gemaakt in Azyn en Water bedeed met het *Ammoniakzout*; aangelegt aan de binnen en buitenzyde van de Hand; en gesteund door een Windzel, zoo veel de natuur van het geval toelaat aangeslooten. De Hand en Voorärm, worden geplaatst in den *Armband*; en men voorziet in de mooglyke, of reeds byzynde Toevallen, door de algemeene Middelen, de Leefregel, en dergelyken.

*De Afwyking des Kuitbeens.**Diastasis
fibulae.*

§ 1404.

De Afwyking van het Kuitbeen, is alleen betreklyk tot deszelfs onderfte verëeniging met het Scheenbeen. Ze veröorzaakt veelyds zeer moeilyke Toevallen,
en

en altoos, Pyn, Zwelling, belemmerde beweging van het gewrigt des Voorvoets, en eenen meer buitenwaardschen stand van den buitensten Enklauw. Deeze Toevallen, strekken tevens tot kenmerken van dit gebrek, welks herstelling, noch uit, noch tegenrekkingen vordert, maar flegts eene onderlinge aanëendrukking der beide Beeneinden, door de vlakke hand van den Heelmeeſter. Het verband is gelyk aan dat der ontwrigting van den Voorvoet. De bykoomende Toevallen moeten elk naar zynen aart behandeld worden.

*Diastasis
ossum tar-
si & me-
tatarſi.*

De Afwyking der Beenderen, van den Voor- en Navoet.

§ 1405.

Deeze verschillen in het weezenlyke niet van die der Voor- en Nahandsbeenderen §. 1402 en 1403. beſchreeven. Alles derhalven wat ik daar ter plaatze hebbe aangemerkt, kan men hier op toepaſſen; met die bepaaling nogthans, dat de verplaatzing daar we nu van ſpreken, geſchied op of nederwaards, daarze in het voorige gebrek altoos naar buiten of naar binnen plaats grypt.

IV. H O O F T D E E L.

*Degenera-
tiones ſub-
ſtantiarum
oſſium.*

De Ontäartingen van de zelfſtandigheid der Beenderen.

§ 1406.

Onder deezen naam begrype ik alle veränderingen van het natuurlyk ſaamenſtel der Beenderen, zoo ten aanzien van derzelve vastheid, rigting, omtrek, en oppervlakte; als ten opzigte van den ſaamenhang hunner deelen, en gevoeligheid; voor zoo veel naamlyk, als elk dier veränderingen, niet enkel afhanglyk is van eene uiterlyke oorzaak.

§ 1407.

Tot de Klasſe van deezen derhalven, behooren, de *broosheid der Beenderen*, derzelve *Weekwording*, de *Engelsche Ziekte*, de *Beenknobbels*, de *Zwelling der Beeneinden*, de *Winddoorn*, het *Vleesch-beengezwel*, het *Beenbederf*, de *Tak en Bladwyze verhevenheden der Beenderen*, de *vermindering hunner zelfſtandigheid door opneeming van Beenſtof*, en de *Beenpynen*.

§ 1408.

§ 1408.

Wy zullen onder de volgende Opschriften, elk deezer veranderingen, in haare meest weezenlyke byzonderheden voordraagen.

*De Broosheid der Beenderen.**Fragilitas
ossum.*

§ 1409.

De BROOSHEID DER BEENDEREN ondersteld zulk eene geringe kragt van aanëenhang in derzelver saamenstellende Deelen, datze of door de onvermydelyke Levensbeweegingen, of door eenig zeer gering uiterlyk geweld, verbrooken worden.

§ 1410.

Dit gebrek kan afhangen van eene gebreklyke Voeding; van eene te kleine hoeveelheid, of zieklyke gesteltheid des Mergs; en van eene pokkige, scheurbuikige, of kankerächtige scherpte der Vogten.

§ 1411.

Somwylen wordt niet meer dan een enkel Been, door deeze Ziekte aangetast; somwylen, en dit zelfs is wel het gemeenzaamst, verspreid ze zig gelykelyk over alle, of immers de meeste Beenderen van een zelfde Voorwerp.

§ 1412.

Derzelver Kenmerken, beruften alleenlyk op de waarneeming der Beenbreuken daar van afhanglyk; dat is te zeggen, dat 'er geene zyn uit welke men tot haar bestaan besluiten kan, dan de voortkomst eener Beenbreuk, ingevolge eener nauwlyks merkbaare oorzaak.

§ 1413.

Omtrent de Geneezing moet men aanmerken, dat dezelve altoos buitengemeen bezwaarlyk, en in zeer veele gevallen zelfs, geheel onverkrygbaar is. Algemeen genoomen, behoord de behandeling te worden ingerigt overëenkomstig de van elders bekende oorzaak, die men met de meest mooglyke zorgvuldigheid moet naarspooren. Dat in het geval der eerste oorzaak, § 1410. aangewezen, eene voedende en verkwikkende Eetregel; in dat der tweede, de toediening van flymige, gelyeächtige, en vette Voedzelen; in het geval der drie laatten, het ge-

bruik der meest aangepreezen foortelyke Geneesmiddelen moet plaats grypen, kan misfchien niet geheel onnut zyn hier by te voegen.

De Weekwording der Beenderen.

§ 1414.

*Mollitiis
offium.*

WEEKWORDING DER BEENDEREN, betekend die ontäarting derzelver, welke haar buiten de mooglykheid fteeld, om zonder buiging, of verbreeking, te weêrftaan aan de werking der Spieren, aan die der zwaarte van het Lighaam, of aan eenig uiterlyk vermoogen, daar op toegepaf.

§ 1415.

De Oorzaaken deezer Ziekte kunnen met geen de minfte zekerheid bepaald worden. Alles waarlyk, wat men hier van immer gezegt heeft, beruft enkel op onderftellingen, gemaakt en verbreid van fommige, en twyffelächtig befchouwd of weêrftrooken van anderen.

§ 1416.

Meeftäl wordt dezelve voorgegaan, van zeer fterke en aanhoudende Pynen, dan eens met, dan eens zonder, eenige blykbaare ongefteeltheit des Lighaams. Eens begonnen zynde, maaktze of langzaame, of haafte vorderingen; en klimd fomtyds tot zulk eene hoogte, datze een Mensch van gewoone, of meerder lengte, veränderd in een Dwerg van vier of minder Voeten.

§ 1417.

Zoo weinig als we de oorzaaken deezer Beensverbaftering kennen, zoo weinig zyn ons ook bekend derzelver foortelyke Hulpmiddelen. Dezulken, welke en door redeneering, en door proefneemingen, ons als de befte toefchynen, zyn de Braak- en Purgeermiddelen, de Koortsbaft, en de bereidzelen van het Yzer, inwendig; en uiterlyk, de Blaar- en Etterdragten, benevens geeftryke Waffingen, Speceryächtige Smeerzels, drooge Wryvingen, en dergelyken.

§ 1418.

In het geval van een blykbaar Pokfmet, of eener Scheurbuikige ongefteeltheit der Vogten, kunnen de gewoone hulpmiddelen deezer Ziekten, verëenigd worden met de voorige, voor zoo veel derzelver natuur zulks toelaat, om te meer
der

der te voldoen aan eene hoop van geneezing, welke ongelukkig, maar al te veel te loor gesteld wordt.

De Engelsche Ziekte.

§ 1419.

De ENGELSCH E ZIEKTE, is byzonder eigen aan Kinderen in de Noorde-lyke deelen van Europa. Ze tast dezelve nimmer aan beneden den ouderdom van zes Maanden; en duurd zeldzaam langer dan tot die van tien Jaaren. Altoos is dezelve gegrond op eene Weekwording der Beenderen, afhanglyk van oorzaken, welke we niet kennen dan in haare uitwerkzelen.

Rachitis.

§ 1420.

Deeze Ziekte heeft twee Tydperken, welken men nauwkeurg moet onderscheiden van elkanderen, en die elk op zig zelve, haare eigen en soortönderscheidende Verschynzelen insluiten.

§ 1421.

In het eerste Tydperk, wordt de Huid langs de gantsche uitgestrektheid van het Lighaam slap; het Hoofd en de Buik vergrooten in haaren omtrek meerder dan de overige Deelen; de eerste vlugheid des Lighaams, wordt vervangen door Zwakheid en Vadzigheid; de Ledemaaten, hoe veel voedsel de Kinderen ook gebruiken moogen, vermageren meer dan ze aanwinnen; de Tand en koomen zeer traag te voorschyn; de Spraak blyft agterlyk; en 'er wordt meestäl eene moeilyke Ademhaaling, en aanhoudend Sluipkoortsje waargenoomen.

§ 1422.

In het tweede Tydperk zyn alie voorgemelde Verschynzelen, of immers de meeste derzelver aanwezig; en koomen 'er van tyd tot tyd by, doorbuigingen van het Lighaam der lange, vooral der Dye. Scheen- en Kuitbeenderen, Uitzettingen van de einden deezer zelfde Beenderen, van die der Ribben aan de zyde van het Borstbeen, en met één woord van alle; Kromwordingen van den Ruggraat naar deeze of geene Zyde, of naar agteren; gelyk ook, als zoo veele voorbooden van een slegt uiteinde. Bloedvlekken verspreid langs de oppervlakte van het Lighaam, veelvuldige Neusbloedigen, en Teering.

§ 1423.

De Geneezing is fomwylen mooglyk in het eerste Tydperk; fomwylen ook in het tweede; als naamlyk hierin niet gezien worden de drie laastgemelde Verschynzelen, of eenige andere, van hetzelfde aanbelang.

§ 1424.

De beste Behandeling in het eerste geval, bestaat daar in; dat men nu en dan den Buik zuivere met middelen, welke den Darmbuis niet verzwakken, nog veel beweging maaken in het Lighaam; dat men daaglyks geeve twee poeijers van een mengzel, dat ik ter zyner plaatze, onder den naam van *Poeijer voor de Engelsche Ziekte* zal mededeelen; dat men de Eetregel bepaale, tot drooge, verkwikkende, en versterkende Voedzelen, zoo in de gedaante van Spyzen, als van Dranken; dat men het Kind doe slaapen op een Bedde van *Eikenvaaren*; dat men hetzelfde, in eene drooge Lucht, op deeze of gene wyze, dat is te zeggen, door Wandeling, of Ryden, veel beweging geeve; en eindelyk, dat men de oppervlakte des Lighaams, daaglyks wryve met Wolle Doeken, doortrokken met den damp van Speceryächtige Middelen.

§ 1425.

In het tweede geval, moet men gebruik maaken van even deeze zelfde Hulpmiddelen; en daarënboven van een *Konst-Keurslyf*, ter bepaaling van den Ruggraat; en van *Konstlaarzen*, ter regting van de doorbuigende Dye. Scheen. en Kuitbeenderen.

§ 1426.

In de te vooren gemelde drie laaste omstandigheden, zyn alle die Middelen doorgaans vrugtloos; is den Dood des Lyders na genoeg zeeker; en moet men denzelven enkel onderwerpen aan eene zagte, voedende, en zuurtemperende Eetregel.

De Beenknobbels.

§ 1427.

Exostoses.

BEENKNOBBELS noemt men in 't algemeen, alle die Gezwellen, welke slegts een meer of min bepaald gedeelte der Beenderen inneemen, en zig uitwendig, onder de gedaante eener harde, onindrukbaare, en nauwkeurig omschreeven Zwelling aanbieden.

§ 1428.

§ 1428.

Deeze bepaaling heeft veele onvolkoomenheden; en verplicht onder anderen, tot eene uitbreiding van den lyft der Ziekten, buiten eenige noodzaaklykheid, en dus ook onbestaanbaar met de wetten eener goede Leerwyze.

§ 1429.

Wy zullen om deeze reeden, dezelve, alsöf ze nimmer gemaakt ware, voorby gaan; en de *Beenknobbels* beschouwen, meer in overëenkomst met haare wezenlyke hoedaanigheden, dan met die haarer meestäl toevallige omstandigheden, op welke inzonderheid, deeze zelfde Bepaaling gegrond is.

§ 1430.

Door *Beenknobbel* derhalven, verftaa ik alle uitzetting, alle zwelling der Beenderen zonder onderscheid, welke gedaante, vastheid, plaatzing, uitgebreithed, en oorzaaken, dezelve ook hebben mooge. Ik onderscheide haar eenvoudig in twee hoofdzoorten; in *Waare* naamlyk, en *Onwaare*.

§ 1431.

De WAARE BEENKNOBBELS, zyn of vast, en zoo hard, of harder dan ^{*Exostoses verae*} het Been zelve; of celächtig, en slegts met eene dunne, en vaste Beenkorf omtoogen. Dezelve bepaalen zig binnen eenen zekeren omtrek, aan het buitenste of binnenste gedeelte der Beenderen; of zyn uitgebreid langs derzelver geheele uitgestrektheid, en zelfstandigheid.

§ 1432.

De ONWAARE zyn minder hard dan de Beenderen zelve, en uit dien hoofde, ^{*Exostoses spuriae*} eenigzints, hoewel weinig indrukbaar. Ze bepaalen zig meestal tot het midden der Beenderen, en gaan doorgaans, zooniet altoos, verzeld van de gewoone kenmerken der Venusziekte.

§ 1433.

Beide deeze foorten van Beenknobbels; ik wil zeggen, de Waare en de Onwaare, verschillen daarin van elkanderen, dat de eerste kunnen zyn, of goedäartig, of kwaadäartig, en de laaste altoos behooren tot de Klasse der tweede.

§ 1434.

*Exostoses
benigne.*

GOEDAARTIGE BEENKNOBBELS noeme ik dezulke, welke niet afhangen van eene ongesteltheit der Vogten, onpynlyk zyn, een bepaald gedeelte slegts van een Been innemen, en geenerlye Wanördes in het overige des Beens, of in de zagte Deelen welke het Been bedekken, veröorzaaken. De aangebooren Beenknobbels derhalven; dezulke welke in een anderzints gezond gestel, zonder eenige blykbaare oorzaak voortkoomen, of het gevolg zyn eener voorgaande uiterlyke belediging; die eindelyk welke afhangen van eene nederzetting der stof van eenigerlye heete Ziekte, door de Natuur of Konst weder naar elders afgeleid, of uitgeworpen; kunnen alle tot deezen gebragt worden.

§ 1435.

*Exostoses
maligne.*

KWAADAARTIGE BEENKNOBBELS zyn, die het grootste gedeelte, of de gantsche uitgestrektheid van een Been inneemen; haaren oorsprong ontleenen uit eene zeer groote Ontsteking en Veröttering in het Celwyze gedeelte des Beens, of uit eene algemeene scherpte der Vogten; en die daarenboven verzeld zyn van eenige andere, 't zy plaatslyke, 't zy algemeene Wanördes. Tot de Klasse van deeze kunnen dus gebragt worden, de Beenknobbels, veröorzaakt door nederzetting eener Ziekte stof, welke men niet heeft kunnen afleiden nog uitwerpen; dezulke welke gemaakt worden in het Scheurbuik, de Venusziekte, en in eene Kropzeerige gesteltheit; gelyk ook die gene, welke aanmerklyke Pynen veröorzaaken, of verzeld zyn van Ontsteking, Verzweering, Beenbederf, en dergelyke.

§ 1436.

Een ander verschil, gemeen aan alle Beenknobbels zonder onderscheid, is, dat sommige *Versch* zyn, anderen *Verönderd*. Dit verschil, en het voorige, zyn beide weezenlyk, en bepaalen met elkanderen, de mooglykheid of onmooglykheid, het gemak of de moeilykheid, de gedeeltelyke of geheele Geneezing, en dus ook de Voorzegging van alles, wat men te vreezen, of te hoopen heeft.

§ 1437.

De Behandeling, beruist insgelyks op dezelfde verscheidenheden; dat is te zeggen, datze in alle gevallen moet overéenkoomen, met de Natuur, de Oorzaken, de duuring, en de toevallige Omstandigheden der Beenknobbels. De volgende byzonderheden, koomen hier omtrent voornaamlyk in aanmerking.

§ 1338.

§ 1438.

De *Aangehooren Beenknobbels*, hoedaanig deeze ook zyn moogen, moet men niet aanraaken, maar geheel overlaaten aan de befliffing der Natuur. Deeze naamlyk is dit eigen, datze met het Lighaam, tot eene zekere grootte aanwaffchen, en vervolgens onveränderlyk dus blyven tot aan den eindpaal des Levens. Ik fpreeke in dit alles by Ondervinding; en beroepe my ten dien opzigte, op een zeer fchoon geval van dien aart, door my by eene Tagtig Jaarige Vrouw waargenoomen, en thans beruftende in het uitmuntend Cabinet des grooten CAMPERS.

§ 1439.

Het zelfde is waar, omtrent alle goedäartige Beenknobbels zonder onderscheid, van welk eene oorzaak zy ook afhangen; mits egter dat deeze geweeken zyn, en de Beenknobbel zig bevind in haaren ftaat van volkoomenheid.

§ 1440.

In zulke deezer Gebreken integendeel, waarin de oorzaak nog aanhoudt te werken, en de uitzetting dienvolgens, van tyd tot tyd toeneemt, moet men de eerften op alle mooglyke wyzen te keer gaan, door het aanwenden van Geneesmiddelen tegengefteld aan deeze, en de laaften tragten te bepaalen, door eene regelmaatige Heelkundige behandeling. Tot de eerften behooren, in het geval eener fchynbaar volkoomen Gezondheid, eene ftrengte Eetregel, de Aderlating, en dikmaal herhaalde Buikzuiveringen: in het geval eener uiterlyke beleediging, dezelfde Hulpmiddelen, dezelfde Eetregel: in dat eener nederzetting der ftof van eenigerlye haaftige Ziekte, verdunnende, verkoelende, Buikzuiverende, doorwaaszemende, en Waterdryvende Geneesmiddelen. Tot de laafte kan men betrekken, het gebruik inzonderheid, van faamentrekkende, terugdryvende, of oploffende Plaatsmiddelen, en van fluitende Verbanden.

§ 1441.

Beenknobbels, afhanglyk van eene groote Ontfteking of Verëttering in het Celwyze gedeelte der Beenderen, in het Mergvlies, of in het Beenvlies, behooren behandeld te worden, eerft met ontlaftende, verdunnende, verkoelende, en oploffende Hulpmiddelen, zoo uit als inwendig toegediend; en vervolgens inwendig, met de *Koortsbaft* en den *Geeft van Koperrood*; uitwendig met zagtelyk prikkelende, en Speceryächtige Aanlegzels, in de gedaante inzonderheid van Pappen.

Als

Als by deeze, de dekkende zagte Deelen mede in Verzweering vallen, moeten die Verzweeringen door eene ruime insnyding geöpent worden, om eene vrije ontlasting te geeven aan den ingeslooten Etter. Het ontbloote en uitgezette, of ook tevens verzworeen gedeelte des Beens, in dit geval, verbind men of droog, of met Balzemächtige Heelmiddelen.

§ 1441.

Dat foort van Kwaadäartige Beenknobbels eindelyk, welke door eene Scheur-
buikige, Kropzeerige, of Pokkige ongesteltheid der Vogten worden voortge-
bragt, erkennen geene andere Geneeswyze, dan die bestaat in het aanwenden van
Hulpmiddelen, tegengesteid aan de heerschende, en van elders bekende Vogts-
verbaftering. De meest geneesbaare van deezen, zyn de Pokkige; doorgaans,
Tophi. hoewel zeer onëigen, onder den naam van KALKBUILEN beschreeven.

De Zwelling der Beenen.

*Intumes-
centia ex-
tremita-
tum osium*

§ 1442.

Deeze bestaat zeldzaam op zig zelve, maar is doorgaans afhanglyk van Engel-
sche Ziekte, of Poksmet. Eene zeer groote Kneuzing der Gewrigten egter, kan
dezelve insgelyks voortbrengen.

§ 1443.

Haare behandeling kan in de twee eerste gevallen ontleend worden, uit die
der Engelsche Ziekte, en der Pokkige Beenknobbels. In het laaste geval bestaat
dezelve inzonderheid, in den aanleg van Geestryke oplofende Plaatsmiddelen,
en welsluitende Verbanden.

De Winddoorn.

§ 1444.

*Spin-
tosa.*

WINDDOORN, betekend eene Zwelling van de einden der lange Beenderen,
of van eenig Sponsächtig Beendeel in het algemeen, afhanglyk van eene oorzaak,
in het binnenste des Beens zelve, huisvestende.

§ 1445.

Kinderen zyn aan dit Gebrek meer onderhevig dan Volwassene. De reeden
hier

hier van moet gezogt worden, in de minder vastheid hunner Beenderen, en het grooter aantal van Vaten, door dezelve verspreid.

§ 1446.

De afgelegen oorzaken kunnen niet in alle gevallen met zekerheid bepaald worden. Somwylen egter schynd het, dat dezelve bestaan in eene Kropzeerige of Pokkige ongesteltheid der Vogten; eene erflyke gesteltheid; terug gedreeven Schurft, Hoofdzeer, of andere Huidziekten; en zelfs in eene nederzetting van de stof der Kinderziekte; van eenige andere koortsächtige Ziekte met uitslag; en dergelyken.

§ 1447.

De kenmerken zyn verschillend, naar dat het gebrek zelve zig bevind in deeze of gene van deszelfs drie Tydperken; het begin naamlyk, staat, of doorbraak.

§ 1448.

Die van het eerste Tydperk, bestaan enkel in eene diepe en scherpe Beenpyn, die door de warmte van het Lighaam al, door uiterlyke aanraaking, niet, vermeerderd wordt, zonder eenige de minste nevensgaande zwelling.

§ 1449.

Die van het tweede Tydperk, zyn eene gedeeltelyk harde, gedeeltelyk zagtere Zwelling, ter plaatze voornaamlyk der Beenpyn; en het verminderen deezer in evenreedigheid van het toeneemen der Zwelling.

§ 1450.

Tot die eindelyk van het laaste Tydperk, behooren de doorbraak des Gezwels met een of meer kleine openingen, welke meestäl veel Vogt uitwerpen, zonder het Gezwel zelve eenigzints te doen verminderen, en zeer genegen zyn tot eene Sponsächtige uitgroeiing van Vleesch; gelyk ook, eene ongelyke oppervlakte van het Been in den grond der Verzweering, kenbaar somwylen door het Gezicht, somwylen alleenlyk, door het onderzoek met een Tent-Yzer.

§ 1451.

De Geneezing is somwylen mooglyk, somwylen onmooglyk. Ze is altoos, meer een Gewrogt der Natuur, dan van de Konst. De beste Behandeling bestaat

misschien daarin, dat men de Levenskrachten, die doorgaans in deze Ziekte zwak zyn, zoo veel mooglyk ondersteune, en zelfs opwakkere, door het gebruik van den Koortsbast; de Vogten verzagte, door eene geschikte Eetregel, en het toedienen der verdikte uittreksels van het *Guajachout*, en der *Sarsaparille Wortel*; en uitwendig, in het eerste Tydperk, gebruik maake van verzagtende, in het tweede van deze en eenigzints prikkelende, en in het derde van versterkende, bederfweerende. en Balzemagtige Hulpmiddelen.

Het Beenbederf.

§ 1452.

Caries.

Door BEENBEDERF, verstaat men die ontäarting van de Zelfstandigheid der Beenderen, welke zeer wel kan vergeleeken worden by eene beginnende Versterving der zachte Deelen, mits dat dezelve haaren oorsprong neemt, aan de buitenste oppervlakte der Beenderen.

§ 1453.

De Oorzaaken deezer ontäarting, zyn somwylen uitwendig, somwylen inwendig. Tot de eerste behooren, de Wonden, Zweeren, en Kneuzingen die tot in of aan het Been doordringen, of alleen het Beenvlies beleedigen, op eene wyze, welke deszelfs geheelheid verbreekt, de omloop der Vogten door de Vaten van hetzelfde vernietigt, of het geheel doet afscheiden van de buitenste oppervlakte der Beenderen. Tot de laatste kan men inzonderheid betrekken, de eigen Ontsteking en Verzweering van het voorgemelde Vlies; gelyk ook, eene Scheurbuikige, Kropzeerige, Pokkige, of Kankeragtige scherpte der Vogten.

§ 1454.

Deszelfs kenmerken verschillen, naar het verschil zelve des Beenbederfs, zoo wel, als naar deszelfs verschillende Tydperken, en den staat der zachte Deelen in den omtrek des Beens geleege.

§ 1455.

Niet alle Beenbederf naamlyk, is gelyk aan zigzelve, maar dan eens *droog*, dan eens *vogtig* en als doorknaagd van de Wormen. Somwylen is hetzelfde *eenvoudig*, somwylen *saamengesteld*. Dan eens bevindt zig hetzelfde in zyn *begin*.
dan

dan eens in zyn *staat*, dan eens in zyne *afscheiding*. Somtyds is het *bedekt door de zachte Deelen* welke het Been natuurlyker wyze omringen, of *door sponsagtig Vleesch*: somwylen vertoond het zig vry, en geheel ontbloot van alles, aan het onderzoek der Zintuigen. Alle deeze veranderingen geeven haare byzondere verschynzelen.

§ 1456.

In het DROOGE BEENBEDERF, veranderd de effenheid en vastheid van het Been weinig; is de hoeveelheid van het uitvloejend Vogt, als 'er eene Verzwearing by is, gering; en blyft de kleur des Beens, in het eerste en tweede Tydperk van het gebrek, vry natuurlyk, maar wordt geel, en bruin, by het naderen der Afichilfering. *Caries sicca.*

§ 1457.

In het VOGTIG BEENBEDERF, is de uitvloed van een dun, geelverwig, en rot Stinkvogt, zeer aanmerklyk; het Been als doorboord met ontallyk vele kleine gaatjes; en de natuurlyke kleur van deszelfs sponsagtige Zelfstandigheid die bloot ligt, weinig, of geheel niet veranderd. Somwylen egter, zyn voorgemelde gaatjes niet zeer kenbaar, om datze met een sponsagtig Vleesch zyn opgevuld. *Caries humida.*

§ 1458.

Het EENVOUDIG BEENBEDERF, volgt altoos op eene Wonde, Kneuzing, of Verzwearing. De kleur van het Been in dit geval, is eerst wit, en vervolgens geel, bruin, en zwart. Meestäl dekt hetzelfde ligtelyk met een los, sponsagtig, en ligt bloedend Vleesch. Somwylen zelfs geneest de Wond of Verzwearing geheelyk, maar met een Lidteken, dat eenigzints miskeurig, los, verheven, en altoos onbestendig is. *Caries simplex.*

§ 1459.

Het SAAMENGESTELD BEENBEDERF, heeft geene bepaalde kenmerken, maar moet meerendeels onderscheiden worden, door de eigen verschynzelen der Ziektens, welke de saamengesteldheid uitmaaken. Men ontleene derhalven deeze, uit de Beschryving der Scheurbuik, van het Koningszeer, de Venusziekte, de Kanker, de Beenknobbels, en dergelyke; gedeeltelyk in dit Werk, gedeeltelyk in Geneeskundige Schriften voorkoomende. *Caries complicata.*

§ 1460.

In een *beginnend Beenbederf*, wykt de kleur des Beens weinig af van het natuurlyke; is de hoeveelheid van het uitvloeiend Vogt niet zeer onevenreedig aan de blykbaare uitgestrektheid der nevensgaande Verzweering; en bevind men de gewoone vastheid en effenheid der buitenste oppervlakte van het blootliggend Beendeel, geheel niet, of immers nauwlyks, verandert.

§ 1461.

Het *Beenbederf*, in *zynen staat* zynde, vind men doorgaans het Been bruin of zwart, de uitvloed van Vogt in eene groote hoeveelheid, en de effenheid, en vastheid van hetzelfde, meer of min afwykend van de natuurlyke.

§ 1462.

In het *scheidend Beenbederf*, blyven alle verschynzelen van het voorige, dezelve; gevoeld den Lyder altoos eenige vermeerdering van stekende Pynen; en bespeurd men vervolgens, eene zekere opryzing van het blootliggend Beendeel, of van den geheelen grond der Zweer; gevolgd van eene buitenwaardskeering der randen van het eerste, of van het uitsteeken eener Beenpunt.

§ 1463.

Zoo lang het *Beenbederf* gedekt blyft van de zachte Deelen, is het zeer moeilyk, om over deszelfs bestaan te oordeelen. Diepe, en scherpe Pynen egter, gevoegd by eene miskleurige, eenigzints lugtägtige, en somwylen deegägtige Zwelling; als ook de gewoone verschynzelen van deeze of gene Vogtsverbastering; of de kennis van eenige uiterlyke en genoegzaame voorgaande beleediging, kunnen eenig Licht verspreiden in deeze duisternis.

§ 1464.

Het *Beenbederf* gedekt met sponsagtig Vleesch, geeft altoos eene groote ontlasting van Etter, van eene etterägtige Stof, of van een miskleurig, en waterägtig Stinkvogt. Een Tentyzer daarenboven, door dit Vleesch gebragt tot aan het Been, onderrigt ons geheellyk van deszelfs aanzyn, door ons de ontbloote, ruuwe, en oneffen oppervlakte des Beens te doen waarneemen. In dit soort van *Beenbederf* ondertuffchen, gebeurt het somwylen, dat men uitwendig niets anders waarneemt, dan eene zeer kleine tepelagtige of blaaswyze verhevenheid, welke dagelyks eene
aan-

aanmerklyke veelheid van een dun en waterächtig Vogt laat uitvloeijen. Deeze byzonderheid, die ik niet weete dat door iemand is opgemerkt, fchynt zoo gering als ze gewigtig is, en zou, alsze wel wierd in agt genoomen, het getal der lekkingen van een geöpent Watervat, waar voor men het meeftäl aanziet, grootelyks doen verminderen.

§ 1465.

Als eindelyk, het *Beenbederf bloot ligt*, en uit dien hoofde vatbaar is voor het onderzoek des Gezigts, zynwe zeeker van deszelfs aanweezen, door de blykbaare verandering van de natuurlyke kleur der Beenderen, in eene dood witte, geele, bruine, of zwarte. De gewoone effenheid der oppervlakte van hetzelfde, daarenboven, vind men in dit geval, doorgaans veranderd.

§ 1466.

Uit alles wat ik van §. 1452, tot hier toe, omtrent de kenmerken des *Beenbederfs* gezegt hebbe, blykt het ten fterkften, dat ik weinig werks maake, van de zoogenaamde algemeene verfchynzelen deezes Gebreks, by de meeste Schryvers met zeer veel gezetheid aangewezen. De reeden hier van is, dat dezelve, agtervolgens myne ondervindingen, zeer zeldzaam dus plaats hebben; dat is te zeggen, dat niet altoos het verband zwart aanflaat; de reuk van het uitvloeiend Vogt rottig is; het Been gedekt wordt met een fponsagtig en ligt bloedend Vleefch; of de Verzweering dan eens toeheelt, dan weder open breekt; maar dat fomwylen deeze, fomwylen gene verfchynzelen gezien worden, en men byna nimmer twee gevallen zal aantreffen, ten deezen opzigte, in alles gelyk aan elkanderen.

§ 1467.

De behandeling des *Beenbederfs*, ruft op dezelfde beginzelen, als deszelfs kenmerken; en moet inzonderheid beäntwoorden, aan den ftaat, de oorzaak, en toevallige omftandigheden des gebreks; gelyk ook, aan den meer of min veranderden ftaat der zagte Deelen, welke het bedorven Been, van rondsomme influiten. Algemeen genoomen, bevat dezelve deeze weinige byzonderheden.

§ 1468.

In alle *Beenbederf* zonder onderfcheid, moet men den voortgang daar van, zoo veel mooglyk zy tragten te bepaalen door eene goede Eetregel; door bederf-

weerende en versterkende Geneesmiddelen; door middelen, tegengesteld aan de van elders bekende oorzaak, als deeze behoord tot eene ontäarting der Vogten; gelyk ook, door bederfweerende, zagtelyk prikkelende, en geestryke, of Balzemagtige Plaatsmiddelen. De Affcheiding van het bedorven Beendeel, die alsdan moet plaats grypen, is vooräl het werk van de Natuur, maar wordt begunstigt, door het opruimen van alle beletzelen welke zig tegen dezelve kunnen aankanten, zoo wel, als door den aanleg, dan eens van drooge en opflorpande Verbanden; dan eens van Heelmiddelen, genoomen uit de Klasse der weezenlyke Ohën, der natuurlyke Balzems, en der wynägtige of scherpzauure Geesten, naa dat het Beenbederf ligt of zwaar, oppervlakkig of diep is, en behoord tot het soort der eenvoudige, drooge, vogtige, of dergelyke.

§ 1469.

Zoo veele, schynbaar kleine, maar inderdaad zeer weezenlyke byzonderheden, in de behandeling des Beenbederfs zyn; dat men niet of zeer weinig gebruik maake van het Tentyzer, onder voorwendzel van zig te verzeekeren omtrent den steeds veranderenden staat van het Been: dat men de Verbanden zoo zeldzaam verandere als mooglyk zy, en maar eenigzints bestaan kan met de hoeveelheid des uitvloeyenden Etters: dat men noch te los, noch te vast, de Verbanden aanfluite, vermits door het eerste gelegenheid gegeven wordt tot weelige uitspattingen, en het laaste de opryzing verhinderd van het bedorven Beendeel, by gelegenheid der Affschilfering: dat men eindelyk, by het wegneemen der Beenschilfers geenerlye geweld gebruike, maar hier mede tot zoo lang vertoeve, dat dezelve geheel en al zyn los gemaakt van het overige des Beens.

§ 1470.

Wat betreft de behandeling van het Beenbederf met daadelyke Brandmiddelen, door sommige Heelmeesters met zoo veel verzeekering aangepreezen; ik ben deeze met stilzwygen voorbygegaan, zoo, om dat dezelve alle schyn heeft van Wreedheid; als om datze byna nimmer aan het oogmerk beantwoord. Ik moet hetzelfde zeggen van de wegbyteling, en uitbooring des bedorven Beendeels, voorgeschreeven inzonderheid, in een zeer uitgestrekt en kwaadäartig Beenbederf der Hersfenpan, van het Borstbeen, en van sommige langronde Beenderen der Ledemaaten; als waar by ik dezelve insgelyks nutloos, om niet te zeggen, schadelyk gevonden hebbe.

§. 1471.

§ 1471.

Geheel anders is het gelegen met de doorbooring des Beens in deeze zelfde gevallen, ter ontlasting van den Etter, onder, en in de holte dier Beenderen opgeflooten. Deeze waarlyk is dikmaalen van de uiterste noodzaaklykheid, en de beste uitwerking, maar behoord niet regtstreeks tot de eigen behandeling van het Beenbederf.

§ 1472.

De onvatbaarheid van het uitgestrekt Beenbederf der Gewrigten voor allerlye Hulpmiddelen, anders dan de Afzetting, ontheft my van de moeite om daarömtrent iets meerder te zeggen, dan ik gezegd hebbe §. 408. van de pypzweeren der Gewrigten, vergezeld gaande van deeze. In een geringer graad dezes Beenbederfs, is het gebruik van vloeibaare Balzemagtige Hulpmiddelen, en eene volstrekte rust van het Deel, aangewezen.

Het Vleesch-Beengezwel.

*Osteo-sar-
cosis.*

§ 1473.

Hier door verstaat men eene plaatslyke, of algemeene uitzetting van eenig Been, gevolgd naar eene voorafgaande weekwording; en bestaande meestäl, van binnen uit eene spons- en vleeschagtige Zelfstandigheid, van buiten uit eene zeer dunne Beenkorst.

§ 1474.

Dit Gebrek ontspruit veelyds uit eene ontäarting der Vogten; is in den beginne nauwlyks kenbaar; gaat doorgaans verzeld van bestendig aanhoudende en zeer grievende Pynen; verkrygt somwylen eene verbaazende uitgestrektheid; verbasterd veelyds in eene waare Beenkreeft; en wordt gevolgd van Sluipkoortzen, Uitteering, en den Dood.

§ 1475.

De Geneezing kan in den beginne beproefd worden door zeer fterk faamentrekkende en versterkende Aanlegzels, gepaart met afleidende, versterkende, en vogtverbeterende Geneesmiddelen. In het vervolg is dezelve onmooglyk, en de afzetting des Deels, dezelve door geene andere omstandigheden verbooden zyn-
de, het eenig Hulpmiddel.

De

*Inequita-
tes ossium,
in modum
ramorum
& folio-
rum ex-
stantes.*

✓ *De Tak- en Bladwyze verhevenheden der Beenderen.*

§ 1476.

Deeze Ziekte is van weinig Schryvers aangeroord, hoewel dezelve niet zeer zeldzaam is. Ze is de winddoorn der Ouden, bestaat in eene Tak- en Blad- of Plaatwyze oneffenheid van de buitenste oppervlakte der Beenderen, en is door- gaans verzeld, of mooglyk het gevolg, van eene uitzetting der gantsche zelfstandig- heid van het Been.

§ 1477.

Hoedaanig de oorzaaken derzelve ook zyn mooge; ze maakt meest altoos Ont- steking, Verzwearing, en Etterholtens in de zagte Deelen, uit hoofde der prikkeling welke deeze by aanhoudenheid ondergaan moeten; en is zoo veel my bekend zy, ongeneeslyk.

*Diminutio
substantia-
rum os-
sium, ab-
sorptione
materia es-
sis.*

De vermindering van de Zelfstandigheid der Beenderen door opneeming van Beenstof.

§ 1478.

De Beenderen van Bejaarden, hoe vast en dik die ook zyn moogen, worden somwylen zoo dun, en dunner nog dan postpapier; alleen door eene opneeming van Beenstof, zonder eenige andere blykbaare voorafgaande Oorzaak. Somwy- len zelfs gaat een gedeelte daar van geheel verlooren, of veranderd in eene zelf- standigheid, niet ongelyk aan Perkement. Doorgaans gaat dezelve verzeld van eene verbeening van sommige zagte Deelen, vooräl van de Bloelivten; gelyk ook van eene veranderde, en zelfs wanstaltige oppervlakte der Deelen welkers Been- deren door dezelve zyn aangegreepen. Dat haare Oorzaaken, algemeen genoo- men, onzeeker zyn; datze eene groote vatbaarheid geeft tot de voortkomst van Beenbreuken zonder eenig blykbaar uiterlyk geweld; gelyk ook, datze geenerlye geneezing toelaat, kan men by dit alles nog byvoegen.

De Beenpyn.

§ 1479.

*Dolor
strophopus.*

BEENPYN, steld eene vaste, plaatslyke, scherpe, en diepe Pyn, in de zelf- standigheid der Beenderen niet zoo zeer, als wel in het Mergvlies, of het in- of uitwendg Beenvlies.

§. 1480.

§ 1480.

Derzelver Oorzaaken bestaan doorgaans in eene Ontsteking of Verzweering deezer Vliezen; in de Winddoorn; Beenknobbels; en eene Scheurbuikige, Krop. zeerige, Pokkige, of Kankerächtige scherpte der Vogten.

§ 1481.

De Geneezing is altoos bezwaarlyk, en fomwylen zelfs, onmooglyk. Men moet de behandeling inrigten, zoo veel zulks mooglyk zy, in overeenkomst met de heerschende Oorzaak, die uit haare foortonderscheidende verschynzelen moet gekend worden. Als de Pyn aanhoudend, uitermaaten sterk, en van eene Verzweering in het binnenste des Beens, afhanglyk is; is het best, het Been te ontblooten door eene insnyding; een Trepaan Kroon daar op te zetten; en de hier door gemaakte opening met zagte balzemächtige middelen te verbinden. Dit foort van Beenpyn wordt inzonderheid gekend aan de voorafgaande verschynzelen der Ontstekingen, gevolgd van eene steeds toeneemende, en trapswyze vermeerdering; gelyk ook van nevensgaande Huiveringen.

§ 1482.

In de meeste gevallen, blyft de Beenpyn niet lang aanhouden, zonder gevolg van Beenbederf; eene byzonderheid, welke de Heelmeester altoos voorzeggen moet. Men begrypt ligtelyk de reeden deezer uitkomst, en van de noodzaaklykheid dier voorzegging.

V. H O O F T D E E L.

De gebrekkige, of geheel onmooglyke beweging der Geledingen.

§ 1483.

De natuurlyke beweegbaarheid der Gewrigten, zoo noodig ter voldoening aan verscheiden behoeften van het Leven, wordt fomwylen verminderd, fomwylen veranderd in hoedaanigheid, en fomwylen geheel weggenoomen. De twee eerste gevallen behooren tot de gebrekkige, het laaste geval tot de geheel onmooglyke beweging deezer Deelen.

§ 1484.

De ondergeschikte foorten deezer Gebrekenzyn, de *Gewrigtsverstyving*, de *Kraaking der Gewrigten*, de *Verflapping der Banden*, de *Verstuiking*, en de *Mankheid*.

De Gewrigtsverstyving.

§ 1485.

*Anchylo-
sis.*

GEWRIGTSVERSTYVING betekend strikt genomen, eene onmooglyke beweging der gewrigten, deeze hoekswyze geboogen zynde. In een ruimer zin wordt daar door verstaan, alle verminderde en moeilyke beweging deezer Deelen zonder onderscheid, welk eenen stand dezelve ook hebben mooge.

§ 1486.

*Anchylo-
sis vera.*

Het eerste foort deezer Ziekte heeft altoos tot oorzaak, eene onderlinge inëengroeijing van de hoofden der saamengeleede Beenderen; is volstrekt ongeneeslyk; en draagt den naam van WAARE GEWRIGTSVERSTYVING. Het laatste is afhanglyk, van een gebrek des Lidvogts, van deszelfs te groote lymigheid; van eene gedeeltelyke verzweering der Kraakbeenderen, welke de hoofden der saamengeleede Beenderen bekleeden; van eene zwelling der beenëinden; gelyk ook, van de uitstorting des Beenzaps, by gelegendheid der Beenbreuken in het Gewrigt zelve, of deszelfs nabyheid. Dit foort is somwylen geneeslyk; en wordt van het voorige onderscheiden, door den naam van ONWAARE GEWRIGTSVERSTYVING.

*Anchylo-
sis spuria.*

§ 1487.

De kenmerken, en voorzegging van het eerste foort, zyn uit de gegeven bepaaling blykbaar. Die van het laatste verschillen naar de verscheidenheid zelve der oorzaken. De behandeling is in het eerste geval nutloos; in het laatste, dan eens veel, dan eens weinig voordeelig. In alle gevallen moet dezelve overëenkoomen met de bekende oorzaak des gebreks zoo wel, als met deszelfs hoegrootheid. Algemeene bepaalingen kunnen hieromtrent niet gemaakt worden.

§ 1488.

Als de Gewrigtsverstyving derhalven afhangt van eene gebreklyke hoeveelheid des Lidvogts, een geval dat inzonderheid kenbaar is uit eene, meestäl pynlyke, en eenigzints kraakende Beweging; dienen vooräl weekmaakende Stovingen, Pap-

Pappen, Smeerzels, Pleisters, of Baden; eene voedende en tevens slymige of gelyeagtige Eetregel; benevens dikmaal herhaalde, dog kleine bewegingen van het Gewricht.

§ 1489.

Is de lymigheid van hetzelfde Lidvogt, de oorzaak der Gewrigtsverstyving, zo kend men zulks aan eene ligte zwelling des Gewrigts, gepaart met het geluid als van Perkement dat gekneed wordt, by ieder beweging van hetzelfde, en het gevoel eener doove Pyn, in dezelfde omstandigheid. Dit geval wordt best behandeld met oplosfende Stovingen, rykelyk bedeed met het *Ammoniaksout*; met Roodmaakende Middelen, langs den omtrek des Gewrigts aangelegt; met zeep- en geestächtige Wryvingen, Wasfingen, Damp- en Dropbaden; gelyk ook, met het toedienen van oplosfende, en verdunnende Geneesmiddelen. Wanneer, gelyk fomwylen plaats heeft, deeze verdikking van het Lidvogt oorspronglyk is van Poksmet, is het uit- en inwendig gebruik van Kwikmiddelen aangewezen. Herhaalde bewegingen van het Gewricht, zyn in alle deeze gevallen niet minder noodzaaklyk, dan in de voorige.

§ 1490.

In dat foort van Gewrigtsverstyving, welke afhangt van eene gedeeltelyke zweering der Kraakbeenderen welke de hoofden der saamengeleede Beenderen bekleeden, kan men niet te voorzigtig zyn in zyne behandeling, en is het dikmaalen beter het geval niet aan te raaken, dan te waagen dat 'er op nieuws toevallen gebooren worden, welke door deeze verstyving alleen gelukkiglyk zyn afgeweerd, en inderdaad meer nadeel influiten dan de verstyving des Gewrigts zelve.

§ 1491.

De twee laaste foorten van Gewrigtsverstyving erkennen algemeen genoomen, geenerlye geneezing alsze gevestigd zyn, en berusten op eene gedeeltelyke 't zy middelyke, 't zy onmiddelyke aanëengroeiing der Beenhoofden. Dat foort egter, waarin de zwelling der Beenëinden door Poksmet veröorzaakt, nog niet zeer veröuderd is, wordt fomwylen geholpen, door het in- en uitwendig gebruik van Kwikmiddelen.

§ 1492.

Als zoo veele andere byzonderheden, betreklyk tot de behandeling der genees-

baare Gewrigtsverstyvingen, moet men aanmerken; dat in die der bovenste Ledemaaten, de voorgeschreeven bewegingen best gedaan worden, door den Lyder eenige reizen daags, eenen allengskens vermeerderden Last te doen draagen, of opheischen: en dat men in die van het Kniegewrigt, het Been traspwys uittrekke, door by herhaaling, op het onderste van den Dye, en het bovenste van het Been te doen werken eenig van tyd tot tyd vermeerderd gewigt, met banden daarāan gehangen, nadat men alvorens het gantsche Deel, zoo veel mooglyk, in eenen horizontaalen stand geplaatst, met de Hiel heeft doen rusten op een Stoel, den Lyder zittende op eene andere.

De Kraaking der Gewrigten.

§ 1493.

*Crepitatio
articulo-
rum.*

DE KRAAKING DER GEWRIGTEN, op zig zelve bestaande, en niet beschouwd als een Toeval van eenige andere Gewrigtsziekte, wordt meestāl veroorzaakt door eene ontbeering en verdunning van het Lidvogt, afhanglyk van eene algemeene uitdrooging des Lighaams, van Scheurbuik, en dergelyke.

§ 1494.

De Geneezing wordt best verkreegen, in het eerste geval door eene voedende Eetregel, en de behandeling der Gewrigtsverstyving § 1492, beschreeven. In het laaste, door het gebruik van de gewoone tegenscheurbuikige Geneesmiddelen. Een Pap van de *scherpe Huislook*, in Bier gekookt, wordt in ditzelfde geval zeer aangepreezen.

De verslapping der Banden.

§ 1495.

*Laxitas
ligamento-
rum.*

VERSLAPPING DER BANDEN, stelt de vermindering of het verlies van der zelve veerkragt, afhanglyk doorgaans van Oorzaaken, werkende by wyze van weeking, kneuzing, of uitrekking.

§ 1496.

De geschonden beweging der Gewrigten, hier door veroorzaakt, is altoos pynlyk, en gepaart met het gevoel van zwakheid niet alleen, maar ook met eene meer of min blykbaare verlenging des Deels.

§ 1497.

§ 1497.

Ter geneezing wordt vereischt, rust, sluitende en schoorende Verbanden, saamenttrekkende en versterkende Omslagen, dergelyke Baden, drooge Wryvingen, Blaardragten, roodmaakende Aanlegzels, en dergelyken.

De Verstuiking.

§ 1498.

Door VERSTUIKING wordt verstaan, eene schielyke uitrekking van de saamstellende Deelen eens gewrigts, tot dien trap, dat de zachte deelen in het ge-^{Distorsie}vaar zyn van verbreeking, de Beenderen in dat van Ontwrigting.

§ 1499.

Het Gewrigt der Voorhand, en van den Voorvoet, zyn het meest aan dit gebrek onderhevig. By deeze ook, verwekt hetzelfde de meeste wanördes, en gaat het veelal verzeld van zeer zwaare pyn, uitstorting van Bloed in het Vetvlies, Spanning, en wyeägtige Verzaamelingen in de Banden des gewrigts niet alleen, maar ook in de scheden der voorbygaande Peezen.

§ 1500.

Het eerste, beste, en gereedste Hulpmiddel in deeze gevallen, is een Bad van koud Water, indien zulks zyn kan bedeed met eene goede veelheid *Ammoniaksout*, om de trap van koude nog te vergrooten. Dit naamlyk, onmiddelyk na de Verstuiking plaats grypt, voorkomt dikmaalen alle uitstorting, en maakt dienvolgens het gebrek van minder aanbelang.

§ 1501.

De overige Hulpmiddelen, welke dan eerst te pasfe koomen, als voorgemelde behandeling heeft plaats gehad; of wanneer, deeze verzuimd zynde, 'er reeds Uitstorting en Zwelling aanwezig zyn; bestaan inzonderheid in het aanleggen van slegts steunende Verbanden, bestendig nat gehouden met oplosfende en eenigzints geeftryke Vogten in den eersten tyd; en naderhand, dat is te zeggen, als de Zwelling geweeken is; van sluitende Verbanden, en Saamenttrekkende, versterkende, en eenigzints Prikkelende Plaatsmiddelen. Eene volstrekte rust van het beleedigd Gewrigt, zoo lang zulks eenigermaten zyn kan, bevordert heel

zeer de geneezing, en verhoed tevens eene zeer lastige en eenigermaten pynlyke zwakheid, welke het dikmaalig gevolg is deezer Ziekte.

*Claudica-
tio.*

De Mankheid.

§ 1502.

Deeze, voor zoo veel ze de natuurlyke beweging van zekere Gewrigten veränderd, konde ik hier ter plaatze niet onäangeroerd voorby gaan. Ze is egter, niet alleen, zelfs niet voor het meeste gedeelte, betreklyk tot deeze veränderingen; maar altoos tot de wangestalten des Lighaams, welke het onderwerp zyn van het naastvolgend Leerstuk. Ik zal derhalven, eene meer byzondere beschryving deezer Ziekte, by die gelegenheid mededeelen.



HEDEENDAAGSCHE

ALGEMEENE OEFFENENDE

HEELKUNDE.

ZESDE LEERSTUK.

VERHANDELING

DER

WANGESTALTEN.

IN

I N N H O U D.

De Wangestalten in het algemeen.

1 HOOFTDEEL. *De tegennatuurlyke grootte der Deelen.*

Derzelver overmaatige Lengte.

————— Kortheid.

————— Dikte.

————— Dunheid.

2 HOOFTDEEL. *De tegennatuurlyke veelheid der Deelen.*

— te groote veelheid van het Hoofd.

————— der Tanden.

————— — Ledemaaten.

————— — Vingeren en Teenen.

————— — Ballen.

————— — Roede.

————— — Schede.

————— — Lyfmoeder.

3 HOOFTDEEL. *De ontbeering der Deelen.*

————— van het Hoofd.

————— des Verbemelte.

————— der Lel.

————— — Oogen.

————— van den Neus.

————— der Ooren.

————— — Tanden.

————— — Ledemaaten.

————— — Vingeren of Teenen.

————— — Ballen.

I N H O U D.

De ontbeering der Roede.

———— — *Schede.*

4 HOOFTDEEL. *De veranderde gedaante der Deelen.*

Het scheeve Hoofd.

De ——— Neus.

—— — *Hals.*

—— *kromming der Ruggraat.*

—— — *Ledemaaten.*

—— — *Roede.*

—— *indrukking der Deelen.*

—— *opkrumping der Ledemaaten.*

—— *buiten- en binnenwaards gekeerde Voeten.*

—— *Krulnagels.*

5 HOOFTDEEL. *De plaatsverandering der Deelen.*

Het Oog in het Voorhoofd.

De Tanden in het Verbemelte.

Het Hart buiten de Borst.

De Lever buiten den Navel.

I N H O U D.

De Schaamte onder den Navel.

6 HOOFDDEEL. *De tegennatuurlyke aanëengroeiingen.*

— *aanëengroeiing der Vingeren en Teenen.*

— — — — — *van de Tong.*

— — — — — *der Bovenlip.*

— — — — — *— Gewrigten.*

7 HOOFDDEEL. *De toegroeiing der natuurlyke Openingen.*

— — — — — *Oogleden.*

De toegroeiing der Neusgaten.

— — — — — *van den Mond.*

— — — — — *der Ooren.*

— — — — — *— Voorhuid.*

— — — — — *— Pisbuis.*

— — — — — *van de Lippen der Schamelheid.*

— — — — — *der Schede.*

— — — — — *van den Mond der Lyfmoeder.*

— — — — — *des Aars.*

— — — — — *— Endeldarms.*

I N H O U D.

8 HOOFTDEEL. *De tegennatuurlyke van een scheidingen.*

- *Haazelip.*
- *gespleeten Oorlel.*
- — *Voorhuid.*
- — *Lippen der Schamelheid.*
- — *Bilnaad.*

9 HOOFTDEEL. *De wanvormige beweeging en werking der Deelen.*

Het Mankgaan.

De Verlamming.

— *Stemsverdooving.*

— *Stomheid.*

Het Lispen.

— *Stamelen.*

De Hardhoorenheid.

— *Doofheid.*

10 HOOFTDEEL. *De Wanſtaltigheden der Sexe.*

— *Vrouwlyke Stem by Mannen.*

— *Manlyke Stem by Vrouwen.*

I N H O U D.

De Baard by Vrouwen.

— *Ontbeering der Baard by Mannen.*

— *Tweeslagtige Teeldeelen.*

I I HOOFTDEEL. *Aanmerkingen over de Ligbaamlyke Opvoeding der Kinderen, ter verhoeding van verscheiden Wange- stalten.*

Het Bakeren der Kinderen.

— *Draagen der Kinderen.*

— *Liggen der Kinderen.*

— *Staan der Kinderen.*

— *Zitten der Kinderen.*

— *Gaan der Kinderen.*

De Kleeding der Kinderen.

— *Houding van het Hoofd.*

— — — *der Armen.*

— — — *van den Rug.*

— — — — *Buik.*

— — — *der Billen.*

— — — — *Voeten.*

H E D E N D A A G S C H E

AL G E M E E N E O E F F E N E N D E

H E E L K U N D E.

Z E S D E L E E R S T U K.

VERHANDELING DER WANGESTALTEN.

De Wangestalten in het algemeen.

§ 1503.

WANGESTALTE, algemeen genoomen, betekent alles, wat in het saamenstel des Lighaams, afwykt van de onveränderlyke regelen van Bouwkunde; door den wyzen Schepper vastgesteld, en gevolgd. Meer bepaaldelyk, en in eenen Heelkundigen zin, betekent hetzelfde alleen die wanördes in de uitgebreidheid, veelheid, gedaante, plaats, vanëenscheiding, aanëenhang, beweeging en werking der Deelen, gelyk ook in het soort onderscheidend maakzel der eene en andere Sexe, welke de algemeene schoonheid des Lighaams ontsieren, deszelfs natuurlyke

*Deformi-
tas.*

Beweeingen veranderen, de kenmerken der Sexe twyffelächtig maaken, niet onder de Klasfen der Ziekten betrokken worden, en, voor zoo veelze voor verbetering vatbaar zyn, inzonderheid de hulp vorderen der Heelkunde.

§ 1504.

Onëindig byna is het getal deezer Wanördes. Men kan egrer dezelve gevoeglyk brengen tot de *tegnatuurlyke grootte en veelheid der Deelen*; tot derzelver *Ontbeering, veranderde gedaante, en Plaats*; tot de *tegnatuurlyke aanëengroeijing der Deelen*; de *toegroeijing der natuurlyke Openingen*; en de *tegnatuurlyke vanëenscheidingen*; gelyk ook, tot de *wanvormige beweging en werking der Deelen*, en de *Wanstaltigheden der Sexe*.

§ 1505.

Wy zullen derhalven, in de beschryving der Wangestalten, het voornaame Onderwerp van dit Leërstuk, deeze zelfde onderscheiding opvolgen; en, om niet te vervallen in kleinigheden, ons alleen bepaalen by de meest weezenlyke foorten van een ieder deezer Geslagten.

I. H O O F T D E E L.

Magnitudo contranaturalis partium.

De tegennatuurlyke grootte der Deelen.

§ 1506.

Alle Deelen van ons Lighaam, hebben, betreklyk tot het geheel, hunne bepaalde grootte; eene grootte, welke niet kan veranderd worden, zonder eenen zeer aanmerklyken misftand.

§ 1507.

Magnitudo partium.

Door de **GROOTTE DER DEELEN**, verftaat men hunne uitgebreidheid in allerlei afmeetingen; dat is te zeggen, in *lengte, breedte, en omtrek*.

§ 1508.

De ondergeschikte foorten derhalven, deezer Wanftaltigheid, zyn de *overmaatige lengte, kortheid, breedte, smalheid, dikte, en duisheid der Deelen*.

De

*De overmaatige lengte der Deelen.**Nimis
longitudo
partium.*

§ 1509.

Deeze, die meestal moet beschouwd worden, betreklyk te zyn tot het Hoofd, de Ooren, den Neus, de Kin, de Roede, de Kittelaar, de Ledemaaten in het algemeen, deeze of gene derzelve in het byzonder, en de Armen, de Handen, de Vingeren, de Dyën, de Beenen, de Voeten, of de Teenen; is somwylen aangeboren, en gegrond op eene Natuurspeeling; somwylen toevallig, en afhanglyk van eenigerlei oorzaak, werkende, voor, in, of na de Geboorte.

§ 1510.

Het eerste soort deezer Wangestalte, welk Deel dezelve ook inneemt, is onverbeterlyk. Het laatste kan somwylen al, somwylen niet verholpen worden. De verscheidenheid der oorzaaken van welke deeze afhangt, en het verschil der Deelen, daar van aangedaan, bepaalen inzonderheid het een en ander.

§ 1511.

Het *verlengde Hoofd*, is het doorgaand uitwerkzel eener moeilyke Verlosing, hersteld zig veelal van zelve, of wordt door zekere kleine oplettenheden in den aanleg van het Hoofddekzel, verbeterd. De *verlengde Kin, Neus, en Ooren*, zyn onherstelbaar, om datze enkel afhangen van eene Natuurspeeling in de vorming der Deelen. De *verlengde Roede en Kittelaar*, bevinden zig wel, ten opzigte haarer oorzaak, in hetzelfde geval, maar moeten egter somwylen, om de on aangenaamheden die ze in den Byslaap veroorzaaken, geholpen worden; de eerste, door het *Werktuig van HILDANUS*, de laatste door eene gedeeltelyke wegsnyding. De verlengde Ledemaaten, zyn dan eens wezenlyk, dan eens Schynbaar. De eersten erkennen geenerlei Hulpmiddelen: de laatste, die met betrekking tot de bovenste afhangen van eene zydelyke buiging des Ruggraats in de Hals, of het bovenste gedeelte der Rugwervelen; en met opzigt tot de onderste, in eene dergelyke buiging der Lendenwervelen, en de hier van afhangende, of eigenleidige scheefheid van het Bekken; kunnen geholpen worden, door welgemaakte Kunstkeurslyven, of door deeze, en eene daar aan gehegte Kunstlaars aan de zyde der verlenging. De verlenging eindelyk van alle, of van sommige Vingeren, en Teenen, hangen altoos af van een gebrek in de eerste vorming; en zyn uit dien hoofde ongeneeslyk.

§ 1512.

*Nimia
brevitas
partium.*

De overmaatige kortheid der Deelen.

§ 1512.

DE OVERMAATIGE KORTHEID DER DEELEN, is met opzigt tot het Hoofd, den Neus, de Kin, de Ooren, en de Roede, doorgaans afhanglyk van eene gebreklyke Vorming. Die der Ledemaaten daarëntegen, is fomwylen het gevolg eener onherstelde Beenbreuk of Ontwrigting, gelyk ook van eene gebreklyke voeding.

§ 1513.

Het laaste geval alleen, is fomwylen geneesbaar, door het langduurig gebruik inzonderheid van drooge Wryvingen, en van roodmaakende, prikkelende, speceryächtige, geeftryke, en versterkende Hulpmiddelen. De oorzaak egter der Voedeloosheid, moet niet bestaan in eene onöverwinbaare drukking der Bloedvaten en Zenuwen, naar het beleedigd Deel toegaande, indien voorgemelde middelen van eenige uitwerking zyn zullen.

*Nimia
latitudo
partium*

De overmaatige breedte der Deelen.

§ 1514.

Deeze wordt zelden bespeurd dan aan den Rug, de Handen, of de Voeten; bestaat altoos van de geboorte; is, als men tot zekere Jaaren gekoomen is onherstelbaar; maar kan in de eerste Kindsheid veel bedwongen worden, door eene welsluitende, en niet zeer toegeefbaare Kleeding.

*Latitudo
nimis par-
va parti-
um.*

De te kleine breedte der Deelen.

§ 1515.

Dezelfde Oorzaak die de vorige Wangestalte voortbrengt, werkt fomwylen op eene regtstreeks frydige wyze, en geeft gelegenheid tot deeze, waar voor geheel geene hulp gevonden wordt.

*Nimia
crassitudo
partium.*

De overmaatige dikte der Deelen.

§ 1516.

Eene te groote plaatslyke voeding van één of meerder Ledemaaten, of van eenig

nig ander Deel, gelyk ook een gebrek der Vorming, geeft dezelve eenen grooter omtrek dan ze hebben moesten in evenreedigheid tot den algemeenen omtrek des Lighaams; eene Wangestalte, die by de vroege jeugd, in het eerste geval, met betrekking tot de Ledemaaten veel kan verbeterd worden door maatig fluitende Verbanden, dergelyke Kousen van Hondsleder, of eenige andere niet rekbaare stof, Handschoenen van denzelfden aart, en van genoegzaame lengte om alles in te sluiten wat verdikt is; maar by Bejaarden, en in het tweede geval, onherstelbaar is.

De overmaatige dunheid der Deelen.

*Nimis
gracilitas
partium.*

§ 1517.

Deeze, 't zy ze is aangebooren, of verkreegen; datze één Arm, één Been, beide Armen, of beide Beenen, inneemt; steld altoos eene gebreklyke voeding; en is dan eens al, dan eens niet geneesbaar.

§ 1518.

Algemeen genoomen, bestaat de beste Behandeling, en die altoos moet beproefd worden, daarin: dat men het Deel, of de Deelen, geduurende eenen geruimen tyd, verscheiden maalen daags doe wryven met geeftryke, speceryächtige, en opwekkende middelen, en vooräl met de *Jenever-boter*: dat men den Lyder verpligte, zoo veel uiterlyke beweegingen met de verdunde Deelen te maaken, als mooglyk is; gelyk ook, dat men hem, stil zittende, eene inwendige Spierbeweeging doe verrigten, door eene Konstgreep als ik my dus mag uitdrukken, die in het eerst moeilyk, naderhand gemaklyk is; en het best dus geleerd word, dat men in eenen zittenden stand, de Hand, als de Arm, en de Voet, als het Been verdund is, stevig steune tegen eenig onwankelbaar Lighaam, en men ter gelyker tyd tragte allerlei beweegingen te maaken, voor dewelke de een en ander deezer Deelen vatbaar zyn; zonder hieröm eenige verändering te maaken, in den voorgemelden stand van het eerste of laaste deezer Deelen.

II. H O O F T D E E L.

*Contra-
naturalis
multitudo
partium.*

De tegennatuurlyke veelheid der Deelen.

§ 1519.

Tot deeze behooren, voor zoo veel ons tegenwoordig bestek aangaat, de te groote veelheid van het Hoofd, der Tanden, der Ledemaaten, der Vingeren en Tennen, der Ballen, der Roede, der Schede, en der Lyfmoeder. Ik zegge, voor zoo veel ons tegenwoordig bestek aangaat; om dat wy niet willen spreken, dan van bekende, en meermaalen waargenoomen Wangestalten, schoon het niet onmooglyk is, dat 'er nog meer andere kunnen plaats grypen.

*Multitudo
capitis.*

De veelheid van het Hoofd.

§ 1520.

Kinderen worden 'er somwylen gebooren met twee Hoofden. Deeze leven doorgaans niet lang na de Geboorte, het geval weezenlyk zoo zynde, en zyn derhalven, geene onderwerpen der Heelkunde.

§ 1521.

Meermaalen egter zegt men, dat dezelve met twee Hoofden ter Wereld koomen, terwyl 'er nogthans niets van waar is, en het zoogenaamde tweede Hoofd, enkel behoord tot dat soort van Waterhoofd, welk ik § 728. onder den naam van *byzonder inwendig Waterhoofd*, beschreeven hebbe. Dit verbeelde tweede Hoofd, is ten opzichte der Kunst, in hetzelfde geval als het vorige.

*Nimis
multitudo
dentium.*

De te groote veelheid der Tanden.

§ 1522.

Het natuurlyk getal der Tanden van het een of ander Kaakbeen, of van beiden tevens, verdubbeld somwylen geheel of ten deele; en maakt dus eenen misstand, die in het laaste geval door uittrekking der overtollige Tanden kan weggenoomen worden, maar in het eerste onherstelbaar is.

De

*De te groote veelheid der Ledemaaten.**Nimia
multitudo
membro-
rum.*

§ 1523.

Deeze is altoos aangeboren, byna nimmer volkoomen, en dan eens al, dan eens niet geneesbaar.

§ 1524.

Het eerste geval heeft plaats, als het overtollig Deel ten opzichte van het Beengestel niet bewerktuigd is, en van eene plaats afhangt, van waar hetzelfde vylig en zonder nadeel van het natuurlyk Lid, kan afgebonden of gesneden worden.

§ 1525.

Het laatste, wanneer hetzelfde, in zyn saamenstel volleedig is, uit het inwendig maakzel van het Lighaam, of van het daarmede overeenstemmend Lid voortkomt, en de wegneeming niet geschieden kan zonder gevaar van het Leven, of verlies tevens van het Lid.

*De te groote veelheid der Vingeren en Teenen.**Nimia
multitudo
digitorum
manuum
& pedum.*

§ 1526.

Somwylen koomen 'er Kinderen ter wereld, met zes, of meerder Vingeren of Teenen, aan eene Hand, of eene Voet, of welaan beide Handen of Voeten tevens.

§ 1527.

Deeze wanstaltigheid, alswe de Waarneemers gelooven moogen, schynd somtyds erflyk, en als eigen te zyn aan geheele Familien. Ze wordt enkel geholpen door de affnyding, of afbinding der overvloedige Vingeren of Teenen, na dat deeze al of niet, eenige Beenderen in haar saamenstel insluiten.

*De te groote veelheid der Ballen.**Nimia
multitudo
testium.*

§ 1528.

Beide Ballen zyn somtyds in den Balzak aanwezig, en een derde nog is geplaatst in de Liesch. Deeze maakt als dan, daar ter plaatze, eene eenigzints be-

weeglyke, uit zig zelfs onpynlyke, en ronde of eironde Zwelling, die, alsze gedrukt word, pyn verwekt, en te gelyk Braaking of Flauwten

§ 1529.

Voor deeze Wanvormigheid is geen hulpmiddel. Men moet slegts bedagt zyn, omze niet te beschouwen als eene Darm- of Netbreuk, en haar als zoodaanig te mishandelen door nutlooze proeven ter binnenbrenging, of door de drukking der Pop eener Breukband.

*Multi-
tudo penis.*

De veelheid der Roede.

§ 1530.

Hoe zeldzaam dit geval ook zyn mooge, vind men daar van egter eenige Waarneemingen. Wanneer de byroede voldoet aan alle eigenschappen der natuurlyke, is ze onvatbaar voor eenige wegneeming, het voornaam Hulpmiddel deezer misvorming, als dezelve, gelyk meestäl waar is, enkel bestaat in een aangebooren Vleeschgezwel.

*Multi-
tudo vaginae.*

De veelheid der Schede.

§ 1531.

Deeze, die meer dan eens is waargenoomen, bestaat nimmer op zig zelve, maar gaat altoos verzeld van de volgende Misvorming, en kan, behoeft, nog mag, niet verholpen worden.

*Multi-
tudo uteri.*

De veelheid der Lyfmoeder.

§ 1532.

Sommige, hoewel zeer weinig Vrouwen, hebben twee Lyfmoeders, en zyn uit dien hoofde vatbaar voor Overbevrugting, die misschien anders onmooglyk is.

§ 1533.

Veeläl gaat dit geval gepaart met eene dubbele Schede. Somwylen egter, is 'er niet meer dan eene, waarin de by-Lyfmoeder met haaren Hals uitkomt.

§ 1534.

Dat hetzelfde, even als de dubbele Schede, generleije hulp vordert nog erkent, is iets, 't welk ik nauwlyks behoefte aan te merken.

III. HOOFD.

III. H O O F T D E E L.

*De ontbeering der Deelen.**Defectus
partium.*

§ 1535.

De ontbeering der Deelen, is inzonderheid betreklyk tot het *Hoofd*, het *Verhemelte*, de *Lel*, de *Oogen*, den *Neus*, de *Ooren*, de *Tanden*, de *Ledemaaten*, de *Vingeren en Teenen*, de *Ballen*, de *Roede*, en de *Schede*. Omtrent ieder van deeze grypen byzonderheden plaats, welke meer afzonderlyk moeten aangewezen worden.

*De ontbeering van het Hoofd.**Defectus
capitis.*

§ 1536.

De ontbeering van het Hoofd, strikt genoomen, is zeer zeldzaam; altoos afhankelijk van eene Natuurspeeling; en onmiddelyk na de geboorte, doodelyk.

§ 1537.

Minder zeldzaam, schoon niet zeer dikmaalen, ziet men Kinderen ter Wereld koomen, zonder Herffenpan, en zelfs zonder, of althans met nauwlyks kenbaare Herffenen.

§ 1538.

By deeze ontbreekt derhalven het geheele Opperhoofd, benevens het bovenste gedeelte des Aangezigts, tot aan de Oogen; en heeft het overblyvende de gedaante eener Kats-kop, by dewelke het ook doorgaans vergeleeken wordt.

§ 1539.

Kinderen, aan deeze Wangestalte onderhevig, sterven meestäl terstond, somwylen egter, eenige weinige Dagen na de geboorte.

*De ontbeering des Verhemelte.**Defectus
palati.*

§ 1540.

Het verhemelte ontbreekt geheel, of ten deele; uit de geboorte, of toevallig.

Het eerste geval, aangeboren zynde, is doodelyk, om dat het de Kinderen buiten de mooglykheid stelt, tot het gebruik van voedzelen, dewylze alles door den Neus weder uitwerpen. Het laatste, als het aangeboren is, gaat doorgaans vergezeld van eene splyting der Bovenlip; en toevallig zynde, van Venusziekte. Beide deeze Wanfstaltigheden, kunnen, indien niet geheel, althans gedeeltelyk door de Konst verbeterd, of weggenoomen worden.

§ 1541.

De geheele Ontbeering van het Verhemelte uit geboorte, is, zoo veel my bekend zy, door niemand nog opgemerkt. Ik zelve hebbe deeze, niet dan zeer onlangs voor het eerst waargenoomen, en het is alleen op dit geval, 't welk tevens vergezeld ging met eene nauwlyks merkbare Tong, en zeer korte Onderkaak, dat alles wat ik daar van gezegt hebbe, gegrond is.

§ 1542.

De aangeboren gedeeltelyke Ontbeering van het Verhemelte, met eene nevensgaande splyting der Bovenlip, verbeterd somwylen aamerlyk, door de Konstbewerking alleen der Haazelip; somwylen geneestze hier door, en door de medewerking der Natuur, geheellyk. Veelal egter blyft dezelve voor een grooter of kleiner gedeelte aanwezig, en moet, zoo dra men ziet datze niet meer verbeterd, door eenig konstig stopzel te gemoet gekoomen worden.

§ 1543.

Die ontbeering van het beenig Verhemelte, welke afhangt van Venusziekte, kan niet vergoed worden, dan door het gebruik van den *stopper des Verhemelte*, na dat altoorens, zoo wel de Ziekte, als het Beenbederf, waar van deeze ontbeering afhangt, en de byzynde verzweering, volkoomen geneezen zyn.

*Defectus
vulvæ.*

De Ontbeering der Lel.

§ 1544.

Deeze is zeldzaam aangeboren, maar doorgaans het gevolg van Venusziekte. Alsze op zig zelve bestaat, kanze niet verholpen worden; maar, vergezeld gaande van eene ontbeering des Verhemelte, is eene Konst-lel, gehegt aan den voorgenoomden stopper des Verhemelte, zoo noodzaaklyk als nuttig.

§ 1545.

*De ontbeering van den Neus.**Defectus
nafi.*

§ 1545.

De Neus ontbreekt buitengemeen zeldzaam, uit hoofde eener gebreklyke Vorming; maar dikmaalen, ingevolge eener uiterlyke beleediging, Verfterving, of Verzweering en Beenbederf, oorspronglyk uit Venusziekte. Van welk eene Oorzaak deeze wangefalte, die inderdaad zeer groot is, ook afhangt, ze is altoos gedeeltelyk, of geheel, en moet in beide gevallen vergoed worden door eene *Konstneus*.

§ 1546.

Somwylen, gaat dezelve gepaart met verlies van het Verhemelte, 't zy het beenig alleen, 't zy het zachte tevens. In dit geval, is eene enkele *Konstneus* niet voldoende, maar moet daar by gevoegd worden, een dergelyk Verhemelte, met, of zonder Lel, naar eifch der byzondere omftandigheden. Het Werktuig, door den zeer beroemden CAMPER beschreeven en afgebeeld, by gelegenheid der Beschryving van een dergelyk zeer byzonder geval, dat ook door my, en miffchien duizend anderen gezien is, voldoet hier in by uitftek.

*De Ontbeering der Oogen.**Defectus
oculorum.*

§ 1547.

Een Oog alleenlyk, of beide Oogen tegelyk, kan, of kunnen ontbreeken, zoo uit geboorte als by toeval. Dit gemis, vooräl door de laafte Oorzaak, kan geheel zyn, of gedeeltelyk: dat is te zeggen; de gantsche Oogbal kan vernietigd zyn, of flegts een meer of minder aanzienlyk gedeelte derzelve. In beide gevallen is het gebruik van een *Konftöog* aangewezen.

*De ontbeering der Ooren.**Defectus
aurium.*

§ 1548.

Of deeze immer uit geboorte beftaan heeft, is my onbekend. Toevallig gebeurd ze fomwylen, en kan eenigzints vergoed worden door een *Konftöor*.

De

*Defectus
dentium.*

De ontbeering der Tanden.

§ 1549.

De ontbeering der Tanden, is fomwylen, hoewel zeer zeldzaam, aangeboren. Dikmaalen ontstaatze uit derzelver bederving, en uitvalling. In het *Leerstuk der Tandziekten*, zal hier van meerder gezegd worden.

*Defectus
membro-
rum.*

De ontbeering der Ledemaaten.

§ 1550.

Een of meer der Ledemaaten ontbreken, fomwylen uit geboorte, fomwylen, ingevolge de een of ander toevallige beleediging. Het eerste geval fchynd meer betreklyk tot de bovenste, dan tot de onderste, hoewel hier van ook voorbeelden voorhanden zyn. Beide gevallen zonder onderscheid, moeten, voor zoo veel zulks mooglyk zy, door een *Konstlid*, vergoed worden.

*Defectus
digitorum
manuum
& pedum.*

De ontbeering der Vingeren, en Teenen.

§ 1551.

Deeze, algemeen genoomen, en alsze afhangt van eene Natuurspeeling, kan niet dan zeer gebreklyk vergoed worden. Alsze betreklyk is tot één of meerder Vingeren, en deeze, geheel, of ten deele, niet aanwezig zyn, uit welk eene oorzaak zulks ook zyn mooge; moet men dezelve, zoo veel mooglyk zy, te gemoet koomen door het gebruik van *Konstvingers*.

§ 1552.

Wanneer de Duim der regterhand, gedeeltelyk ontbreekt by Menschen die uit hoofde van hun beroep, of anderzints, tot fchryven verplicht zyn, kan dit gemis ten hunnen opzigte, volmaakt vergoed worden, door het gebruik van zeker Werktuig, hier toe uitgedagt, dat ik ter zyner plaatze, zal befchryven en afbeelden.

*Defectus
testium.*

De ontbeering der Ballen.

§ 1453.

Deeze is gedeeltelyk, of geheel: fchynbaar, of weezenlyk. De eerste is eens van

van my waargenoomen by een Jonge van dertien Jaaren, en was aangebooren. De tweede is niet zeldzaam, en meestäl schynbaar. In dit geval, houden de Ballen zig doorgaans op in de Lieschen, somwylen ook in de Buiksholte. Als het eerste plaats heeft, bespeurd men de gewoone kenmerken van het Bal. Liesch gezwel, § 872. beschreeven. Het laatste kan by geene mooglykheid gekend worden. Alle deeze gevallen zonder onderscheid, zyn onhelpbaar, en moeten geheel aan de Natuur worden overgelaaten.

De ontbeering der Roede.

*Defectus
penis.*

§ 1554.

De ontbeering der Roede, bevindt zig in hetzelfde geval als die der Ballen: dat is te zeggen, datze of weezenlyk is, of schynbaar. De eerste is het uitwerken eener Natuurspeeling, of het gevolg der afzetting deezes Deels, gedaan uit hoofde van eenig plaatslyk gebrek, en is volstrekt onverbeterlyk. De laatste kan afhangen, van eene zeer groote Vertheid, aanmerklyke Waterbreuken, dergelyke Zakbreuken, of dergelyken; en is dan eens al, dan eens niet, geneesbaar.

De ontbeering der Schede.

*Defectus
vagina.*

§ 1555.

De Schede ontbreekt zeldzaam geheel; meermaalen op de plaats, haar door de Natuur aangewezen. De Pisblaas, en Endeldarm, zyn doorgaans de Deelen in welke zy zig in het laatste geval opent. Somwylen gebeurd zulks ook in de nabyheid van den Navel. Altoos is deeze Wangestalte ongeneesbaar, als de weg niet kan gebaad worden door het Snymes, dat inderdaad byna nimmer mooglyk is.

IV. H O O F T D E E L.

De veranderde gedaante der Deelen.

*Transfigu-
ratio
partium.*

§ 1556.

Eene veranderde gedaante der Deelen zegt men dat plaats heeft, wanneer by-
Z z voor-

voorbeeld, het Hoofd, of den Neus scheef staat, de Ruggraad, de Ledemaaten, of de Roede gekromd zyn, de Beenderen van het een of ander Deel zyn ingedrukt, de Ledemaaten zyn opgekrompen, de Voeten buiten of binnenwaards gekeerd staan, de Nagels krulswyze uitwaschen, en dergelyken.

§ 1557.

Wy zullen ons in de beschryving deezer Wangestalten alleen bepaalen by de opgetelde; zoo om dat de overige van minder belang zyn, als om dat sommige derzelve, meer behooren tot deeze of gene klassen van Ziekten, welke of reeds beschreeven zyn, of nog zullen beschreeven worden.

*Caput
obstipum.*

Het scheeve Hoofd.

§ 1558.

Deeze Wangestalte is betreklyk, of tot de gedaante van het Hoofd zelve, of tot deszelfs natuurlyke stand op den Tronk.

§ 1559.

De eerste is somwylen aangebooren, en onherstelbaar: somwylen ontspruitze uit eene moeilijke geboorte, en wordt alleen door de groeiing van het Lighaam, of door nevensgaande kleine oplettenheden in het aanleggen der gewoone Hoofddekzels overwonnen.

§ 1560.

De laatste is meestäl afhanglyk van eene verflapping, verlamming, inkrimping, vanéénscheiding, of Zinkingächtige vloeijing van de Spieren des Hoofds, aan deeze of gene zyde, en inzonderheid van de een of ander der *Musculi Sterno-Clydo-Mastoidei*.

§ 1561.

Somwylen ook, wordt dit zelfde soort van Wangestalte veröorzaakt, door eene scheefwording der Halswervelen; of, is deeze scheefwording het gevolg van de een of ander der voorgemelde Oorzaaken, eenen geruimen tyd in haare werking volhard hebbende.

§ 1562.

Hoedaanig ook het geval zyn mooge, het is altoos meer of min moeilyk te geneezen; dog moet behandeld worden, in overéénkomst met deszelfs oorzaaken, tot hier toe gemeld, met versterkende, prikkelende, of oploffende middelen; gelyk ook, door het veréénigend Verband der dwersche Halswonden, naar de plaatzing der vanéénscheiding, oordeelkundig veranderd, in het geval der vierde oorzaak §. 1560; en door het gebruik van een der Werktuigen, welke wy, by gelegenheid der gekromde Ruggraad zullen aanpryzen, in dat van §. 1561.

§ 1563.

Indien de verkorting van de een of ander der voorgenoemde Spieren §. 1560, niet te verbeteren is door verflappende hulpmiddelen, gelyk veelal wordt waargenoomen, is de affnyding van die, welke de wangestalte veröorzaakt, onmiddelyk boven het Sleutelbeen; van welke by gelegenheid der Konstbewerkingen nader zal gesproken worden, het eenig Hulpmiddel.

*De scheeve Neus.**Nasus obliquus.*

§ 1564.

De Neus is somtyds scheef uit geboorte; somwylen toevallig. Het laatste geval kan afhangen van verscheidenerleije Oorzaaken, welken het niet gemaklyk is te bepaalen. Meestäl kan dezelve verholpen worden, zoo niet geheel, althans ten deele, met den Neus door dikwyls herhaalde drukking met de Vingeren, of eenig geschikt Verband, zagtelyk, en trapswyze te dwingen naar de tegengestelde zyde der overhelling. Dat intusschen, zal deeze verbetering plaats grypen, het geval niet veröuderd zyn moet, spreekt van zelve.

De Gekromde Ruggraad.

§ 1565.

De Gekromde Ruggraad, kan in haare voortkomst, en uitwerkzelen, by geene mooglykheid begreepen worden, zonder zig, als zoo veele voorbereidende kundigheden, te erinneren; dat alle Wervelbeenderen, niet slegts met de zeer breede oppervlakten hunner Lighaamen, op elkander draagen; maar ook, door

eene dubbele geleeding veréénigt zyn: dat de uitgestrektheid der bovenste en onderste oppervlakten van de Lighaamen der Wervelen, vergroot wordt door een tusschenliggend Kraakbeen: dat dit Kraakbeen, van eenen veerkragtigen aart zynde, in eenen opgerigten stand des Lighaams, door de werking alleen der zwaarte, verdund wordt; en zig weder verdikt in een liggende: dat de Veerkragt van dit Kraakbeen, even als die van alle Veerkragtige Lighaamen, door eene te sterke drukking, zoo kan beleedigd worden, datze gantschelyk verloren gaat: dat de onderlinge verééniging van de Lighaamen der Wervelen in het algemeen, bevestigd wordt door zeer sterke Banden, en van de Rugwervelen daarénboven, door de zydelyke aanvoeging der Ribben: dat de schuinze en graatagtige Uitwassen insgelyks aan elkander gehegt worden door veele Banden en Spieren; en de byzondere plaatsing van sommige der laaften, een weêrkeurig steunzel verschaft aan elkander: eindelyk; dat de Lyn van zwaarte de voorste oppervlakte aanraakt van de Lighaamen der Halswervelen; op eenen kleinen afstand vald voor dezelfde oppervlakte der Rugwervelen; en door het midden heen loopt van de Lighaamen der Lendenwervelen.

§ 1566.

Deeze kundigheden naamlyk, leeren ons, dat alle krommingen van den Ruggraad, veelal voor Ontwrigtingen gehouden, inderdaad niet anders zyn, dan verrekkingen der Banden, Kneuzing der Kraakbeenderen, en misschien ook, eene verandering van beiden, of van deeze of gene Spieren des Ruggraads, door de nederzetting, vloeijing, of welk eenen naam zulks verdiend, van eenigerlei Ziektestof, gevolgd door eene meer of min langzaame uitzetting, uitspatting, of veranderde gedaante en stand, van één of meer Wervelen.

§ 1567.

Alle Wangestalten van deezen aart, kunnen op drieërlei wyzen plaats grypen; hebben veele dingen met elkanderen gemeen, en verschillen ook onderling in verscheiden opzigten.

§ 1568.

Het gene zy gemeen hebben met elkander, is de verandering der natuurlyke gedaante van den Ruggraad, en der betreklyke stand van de Lyn van zwaarte tot deeze: de vermindering, of geheele vernietiging van de Lighaamen der uitwykende Wervelen en derzelver Kraakbeenderen, aan de zyde der overhelling: de byzondere houding van het Hoofd naar den kant der uitzetting: de veranderde stand der

der Ribben: de vermindering van de ruimte der eene of andere Borstholte: de Pyn, gevoelloosheid, of vermagering der Deelen, beneden de plaats der uitzetting gelegen: de verlamming deezer zelfde Deelen: de veranderde trekken van het Aangezicht: de gebreklyke gang, en dergelyken.

§ 1569.

Het onderling verschil deezer Wangestalten bestaat voornaamlyk hier in. Somwylen maakenze eene bepaalde uitzetting naar agteren, en vormen de Bogchel: somwylen wordt de Ruggraad op een of meer plaatzen zydelings uitgezet, en als gedraaid op de wyze eener Romynsche S. tot het gene men noemd een *scheef Lighaam*: somwylen eindelyk geschied de uitwyking voorwaards, en vertoond zig de Ruggraad ter plaatze der Wangestalte, hol van agteren. Men kan hier nog, als zoo veele andere verscheidenheden byvoegen; datze zig uitstrekken over den gantschen Ruggraad, of de Halswervelen inneemen, of de Rugwervelen, of zig inzonderheid bepaalen tot de Lendenwervelen: dat de Lighaamen der Wervelen, aan de holle zyde, dan eens vernietigt worden zonder, dan eens met Beenbederf: datze somylen afhanglyk zyn van de werking eener uiterlyke oorzaak, en somwylen het enkel gevolg eener weekwording der Beenderen, of van eene nederzetting der stof van eenigerleije algemeene Ziekte, en dergelyke: datze nu eens gepaart gaan met Ettergezwellen in de omliggende Deelen, of elders; en dan eens zonder dezelve gezien worden: gelyk ook, datze somwylen gevolgd worden van den Dood; somwylen, door aanééngroeiing der Wervelen geneezen; en veelmaalen eene altoos duurende Verminktheid veröorzaaken.

§ 1570.

Alle deeze verscheidenheden zyn algemeen, en betreklyk tot allerlei foorten deezer Wangestalte. 'Er zyn anderen, welke meer bepaaldelyk de Bogchel onderscheiden van het scheeve Lighaam, en de inwaards geboogen Ruggraad; gelyk ook zulke, welke de wanvormigheden der Halswervelen, doen onderkennen van die der Rugwervelen; en die der Rugwervelen, van die der Lendenwervelen. Deeze derhalven, verdienen inzonderheid onze oplettenheid.

§ 1571.

Cy phosis.

In de BOGCHHEL, op welk eene plaats die ook voorvald, bespeurd men eerst eene meerdere uitpuiling van het een of ander doornächtig Uitsteekzel; welke uitpuiling van tyd tot tyd grooter wordt, door de byvoeging van andere dergelyke Uitwassen. De Lighaamen der Wervelen, ondergaan aan den Voorkant, eene

vermindering van Zelfstandigheid; en de tuffchenliggende Kraakbeenderen vernietigen. De flymerigheid, in de geleeding der fchuinze Uitfteekzels vermeerderd; veränderd fomwylen in eene kalkagtige ftóf; en verwyderd deeze Uitfteekzels, meer of min van elkanderen. Het eerfte Wervelbeen dat uitfpat, of liever het eerfte doornächtig Uitfteekzel, welk zig buiten de Lyn der anderen vertoond heeft, fteekt altoos meerder uit dan de overigen, en maakt als het middenpunt des Bogchels. Het Hoofd eindelyk, vald voor over: en, dewyl hier door de Lyn van zwaarte, naar den zelfden kant verplaatft word; is den Lyder genoodzaakt dit Deel uit al zyn vermoogen naar agteren te brengen, om het vallen te verhoeden.

§ 1572.

Scolyofis. In het SCHEEVE LIGHAAM, zyn doorgaans twee bulten, aan ieder zyde een; maar dus geplaatft, dat, als de bovenfte Bult aan de regterzyde is, de onderfte gevonden wordt aan de linker. Tegen over elk deezer Bulten, befpeurd men eene invalling. De Lighaamen der Wervelen, gelyk ook hunne Kraakbeenderen, verminderen aan de holle, en blyven dezelfde, of vergrooten, aan de verheeven zyde. De fchuinze Uitfteekzels, wyken aan de laafte zyde van elkander, en worden als tot een gedrukt aan de eerfte. De Borft, om dat de Ribben de Wervelbeenderen moeten volgen, wordt bultig ter zyden; en deeze Bult bevind zig altoos aan den zelfden kant als die der Rug. Het Schouderblad wordt aan de zyde der bovenfte Bult agterwaards gedrongen, en fteekt merklyk meerder uit dan het andere. De Borftholte van dezelfde zyde verëngd aanmerklyk, en die der tegengestelde verbreed naar evenreedigheid. De Ribben der verheeven zyde, worden naar agteren veel krommer dan natuurlyk, en minder krom aan de holle. Deeze zelfde Beenderen daarënboven, wyken van een aan de zyde van den Bult; en naderen aan den kant der inwyking. Het Bekken eindelyk, wordt fcheef; de Gewrigtholten, vooräl by Kinderen, veränderen; hetzelfde gebeurd fomwylen aan den Hals en het Hoofd des Dyebeens; en hier uit fpruiten niet zelden moeilyke Verlofingen, Mankheid, en dergelyken.

§ 1573.

Lordofis. De INWAARDS GEBOOGEN RUGGRAAD, is alleen betreklyk tot deszelfs Lendendeel, en wordt ook hier zelfs, zeer zeldzaam waargenoomen. In dit geval, vald de Lenden meer of min inwaards; zyn de doornächtige Uitwafflen der Lenden.

Lendenwervelen nauwlyks voelbaar, en ſteeken de Billen meer agterwaards dan natuurlyk. De Lighaamen van voorgemelde Wervelen, en haare Kraakbeenderen, verdikken aan de voor- en verdunnen of gaan verlooren aan de agterzyde. De Doornägtige Uitwaffen, naderen elkanderen, de Schuinze verwyderen zig onderling aan de voorzyde. De Lyder daarënboven, kan niet gaan, dan ſteunend met zyne Handen op de Heupen.

§ 1574.

Dat foort van *Bogchel*, welk de Halswervelen inneemt, is een der moeilykſte tevens, en gevaarlykſte. In dit geval wordt het Hoofd ſomwylen, door dezelfs natuurlyke zwaarte, zoo ver vooröver geboogen, dat de Kin ruſt op het bovenſte gedeelte van het Borſtbeen. Dat de Ademhaaling uitermaaten moeilijk zyn moet, kan men daar uit afleiden, dat de Spieren van de Borſt gebreklyk gevoed worden, voor zoo veel zulks afhangt van de Zenuwen, en den Lyder niet ademt dan met behulp alleen van het Middenrif. Van deeze foort vooräl is waar, 't gene CÆLſUS gezegt heeft van de *Bogchels boven het Middenrif*; dat naamlyk, de Armen verlammen, en de Ademhaaling moeilyk is; dat 'er Braakingen beſpeurd worden; hevige pynen, en Stuiptrekkingen; als mede, dat ſomwylen het Gehoor geheel en al verlooren gaat.

§ 1575.

In de *Bogchel der Rugwervelen*, verliezen de Ribben hunne ſchuinze ſtrekking nederwaards; de aſtand des Borſtbeens van den Ruggraad, vermeerderd; het boven ſtuk deezes Beens ſomwylen, maakt een ſcherpe hoek met het onderſte; het zwaardwyze Kraakbeen puild veel meerder naar vooren dan natuurlyk; de Sleutelbeenderen, als de Lyder nog Jong is, verlengen; de Schouderbladen, zig plooiende naar den Ruggraad, worden holler; de Hals, om evenwigt te maaken met het Hoofd, dat altoos naar vooren neigd, wordt meer of min geboogen naar agteren; het Hoofd zinkt als tuſſchen de Schouderen; de op- en nederſchuiving der Schouderbladen, is grooter dan natuurlyk; de Ademhaaling, niet begunſtigd wordende door de beweging der lange Ribben, die tot eenen Horifontaalen ſtand gebragt zyn, geſchied moeilyk, en niet zonder eenig piepend geluid te veroorzaaken; de Holle ader, ter plaatze van den Bult tegennatuurlyk gekromd zynde, vertraagd dit de terugvloed des Bloeds van de benedenſte deelen, naar de zyde van het Hart, en veröorzaakt veelmaalen Aderſpatten aan de Beenen; de

bo-

bovenste en onderste Ledemaaten, schoonze haare natuurlyke lengte behouden, schynen korter, en de laatste ondergaan eene blykbaare vermindering in omtrek; de Gang eindelyk, door de verandering van het Zwaartepunt veranderd, geschied niet dan met het steunen der Handen op den Broeksband, of de Dyëbeenderen, en de agteröverwerping van het Hoofd.

§ 1576.

Als de *Bogchel* betreklyk is tot de Lendenwervelen, worden de Ingewanden van den Buik gedrukt door de vooröverbuiging van het Lighaam; de kolom der Wervelen maakt, of een scherpe, of een regte hoek met de Heupen; en de Lyder kan niet gaan dan met geboogen kniën, of op Krukken.

§ 1577.

De Toevallen van alle deeze Wangestalten, zyn na genoeg dezelfde, en verschillen nauwlyks dan in trappen. Men kan, als de voornaamste derzelver aanmerken, de langzaame verzwakking der Ledemaaten; derzelver Gevoelloosheid, Verlamming, Stuiptrekkingen, en Versterving; het verlies van het saamentrekend vermoogen der Sluitspiereu van den Blaas en Endeldarm, en de hier van afhangende, tegenwillige ontlasting der Uitwerpzelen; de Ettergezwellen, ter plaatze van den Bult of elders; het Beenbederf der Wervelen binnen de kromte begreepen; de Buikloop, en dergelyken.

§ 1578.

Alle deeze Toevallen, of de meeste derzelver, volgen onmiddelyk als de Wangestalte schielyk, en agtervolglyk, alsze langzaam gemaakt wordt. Het aantal derzelver, gelyk ook het gevaar datze insluiten, regeld zig doorgaans naar de plaats van den Bult, deszelfs oorzaaken, en de Jaaren zoo wel als Lighaamsgesteldheid van den Lyder.

§ 1579.

Wat de voorzegging betreft van alle deeze Wangestalten: men kan 'er in 't algemeen van zeggen, datze zeer ongunstig zy, en weinig voldoening insluit voor het lydend Voorwerp. In 't byzonder egter, en al het overige gelyk staande, is het scheeve Lighaam moeilyker te geneezen dan de *Bogchel*. De *Bogchel* van den Hals, is bezwaarlyker te herstellen, en wordt van meerder Toevallen gevolgt dan die der Rug; en deeze laatste geneest gemaklyker dan die der Lenden. Ver-
öuder-

ëaderde *Bogchels*, in welk gedeelte ook van den Ruggraad geplaatst, zyn minder herstelbaar dan *Versche*, en somwylen zelfs, volstrekt ongeneeslyk. Als de Bult verzeld is met *Beenbederf*, inwendige *Ettergezwellen*, of eene zieklyke *Weekheid* der *Beenderen*, is ze meestäl ongeneeslyk, en zelfs doodelyk. Een *Bogchel* met een flauwe boog, dat is, die verscheiden *Wervelen* tevens insluit, is minder gevaarlyk dan die met een scherpe. De een zoo wel als de ander derzelver geneezen ligter by *Jonge* en gezonde *Lieden*, dan by bejaarden en *Zieklyke*. Die van uiterlyke *Oorzaaken* afhanglyk zyn, worden met minder moeite hersteld, dan die het gevolg zyn van inwendige. Dezulke eindelyk, welke van *Buikloop* gevolgt worden, zyn naar het zeggen van *HIPPOCRATES*, door de *Ondervinding* meermaalen bevestigd, hier door alleen, somwylen geneezen.

§ 1580.

Het voornaame oogmerk van de behandeling deezer *Wangestalten*, is het bepaalen van derzelver voortgangen, de regting der *Ruggraad*, of het bewerken eener aaneengroeijing van de uitgeweeken *Wervelen*. In versche gevallen, niet verzeld van *Verzweering* of *Beenbederf*, heeft men meermaalen voortreflyke uitwerkingen gezien van *Etterdragten*, geplaatst aan de eene en andere zyde van den *Bogchel*, door den beroemden *POT*, zoo zeer aangepreezen. Niet minder gelukkig, niet minder dikmaalen, is men geslaagd met het aanhoudend gebruik van *Kuust-Keurslyven*, gemaakt door de Heeren *GRIMO* en *HUISLAND*, gelyk ook, door dat des *Werktuigs* van den Heere *VACHER*. Behandelingen waarlyk, wel kostbaarder, maar gemaklyker.

§ 1581.

Gelyk myn Plan niet toelaat, my in het breede te verklaaren over het saamenstel van *Werktuigen*, welken een ingesloopen gebruik meer onder het bewind steld van zekere byzondere perzoonen, dan van den Heelmeeester; zal ik alleen, ten opzigte der *Kuust-Keurslyven* kortelyk aanmerken; dat dezelve dus moeten worden toebereid, datze nog te ligt, nog te zwaar zyn: datze nauwkeurig sluiten langs den omtrek van het *Bekken*: datze niet te lang, ook niet te kort zyn aan de zyden: datze, noch door te groote wydte het *Lighaam* laten doorzakken, noch door te eng te zyn, de *Ademhaaling* belemmeren: datze van agteren gewapend zyn met eene veerkragtige *Yzere plaat*, die zig van beneden naar boven uitstrekt; smal is van onderen, breed van boven, en aan weêrzyden zelfs een gedeelte bestaat van de zydelyke deelen der *Borst*: datze in scherpe *Bogchels*, ter

Aaa

plaatze

plaatze van den Bult eene opening hebben, geflooten van binnen met de Voering, van buiten met het buitenste bekleedzel van het Keurslyf: dat het Yzer, ter bezorging van alle mooglyke ligtheid dun zy; en beneden meer kragt gegeven worde, alleen door het klinken van twee platen op elkanderen: datze van agteren en boven, eenigzints afwyken van het Lighaam; 't welk verkreegen wordt, door de Plaat buitenwaards uit te slaan: eindelyk; dat de fchouderstukken breed en vast zyn; en het geheele Keurslyf dus werke, als of men één zyner Kniën plaatsende tegen het agterste des Heiligbeens, het Bekken voorwaards drukt, terzelfder tyde, dat men door beide zyne Handen, de Schouders omvangende, de Ruggraad als dwingd naar de zyde der Uitftrekking.

§ 1582.

De behandeling der bykoomende, of byzynde Toevallen, is naar den verfcheiden aart derzelver verfchillend, en voor geene algemeene bepaalingen vatbaar. Algemeen genoomen, kan men hier omtrent aanmerken, dat, gelyk de meeste derzelver afhangen van de wanschikkelyke gedaante der Ruggraad, de verbetering ook van deeze, het voornaame hulpmiddel is dier Toevallen.

• *Curvatio*
membro-
rum.

De Kromming der Ledemaaten.

§ 1583.

Deeze is meest betreklyk tot de benedenste, tot de Dyëbeenderen naamlyk, de Scheen en Kuitbeenderen. Het Opperärmbeen egter, en de beenderen des Onderärms, zyn niet geheel onvatbaar voor deeze Wangefalte.

§ 1584.

Deszelfs gewoone oorzaaken zyn kwalyk geneezen Beenbreuken, de Engelsche Ziekte, geleeden geweld by de Verlofing, en het te kort bakeren der Kinderen.

§ 1585.

De Geneezing is in het eerste geval fomwylen mooglyk, fomwylen onmooglyk: de meer of minder vastheid van het Beenweer alleenlyk, bepaalen het een of ander. In het tweede geval, wordt dezelve meest altoos verkreegen door de behandeling der Engelsche ziekte § 1424. beschreeven, gepaart met het gebruik van Konftlaarzen, als hetzelve betreklyk is tot de onderfte Ledemaaten; en van zekere regtende, dog niet wel beschryfbaare Verbanden, als het opzigtelyk is, tot de bovenfte.

bovenste. In de twee laatste gevallen, die altoos betrekking hebben tot de onderste Ledemaaten, en vooräl tot de Beenen, wordt de geneezing best bewerkt door het Verband van mynen zeer verdienstelyken Vriend en Amptgenoot, den Heere LABEE, ter verbetering van de aangebooren binnen- en buitenwaardschen stand der Voeten, welk ik hier na zal mededeelen; naar den eisch der verschillende kromtens, op deeze, of gene wyze verändert.

De Kromming der Roede.

*Curvatio
penis.*

§ 1586.

De opgerigte Roede, kromt zig somwylen op neder- of zydwaards, en verhindert zeer de Byslaap.

§ 1587.

Het tweede geval, is somtyds afhanglyk van eene te groote kortheid van het toomtje der Voorhuid, en kan door eene voorzigtige losmaaking van dit geholpen worden.

§ 1588.

De eerste en laatste gevallen, zyn meestäl gevolgen, of laat ik liever zeggen, toevallen van eene Venerische Druiper, van sommige andere Venerische gebreken der Roede, en van eene te groote saamentrekking der Spieren. Deeze, voor zoo veel ze vatbaar zyn voor geneezing, worden best geholpen, door het uit- en inwendig gebruik van Kwikmiddelen.

*Impressio
partium.*

De indrukking der Deelen.

§ 1589.

Deeze wordt meest gezien aan het Hoofd en de Borst van zeer Jonge Kinderen, en is afhanglyk van eene indrukking van een gedeelte des Bekkeneels of der Ribben, veröorzaakt door eene moeilyke Verlofing, door eenig geleden geweld, of door het onöplettend draagen der Kinderen op den Arm.

§ 1590.

Eenen toeneemenden Ouderdom, de groeiing van het Lighaam, en het in agt

neemen van zekere kleine oplettenheden in het kleeden en draagen der Jonggeboornen, verbeteren, en geneezen doorgaans deeze Wangestalten.

*Contractio
membro.
rura.*

De opkrimping der Ledemaaten.

§ 1591.

Door deeze versta ik hetzelfde, 't gene veele andere Heelkundige betrokken hebben tot de onwaare Gewrigtsverstyvingen; naamlyk, eene zoo groote strakheid, of inkrimping der Spieren, Banden, of Peezen, dat het aangedaane Deel, ter plaatze van het Gewrigt, hoekswys geboogen is, en buiten de mooglykheid, om te kunnen uitgestrekt worden.

§ 1592.

Alle Gewrigten zyn voor deeze Wangestalte vatbaar; meestäl egter wordt dezelve inzonderheid bespeurd aan het Kniegewrigt, dat des Elboogs, en de Gewrigten der Vingeren.

§ 1593.

Deszelfs meest gemeene oorzaaken zyn, Zinkingächtige vloeijingen; eene langduurige houding van eenig Deel, in eenen zelfden stand; Krampächtige saamentrekking der Spieren; het Loodkolyk; de bepaalde verlamming van zekere Spieren; de Jigt; het Venusmet; de Scheurbuik; eenen hoogen Ouderdom, en hier van afhangende verbeening der Banden, met betrekking vooräl tot de Ruggraad; en eene zeer werkzaame Levenswys, opzigtelyk inzonderheid tot de Vingeren.

§ 1594.

De Geneezing, algemeen genoomen, is moeilyk, langduurig, en somwylen zelfs onmooglyk. Weekmaakende Stovingen, Smeerzels, Pappen, en Dropdamp of gemeene Baden, zyn in alle gevallen van deezen Aart, de beste Hulpmiddelen.

§ 1595.

In het byzonder, wordt dezelve zeer bevorderd, met opzigt tot het gewrigt des Elboogs, door den Arm, by herhaaling, en zoo dikwyls zulks mooglyk is, te steeken in den nog warmen opgesneeden Buik van versch geslagte Dieren; en het draagen
of

of opheiffchen van een trapswys vermeerderden Laft; en met betrekking tot het Kniegewrigt, door het aanhangen van allengskens verzwaarde Gewigten, op de wyze §. 1492. aangepreezen, en uitgedagt door mynen bekwaamen Kunstgenoot den Heere KRIEGER.

§ 1596.

Gevallen van deezen aart, afhanglyk van het Loodkolyk, de Jigt, het Venusfmet, en de Scheurbuik, kunnen niet geholpen worden, dan door dezelfde behandeling, voor zoo veel betreft het Heelkundige; en Geneeskundig, door het gebruik van foortelyke Hulpmiddelen.

§ 1597.

Dezulke, die veröorzaakt zyn door eene bepaalde verlamming van zekere Spieren, eiffchen de toepaffching van verfterkende Middelen op de verlamde, en van verflappende, op de faamengetrokken Spieren. Die van Ouderdom afhangen, zyn ongeneeslyk; dus is het ook meeftäl gelegen, met die der Vingeren, uit hoofde eener zeer werkzaame Levenswys.

De buiten en binnenwaardsch gekeerden stand der voeten.

*Vari &
Valgi.*

§ 1598.

Deeze Wangeftalten, die altoos aangebooren zyn, beftaan fomwylen op zig zelven; fomwylen zyn ze verzeld van eene kromming der Scheen- en Kuitbeenderen.

§ 1599.

In het eerfte geval, kunnen dezelve verholpen worden door de klompjes des Heeren VANDER HAAR; in het laafte zoo wel als in het eerfte, door het Verband des Heeren LABEE, welke beiden ik ter zyner plaatze zal beschryven en afbeelden.

De Paarde . Voeten.

*Pedes
equini.*

§ 1600.

Men kan van deeze Wangeftalte, ten opzigte van haaren Oorfprong, hetzelfde zeggen, als van de voorige; te weeten, dat ze altoos is aangebooren.

§ 1601.

Als we de Geschiedschryvers gelooven moogen, zyn 'er Eilanden in de Zwarte Zee, welker bewooners alle daar aan onderhevig zyn. Deeze worden om die reeden genoemd, *Hippopodes*, een Grieksch Woord, betekenende niet anders, dan *Paardevoetigen*.

§ 1602.

Men kan deeze Wanvormigheid verheelen door schoenen, van buiten gemaakt op de gewoone wyze, maar van binnen verlangd door een houten of Kurken Zool; en verbeteren, door het vroegtydig uitrekken van de Voeten, en het gebruik van een Verband, dat de groeiing deezer Deelen bedwingd in de breedte, en begunstigt in de lengte.

*Ungues
incurvati.*

De Krulwyze Nagels.

§ 1603.

De Nagels der Vingeren, en Teenen, groeijen dikmaalen krulwys opwaards, en maaken eene Wangestaal, die ten opzigte der eersten inzonderheid, zeer mishaaglyk is; en met betrekking tot de laaften, gelegenheid geeft tot eenen pynlyken gang, ontsteking, en verzwearing van de einden der Teenen.

§ 1604.

Meestäl zyn deeze wanwormigheden afhanglyk, van Teering, en eene Scheurbuikige scherpte der Vogten. Somwylen egter, worden die der Teer-nagels veröorzaakt, door te korte schoenen, of het groeijen van Lykdoorns, of Eelt onder deezen.

§ 1605.

De twee eerste deezer gevallen zyn niet te verbeteren, dan door het verbeteren zelve der Ziekten van welke ze afhangen, 't gene niet altoos mooglyk is. De omkrulling der Teen-nagels, door te korte Schoenen veröorzaakt, wordt door het draagen van langer en eenigzints ruimer Schoenen verholpen. Als het Lykdoorns zyn of Eelt, die de omkrulling te wege brengen, moet men de Nagel zoo verre weg snyden als mooglyk zy, en het Eelt, of de Lykdoorn, gedeeltelyk weg neemen met het Mes, gedeeltelyk met den *scherpen Geest des Zeezouts*, door middel van een *Pinceel*, van tyd tot tyd daar aan gebragt.

V. HOOFD-

V. H O O F T D E E L.

*De Plaatsverandering der Deelen.**Collocatio
perversa
partium.*

§ 1606.

Alle plaatsing der Deelen, anders dan met de gewoone orde der Natuur overeenkomt, wordt eene plaatsverandering derzelver geheeten.

§ 1607.

Tot de Klasse van deeze worden voornaamlyk gebragt, een Oog in het Voorhoofd, een Tand in het verhemelte, het Hart buiten de Borst, de Lever buiten den Navel, de Schaamte onder den Navel, en dergelyken.

§ 1608.

Gelyk geene derzelver, de Tand in het verhemelte uitgezonderd, kan verholpen worden, zal ik my in geene byzondere beschryving van elk dier wangestalten inlaaten; maar slegts vergenoegen met aantemerkken, datze alle behooren tot den Rang der Natuurspeelingen, en de Tand des Verhemelte moet uitgetrokken worden.

VI. H O O F T D E E L.

*De tegennatuurlyke aaneengroeiingen.**Connexio
contranaturalis.*

§ 1609.

Deelen, natuurlyker wyze van een gescheiden, groeijen somwylen aan elkander, 't zy middelyk, of onmiddelyk; 't zy uit geboorte of toevallig.

§ 1610.

De aaneengroeiing der Vingeren of Teenen, de aangroeiing der Tong, die der Bovenlip, gelyk ook de aaneengroeiing der Gewrigten, zyn de voornaamsten deezer Wangestalten.

De

*Connexio
digitorum
manus &
pedis.*

De aanëengroeiing der Vingeren, en Teenen.

§ 1611.

Deeze groeijen aan elkanderen, door tusfchenftelling van een tegennatuurlyk Vlies, of door eene onmiddelyke aanraking van derzelve Zydedeelen.

§ 1612.

Het eerste geval is altoos eene fpeeling der Natuur, en kan niet verhoed worden. Het laafte, dat door eene Wonde, Branding, of Verzweering, veroorzaakt wordt, kan men voorkoomen, door regelmaatige verbanden; verbanden, welke niet toelaaten, dat de ontvelde oppervlakten deezer Deelen, elkander aanraaken.

§ 1613.

Beide gevallen zonder onderscheid, worden geneezen, door eene voorzigtigevaneenscheiding met het Snymes; en door dergelyke Verbanden als ik zoo even gemeld hebbe.

§ 1614.

Somwylen egter, is het een en ander, ik wil zeggen, de verhoeding, en geneezing, zeer bezwaarlyk, en eifcht al de oplettenheid des Heelmeefters, uit hoofde eener byna onöverwinbaare neiging tot faamengroeiing, vooräl in de gemeenfchaplyke hoeken van de een en ander der voorgemelde Deelen.

De aangroeiing der Tong.

*Connexio
contranaturalis
Linguae;
ve. Ancyloglossum.*

§ 1615.

De Tong is fomwylen, by Jonggeboorne Kinderen, door eenete breede Tongriem zoodaanig gehegt aan het onderfte gedeelte van den Mond, dat dezelve niet kan gebragt worden over de Kieuwen; en dus meer of min werkelooos is in het zuigen.

§ 1616.

Als we Onkunde en Baatzugt gelooven moogen, is deeze kleine Wangefalte zeer gemeenzaam. Geduurende den gantschen loop myner Konftoeflening egter, heb-

hebbe ik dezelve niet meer dan vyfmaalen aangetroffen. Ze wordt verholpen door eene voorzigtige doorknippling van den Tongriem, gedaan op die wyze, en met die voorzorgen, als ik ter zyner plaatze zal aanwyzen.

De aangroeiing der Bovenlip.

§ 1617.

De bovenlip by Kinderen, bevindt zich dikmaalen in hetzelfde geval als de Tong, en is te veel gehegt aan het Tandvleesch der Opperkaak.

§ 1618.

Deeze aanhegting, veröorzaakt eene gebreklyke uitspraak van zekere Letteren, en kan door eene gelyke Konftbewerking, dat is, door het afnyden van den zogenaaften Lipriem, worden weggenoomen.

De aanéengroeiing der Gewrigten.

§ 1619.

Van deeze is reeds gefproken in het Leerftuk der Beenziekten, en wel bepaaldelyk § 1486. waarheen wy derhalven den Leezer verwyzen.

VII. H O O F T D E E L.

De toegroeiing der Natuurlyke openingen.

§ 1620.

Door natuurlyke openingen, verftaat men, die der Oogleeden, der Neusgaten, des Monfs, der Gehoorweg, des Voorhuids, des Pisbuis, van de Lippen der Schamelheid, van de Schede, van den Mond der Lyfmoeder, van den Aars, en van den Endeldarm.

§ 1621.

De toegroeiingen van deezen derhalven in het algemeen, en van elk derzelver in het byzonder, zyn de voornaame onderwerpen van dit Hooftdeel.

*Connexio
contrana-
turalis La-
bii, uperi-
oris.*

Ancylesis

*Coalitus
foraminum
naturalium.*

*Aneylo-
blepharon.*

De Aanéengroeiing der Oogleeden.

§ 1622.

Deeze, die zeldzaam aangebooren, maar meestäl toevallig is, en of geheel of ten deele, de Oogleeden inneemt, zal ik meer opzettelyk beschryven in het Leerstuk der Oogziekten, tot de onderwerpen van welke, men haar altoos betrokken heeft.

*Coalitus
narium.*

De Samengroeiing der Neusgaten.

§ 1623.

De *Samengroeiing der Neusgaten*, is somwylen aangebooren, somwylen is ze het gevolg eener Wonde, Verzweering, Branding, en dergelyken.

§ 1624.

In het eerste geval, is ze dikmaalen zeer moeilyk te overwinnen, uit hoofde van de uitgebreithed der aanéengroeiing in de diepte, en om dat men uitwendig geen het minste spoor der Neusgaten aantreft. In het laatste is de geneezing gemaklyker, doordien ze veeläl niet zeer aanmerklyk is, en meer den ingang der Neusholten betreft, dan derzelver uitgebreithed.

§ 1625.

In beide gevallen, wordt in de eerste plaats verëischt, de vanéénscheiding der samengroeiing, met het Snymes; en vervolgens, het gebruik van verwydende Steekwieken, Kaarsjes, en Canullen, gemaakt van de bereide Spons, van Perkement met Goudvlies bekleed, van de veerkragtige Hars van Cajenne, en dergelyken.

*Coalitus
labiorum.*

De Samengroeiing der Lippen.

§ 1626.

De Lippen, uit de geboorte, of toevallig aanéengegroeid zynde, 't zy geheel, 't zy gedeeltelyk, moeten op eene ingebragte geboogen en dunne Sleufsonde, of zonder dezeive, naar eisch van het geval, voorzigtiglyk met het Snymes gescheiden, en door een tusschengelegde Band, langs het Agterhoofd geleid, en op het Voorhoofd samengestrikt, van een gehouden worden.

§ 1627.

*De Samengroeiing der Gehoorweg.**Coalitus
meatus
auditorii.*

§ 1627.

Deeze is buitengemeen zeldzaam, en moet, oppervlakkig, en vliesächtig zynde, door eene kruisfnede, en het opvolgend gebruik van voorgemelde Kaarsjes of Canullen, geneezen worden. Alle andere samengroeiingen van dit Deel, dat is te zeggen, die een merklyk gedeelte van hetzelfde inneemen, en van eenen vleeschäctigen aart zyn, of van eene algemeene ontäarting, en onderlinge aanraaking van het binnenste bekleedzel des gehoorwegs afhangen, zyn in eenen volstrekten zin, ongeneeslyk.

*De Samengroeiing en Vernauwing der Voorhuid.**Coalitus
& Obsti-
pacio præ-
putii.*

§ 1628.

De samengroeiing, en verënging der Voorhuid, geschied, of geheel, of gedeeltelyk, en is aangebooren, of toevallig. Hoedaanig dezelve ook zyn mooge, en van welk eene oorzaak ze afhange, ze verwekt altoos eene moeilijke of geheel belette pisloozing, en eene bezwaarlyke of onmooglyke Byslaap.

§ 1629.

Als deeze samengroeiing geheel is, en by jonggeboorne Kinderen plaats grypt, moet men trachten dezelve voorzigtiglyk te openen met het Snymes, om eene vrije ontlasting te bezorgen aan de Pis. In de enkele verënging der Voorhuid, 't zy by Kinderen, 't zy by Bejaarden, moet dit deel, de noodzaaklykheid zulks vorderende, op eene wyze welke wy naderhand zullen voordraagen, gekliefd worden. Ongeneeslyke fluitingen van dit Deel, met nevensgaande blyken eener welgestelde Pisweg, eischen de besnydenis.

*De Samengroeiing der Pisbuis.**Coalitus
uretrae.*

§ 1630.

Deeze is betreklyk, of alleen tot dezelfs buitenste opening, of tot het meeste gedeelte zyner uitgestrektheid. Het eerste geval is doorgaans vliesächtig, en het gevolg eener Natuurspeeling: het laaste kan afhangen van verscheidenerlei oorzaken, maar vooräl van Venusmet.

§ 1631.

De eerste foort deezer Samengroeiing, moet verholpen worden door het Snymes: de laatste vorderd eene behandeling, van welke wy spreken zullen by gelegenheid der Verhandeling van de Ziekten des Piswegs.

*Coalitus
labiorum
pudendo-
rum*

De Samengroeiing van de Lippen der Schamelheid.

§ 1632.

De Lippen der Schamelheid groeijen aan elkanderen, uit geboorte of by Toeval, en moeten van een gescheiden worden door het Snymes. Het is het zelfde met de aanéengroeiing der Watervleugels, 't zy geheel, 't zy gedeeltelyk.

*Coalitus
Vaginae.*

De Samengroeiing der Schede.

§ 1633.

De Schede is fomwylen geflooten aan haaren ingang door het Maagdenvlies; of in haar midden, door een tegennatuurlyk Vlies; of in het geheel, door eene onderlinge aanéengroeiing haarer Wanden.

§ 1634.

Alle deeze Wangestalten verhinderen de ontlasting der Maandstonden, en den Byslaap. De twee eersten, kunnen door eene insnyding verholpen worden. De laatste, is in meest alle voorkoomende gevallen onherstelbaar.

*Coalitus
ostii uteri.*

De Samengroeiing van den Mond der Lyfmoeder.

§ 1635.

Deeze, die altoos is aangebooren, wordt niet ontdekt voor den tyd der Maandelyksche zuiveringen, welke alsdan niet te voorschyn koomen; en door haare verzaamling in de holte der Lyfmoeder, dit Deel, onder het gevoel van zeer hevige pynen, in de Schede doen nederzinken.

§ 1636.

Dit geval is niet geneesbaar dan door eene konstige vanéenscheiding; eene Bewerking, die altoos moeilyk, en fomwylen zelfs onmooglyk is.

*De Samengroeiing van den Aars.**Coelitis ani.*

§ 1637.

De opening des Endeldarms is fomwylen geflooten door een Vlies, fomwylen door tuffchenftelling eener meer of min uitgebreide vleefchägtige Zelfftandigheid.

§ 1638.

Beide gevallen kend men aan eene agterblyvende ontlasting van de ftof des afgangs, en de blykbaare ontbeering van de opening des Endeldarms. Het eerfte geval, wordt meer byzonderlyk gekend uit eene blauw-zwarte, en eenigzints golvende zwelling ter plaatze van den Aars, en deszelfs geheele toefluiting door deeze.

§ 1639.

Dit geval moet geneezen worden door eene kruiswyze opfnyding van het Vlies door hetwelke den Endeldarm geflooten is, en het wegfnyden der vier overblyvende lappen, zonder eenig opvolgend gebruik van opvullende of verwydende Werktuigen, of Verbanden.

§ 1740.

Het laafte geval, eifcht insgelyks eene konftige doorbooring; 't zy met het verborgen Lancet, 't zy met eenig ander Werktuig, geleid met alle mooglyke voorzigtigheid tot in de holte des Endeldarms. Het gebruik van verwydende Kaarsjes, is in dit geval zoo nutloos als in het voorige.

*De Samengroeiing van den Endeldarm.**Coelitis intestini recti.*

§ 1641.

De zyden des Endeldarms, zyn fomwylen by Jonggeboorne Kinderen, op eenen zekeren en onbepaalden afstand boven deszelfs uiterlyke opening, dermaaten aaneen gegroeid, dat daar door de ontlasting der uitwerpzelen geheel onmooglyk gemaakt wordt.

§ 1642.

Deeze aaneengroeiing, die maar al te dikmaalen plaats grypt, is zeer zorgelyk, en nauwlyks voor eenige hulp vatbaar. Altoos egter moet men beproeven,

Bbb 3.

oma

om dezelve te doorbooren met de driekante Priem, de *Pharyngotomus*, of met eenig ander dergelyk Werktuig, beftierd met de uiterfte voorzigtigheid, en ingebragt langs eene Lyn, evenwydig aan den As van het Bekken. Twee dergelyke Konftbewerkingen, door my, en drie anderen, door even zoo veel myner Konftgenooten, federt weinig Jaaren gedaan, hebben alle een doodelyk gevolg gehad, of fchoon ten minften drie derzelver tydig genoeg ondernoomen werden, om een beter uitkomst te hoopen. Ik meende dit hier te moeten byvoegen, om den Jongen Heelmeester voorzigtig te doen zyn in zyne voorzegging, en hem niet te veel te doen betrouwen, op de gezegdens van sommige, meer befchouwlyke dan ervaren Heelmeesters, die van deeze Konftbewerking fpreken, als of dezelve alle mooglyk gemak en zeekerheid infloot.

VIII. H O O F T D E E L.

De tegennatuurlyke van een fcheidingen.

*Solutiones
contranaturales.*

§ 1643.

Door deezen worden hier ter plaatze verftaan, alle aangebooren of toevallig verkreegen, gefcheiden geheelheid van deeze of gene Deelen, mits dat dezelve van alle zyden met Huid bedekt zyn, en geheel niet deelen in de hoedanigheeden eener Wonde, of Verzweering.

§ 1644.

De *Haazelip*, de *gespleeten Oorlel*, de *gespleeten Voorhuid*, de *gespleeten Lippen der Schamelheid*, en de *gespleeten Bilnaad*, zyn de meeft gemeenzaame deezer Wangefaltten.

*Labium
leporinum.*

De Haazelip.

§ 1645.

De *Haazelip*, ftrikt genoomen, is eene aangebooren loodlynige Splyting der Bovenlip, in twee of meerder deelen, met, of zonder nevensgaande van een fcheiding van het beenig en zagte Verhemelte.

§ 1646

§ 1646.

In eene eenvoudige Haazelip zonder scheiding des Verhemelte, is het zuigen na genoeg onbelemmerd; vermits de Kinderen, de Tepel der Moeder meer omvatten met de Kieuwen, dan met de Lippen. In eene saamengestelde daarëntegen, dat is te zeggen, als tevens het Verhemelte gespleeten is, wordt het Zuigen belemmerd in eenen meerderen of minderen graad, en somwylen zelfs, geheel en al vernietigt. De uitgebreidheid der laastgemelde splyting inzonderheid, bepaald het een en ander.

§ 1647.

Ter geneezing deezer Wangestalte, voor zo veel betreft de Lip zelve, wordt verëischt, dat men de randen der scheiding met de Schaar of het Mes wegneeme op eene wyze welke wy naderhand zullen voordraagen; en de verëéniging bewerke, door het hier toe uitgedagt Verband, of de omgewonden Hegting, welke beide wy in het Leerstuk der Konstbewerkingen, in alle haare byzonderheden zullen aanwyzen.

§ 1648.

Wat betreft de behandeling der samengestelde Haazelip; hier omtrent kan ik ter deezer plaatze kortelyk aanmerken, dat de Splyting des Verhemelte somwylen door de Natuur zelve geslooten wordt, als de scheiding der Lip verëénigt is; en dat, dit niet geschiedende, dezelve kan gestopt worden, door het Werktuig, § 388.gemeld, in groote en gedaante gelyk gemaakt, aan die der vanéénwyking.

De gespleeten Oorlel.

*Fisfus la-
bus auris.*

1649.

Deeze is doorgaans het gevolg eener verwaarloosde Wonde van dit Deel, of van de doorslyting van te zwaare Oorfieraaden. Ze wordt verholpen door het rauw maaken der bevelde randen met de Schaar, en het gebruik der drooge Hegting, na dat men alvorens de ruimte agter het Oor heeft opgevuld met een Drukdoekje van pleister, of iets anders, om een behoorlyk steunpunt te geeven aan het Verband, dat uit niets anders bestaat dan uit eene dubbele strook Linnen, die van onder de Kaak, over de Ooren opklimt tot aan het Opperhoofd, en aldaar, op deeze of gene wyze bevestigd wordt.

De

*Fisum
preputium.*

De gespleeten Voorhuid.

§ 1650.

De Splyting der Voorhuid, is of aangeboren, of toevallig. In beide gevallen is de geneezing gedeeltelyk noodloos, gedeeltelyk onmooglyk; althans langs den weg van herëeniging.

De gespleeten Lippen der Schamelheid.

*Fisfa
labia pu-
denda.*

§ 1651.

Deezen, die zeldzaam gezien worden dan by Vrouwen die veel Kinderen ter Wereld gebragt hebben, of onderworpen zyn aan Venusziekte, eischen in het eerste geval geenerlye Konsthulp, en worden in het laatste geneezen door het in- en uitwendig gebruik van Kwikmiddelen.

*Fisura
perinealis.*

De gespleeten Bilnaad.

§ 1652.

Moeilyke Verlossingen, en onvoorzigtige behandeling der Baarende, geevendikmaalen aanleiding tot deeze Wangestalte, die niet kan geneezen worden, dan door het wegfnyden der bevelde randen van de Splyting, en de afgebrooken Hegting.

IX. H O O F T D E E L.

*Motio &
Actio per-
versa par-
tium.*

De Wanvormige beweeging, en werking der Deelen.

§ 1653.

Alle Deelen van ons Lighaam, hebben hunne bepaalde Beweegingen en Werkingen, welke niet kunnen vernietigd of belemmerd worden, zonder gevolg eener meer of min blykbaare Wangestalte.

§ 1654.

Oneindig zeeker, is het getal deezer vernietigingen, en belemmeringen. De zulke egter, welke inzonderheid tot ons tegenwoordig bestek behooren zyn het

Mank-

Mankgaan, de *Verlamming*, de *Stemsverdooving*, de *Stomheid*, het *Lispen*, het *Stamelen*, de *Hardhoorenheid*, en de *Doofheid*.

Het Mankgaan.

§ 1655.

MANKHEID is eene wanorde in de voortgaande beweeging des Lighaams, waar ^{Claudica-} by hetzelfde, ter regter of linker zyde, of wel beurtelings, dan over de eene, dan ^{tie.} over de andere, overvald.

§ 1656.

Deszelfs onmiddelyke oorzaak, is de verschillende lengte, of ongelyke beweeglykheid der onderste Ledemaaten.

§ 1657.

Tot de afgelegen oorzaaken behooren, eene scheefheid des Ruggraads, vooral in de Lendenwervelen; eene scheefheid van het Bekken, 't zy eigenleidend, 't zy toevallig; eene ongelyke groeiing der onderste Ledemaaten, zoo in 't geheel, als gedeeltelyk; een aangeboren, of toevallig gemis van het hoofd des eene of andere Dyebeens; eene afknakking van dit Hoofd by Kinderen, en de hier van afhange opreizing des Dyebeens; eene veranderde gedaante van deeze of gene Heupkom, en van het een of ander hoofd des Dyebeens; een beenig uitwas in één der Heupgewrigten; eene gebreklyke vorming van één of meer Beenderen der benedenste Ledemaaten; eene toevallige doorbuiging derzelver; eene onherstelde Ontwrigting van het Dyebeen; eene kwalyk geneezen Beenbreuk van het Lighaam deezes Beens, of van deszelfs Hals; gelyk ook, eene zwakheid der Banden van het Heupgewrigt, afhanglyk van Engelsche Ziekte.

§ 1658.

Sommige deezer soorten van Mankheid zyn geneeslyk, andere niet. De laatste kunnen eenigermaten te gemoet gekoomen worden door het gebruik van deeze of gene der algemeen bekende Werktuigen, hooge Schoenen, en dergelyken. De geneeslyke eischten Hulpmiddelen overeenkomstig met haare oorzaaken, en zyn voor geene algemeene behandeling vatbaar. Het gebruik van Kunst-keurslyven, in die afhangen van eene scheve Ruggraad; van Konstlaarzen, in die veröorzaakt worden door eene Kromming der Beenderen; en van versterkende Plaatsmiddelen,

in die gegrond zyn op eene zwakheid der Gewrigten; is byna alles wat men ten deezen opzigte kan aanpryzen.

De Verlamming.

§ 1659.

Paralysis VERLAMMING betekend eene gedeeltelyk of geheel vernietigde Spierbeweeging van eenig Deel, 't zy met 't zy zonder deszelfs Vermagering of Uitdrooging, en gevoelloosheid.

§ 1660.

Derzelver oorzaaken zyn ontelbaar, en kunnen by geene mooglykheid bepaald worden. Als de voornaamsten egter mag men aanmerken, eene beleediging der Hersenen en van het Ruggemerg; eene toevallige en aanhoudende drukking van zekere Zenuwen; derzelver affnyding; de blootstelling van een of meer Deelen, of van het gantsche Lighaam, geduurende eenen zekeren tyd, aan eene koude en vogtige Lugt; en wat dergelyke meer zyn.

§ 1661.

Ter geneezing wordt inzonderheid vereischt, het wegneemen der oorzaaken, als deeze bekend zyn, en zulks mooglyk is. In alle andere gevallen moet men gebruik maaken van eene voedende en verkwikkende Eetregel; van prikkelende en opwekkende Geneesmiddelen; van algemeene of byzondere Lighaams beweegingen; van versterkende en prikkelende plaatsmiddelen, in de gedaante van Zalven, Pleisters, Pappen, Stovingen, Smeerzels, of Wasfingen; van dergelyke Baden; van Slingeringen met Brandnetels; van herhaalde aanleggingen van Spaanschevliegen pleisters; van drooge Koppen; van het Electrizeeren; en dergelyken. Drooge Wryvingen van het verlamde Deel daarenboven, met enkele wolle Doeken, of met deeze, doortrokken met den damp van Mastik, Wierook, Barnsteen, en andere speceryeächtige Hulpmiddelen, moeten nimmer verzuimd worden.

De Stemsverdooving.

§ 1662.

*Exstinctio
vocalis.*

Door STEMSVERDOOVING verstaat men die verandering der Menschelyke stem

stem, welke het naast grensd aan de Stomheid, dog noch eenig vermoogen tot spreken overlaat.

§ 1663.

Deszelfs meest gewoone oorzaken zyn het inademen van eene Lugt, die zeer koud, vogtig, of met zekere vreemde Zelfstandigheden bedeed is; het aanhoudend gebruik van slymige, scherpe, en zoute Spyzen; eene zeer groote Bloedrykheid; en hevige aanvallen van Schrik, Blydschap, of Verwondering.

§ 1664.

De Geneezing wordt verkreegen, door het aanwenden van Hulpmiddelen, tegengesteld aan de een en ander deezer oorzaken; dat is te zeggen, door het inademen eener warme drooge en zuivere Lugt in het eerste geval; door het gebruik van zachte en gezonde Voedzelen in het tweede; door eene schraale Eetregel, werkzaame Levenswys, en herhaalde Aderlaatingen, in het derde; gelyk ook, door het toedienen van krampstillende en verdoovende Geneesmiddelen, in het vierde. Ik bekenne, dat verscheiden deezer Hulpmiddelen meer behooren tot de Genees- dan Heelkunde; maar, het schynd my onmooglyk de juiste grens-scheidingen te bepaalen van de een en ander, en hebbe ik hierom geene zwaarigheid gemaakt om zoo hier als elders deeze aantewyzen.

De Stomheid.

§ 1665.

STOMHEID stelt een volstrekt onvermoogen, om onze gedagten door middel van den Spraak, mede te kunnen deelen aan anderen.

Aphonia.

§ 1666.

Dit gebrek is afhanglyk van verscheidenerleije Oorzaken, maar vooräl van eene gebreklyke vorming der Tong, van deszelfs Verlamming, van eene slapheid deezer Werktuigs, van eene te groote opvulling der ondertongfche Vaten, van zekere schynbaar geringe gestookten Wondjes, en van Doofheid.

§ 1667.

De eerste foort van Stomheid is niet geneeslyk, en kan nauwlyks gekend worden,

den, dan door zig zelve te verzeekeren, dat gene der overige Oorzaaken plaats hebben.

§ 1668.

De tweede foort kan geneezen worden, mits dat de Verlamming plaatslyk is, en niet afhangt van Oorzaaken, welke het buiten onze magt is, weg te neemen. Een der beste Hulpmiddelen in dit geval, is het versh geperste Sap van Wyn-gaard bladen, met Suiker gemengd, en dagelyksh gedronken in de hoeveelheid van twee of drie Oncen. Alle andere Hulpmiddelen, ter geneezing der Verlamming § 1661. voorgeschreeven, en toegediend op eene wyze als met de byzondere Natuur deezes Deels overéénkomt, kunnen hier nevens gebruikt worden.

§ 1669.

De derde foort van Stomheid, by Jonge Kinderen plaats grypende, geneest somwylen by het toeneemen des Ouderdoms van zelve; en wordt meestäl geholpen, door Buikzuiverende, en Versterkende Geneesmiddelen, gepaart met het gebruik van Mondspoelingen, welke van eenen prikkelenden, saamentrekkenden, of versterkenden aart zyn. Deeze foort heeft dit byzonders, dat ze somwylen periodiek is, en zig inzonderheid schynd te regelen naar de verschillende gesteldheid van den Dampkring.

§ 1670.

De vierde foort, wordt door niets zoo vaardig en zeeker geneezen, dan door het openen der Kikvorsh aderen, van FORESTUS in dergelyke gevallen beproefd met den besten uitslag.

§ 1671.

De vyfde foort, die inderdaad zeer zeldzaam is, ten minsten wanneer dezelve niet gepaart gaat met eene Krampägtige fluiting der Kaakbeenderen, wordt nogthans beweezen door eene zeer zonderlinge Waarneeming van voorgemelden Geneesheer; en geholpen, door de Aderlaating, Buikzuivering, Weekmaakende Pappen aan den Hals aangelegt, en vooräl door het gebruik van het Heulsap, de Muskus, de Bevergeil, en dergelyken.

§ 1672.

Het laatste foort van Stomheid is niet geneeslyk, dan door de geneezing zelve der

der Doofheid, van dewelke zy, als van eene Oorzaak, op eene onmiddelyke wyze afhangt. Altoos is dezelve aangebooren, even als de Doofheid, op welke ze gegrond is. Eene zeer zonderlinge en moeilijke Kunst, door WALLISIUS uitgedagt, door AMMAN en andere verbeterd, stelt dezulke die aan dit gebrek onderhevig zyn, wel fomwylen in staat, tot het uitspreken van zekere Woorden, by hun met een onverbeeldelyk geduld, en eene uiterste oplettendheid geleerd; maar is hen voor het overige, van weinig nut in de Saamenleving; en geheel niet in den omgang met Menschen, welke zy niet van naby kennen, of wier beweeging der Lippen zy niet kunnen waarneemen.

Het Lispem.

§ 1673.

Het LISPEN, is eene gebreklyke, of onmooglyke uitspraak van zekere Letteren, gegrond fomwylen op een aangebooren gebrek van de Tong, fomwylen op eene wraakbaare navolging van anderen.

Blasfem.

§ 1674.

In het eerste geval, is hetzelfde dan eens al, dan eens niet geneeslyk, naar dat het gebrek der Tong, of al of niet kan verholpen worden. In het laaste is de geneezing altoos mooglyk, dog niet zoo zeer door Heelkundige Hulpmiddelen, dan wel, door eene oplettende Opvoeding.

§ 1675.

Het geneeslyk foort deezer wanvormige Uitspraak, afhanglyk van eenig aangebooren Tong gebrek, is meest gegrond op eene te korte, of te dikke Tong- of Lipriem, en kan in beide gevallen verbeterd worden door eene geringe Konstbewerking, het afnyden naamlyk van deezen.

§ 1676.

Het Lispem uit navolging, om geen gebruik te maaken van dwangmiddelen, wordt best verholpen, door nauwkeurig agt te geeven op het foort van Letteren, welke kwalyk of niet worden uitgesproken, en de Kinderen te gewennen aan het uitspreken van Gezegdens, niet zoo zeer van Woorden, waarin deze Letters voorkoomen. Een enkel voorbeeld zy genoeg om dit op te helderen. Ondersteld dat een Kind, de Letter R, in alle woorden waar dezelve voorkomt, niet,

of op eene gebrekkige wyze uitspreekt; doet hetzelfde dikmaalen uitspreken, op uw eigen voorbeeld, de gemeenzaame Spreekwyzen, *één Oijevaar maakt geen Zomer; de kruik gaat zoo lang te Water, tot ze breekt; het Regend nimmer op den een, of het Druppeld, tevens op den ander; de vrees voor gevaar, is erger dan 't gevaar zelve*; en steld op het goed uitspreken van deeze, of eenige andere dergelyke gezegdens, waarin de Letter R by opklimming, meer en meer dikmaalen inkomt, eene belooning, met den smaak van het Kind zoo veel mooglyk zy, overeenkomstig. Zelden zeeker zal het missen, of hetzelfde, reikhalzende naar den beloofden prys, zal zig alle mooglyke moeite geeven, om de een en ander zoo goed uit te spreken als gy zelve doet, en hier door als op eene ongevoelige wyze zyne kwaade gewoonte afleeren.

§ 1677.

Het zelfde Hulpmiddel is dikmaalen beproefd in dat soort van Lispen, welkers oorzaak men niet ontdekken konde; en wel met eenen uitflag, die alle verwagting te boven ging. Men moet derhalven nimmer nalaaten, om van hetzelfde gebruik te maaken.

*Hesitantia**Het Stamelen.*

§ 1678.

Het Stamelen bestaat in eene dikmaal herhaalde uitspraak van hetzelfde Woord, deel, 't zy in het begin, 't zy in het midden van een Woord; en dus, om my te bedienen van een voorbeeld, in te zeggen, *Myn-Myn-Myn-Mynheer*, voor *Mynheer*; *Me-Me-Me-Mejuffer*, voor *Mejuffer*, en wat dergelyke meer zyn.

§ 1679.

'Er zyn ook Stamelaars, die verplicht zyn een zelfde woord tien of twaalf maal te herhaalen, voor en alêr ze overgaan tot de uitspraak van een ander, en vervolgens de overige Woorden van eene Reeden, zeer wel uitspreken. Deeze by voorbeeld, willende zeggen, *Ik zal morgen naar buiten gaan*, zeggen in afgebrooken Klanken, *Ik- Ik- Ik- zal- zal- zal- zal- Morgen naar buiten gaan*, en doen zulks nog niet, zonder zekere belaglyke trekken van het Aangezigt.

§ 1680.

Deeze zeer wanvormige Uitspraaken, niet afhangende van een natuurlyk en onver-

onverwinbaar gebrek der Tong, gelyk fomwylen het geval is, kan men verbeteren, door ieder Woorddeel zoo langzaam uit te spreken, als of men de slagen telde van eene Klok, die elkander langzaam opvolgden. Door het dikmaalig herhaalen waarlyk van deeze poogingen, geraakt men fomwylen zoo verre deeze Wangestalte te boven, datze niet dan in 't geval van verhaaste gesprekken zig doet kennen.

De Hardhoorenheid.

§ 1681.

HARDHOORENHEID betekend eene moeilyke gewaarwording van 't geluid; dat is, van de golvende beweeging der Lugt, door den indruk van zekere Lighaamen veröorzaakt.

*Gravitas
auditus.*

§ 1682.

Eene gedeeltelyke verftopping der uit of inwendige Gehoorbuis, door eenigerleije natuurlyke of vreemde Zelfftandigheid; eene Verslapping van het Trommel-vlies; een gebreklyk maakzel, of de ontbeering van het uiterlyk Oor; de te groote engheid van den uitwendigen Gehoorweg; en mischien ook verscheiden onbekende veränderingen in het werktuiglyke van het binnen Oor, moet men als oorzaaken van dit gebrek aanmerken.

§ 1683.

Het eerste foort van Hardhoorenheid wordt dikmaalen geneezen, door het wegneemen der vreemde Zelfftandigheden in één der Gehoorwegen bevat, 't zy door het een of ander daar toe geschikt Werktuig, 't zy door het inspuiten van eenig zagt afveegend Vogt; naa dat de verftoppende oorzaak een vast Lighaam is, of eene verdikte Vloeistof.

§ 1684.

Het tweede foort is inzonderheid daar uit kenbaar, dat de Hardhoorenheid zig regeld naar de verschillende gesteltheden van den Dampkring, en by droog en helder Weder, minder is dan by somber en vogtig. Deszelfs geneezing vordert het gebruik van verwarmende en versterkende Vogten, aangebragt door plukzel of boomwol.

§ 1685.

§ 1685.

Het derde soort wordt verholpen door het gebruik van een konstige Gehoorbuis; van eene dergelyke zoogenoemde Gehoortrompet; Gehoortrommel; en dergelyken.

§ 1686.

De twee laatste foorten eischen het gebruik van dezelfde werktuigen, en erkennen voor het overige, geenerleije Hulpmiddelen.

De Doofheid.

§ 1687.

Sorditas.

DOOFHEID, strikt genomen, steld een volstrekt gemis van het Gehoor. In een ruimer zin egter, wordt daar door verstaan, den hoogsten graad van Hardhoorenheid, in de vorige Onderdeeling beschreeven.

§ 1688.

Eene volstreckte Doofheid is ongeneeslyk, om dat dezelve altoos beruist op oorzaken, welke noch verbeterd, noch geneezen kunnen worden. Als dezelve is aangeboren, is ze altoos verzeld van Stomheid.

§ 1689.

De onëigen dus genaamde Doofheid, moet op dezelfde wyze behandeld worden als de Hardhoorenheid, en wel, in overéénkomst met haare meest blykbaare oorzaken.

§ 1690.

Eene opening in het Trommel-vlies, van DUVERNEY gesteld als eene oorzaak van Doofheid, is zulks niet altoos. Mynen zeer bekwaamen Konstgenoot den Heere MARTENS, bezit hieromtrent eene Waarneeming, die alles afdoet, en der gemeenmaaking dubbel waardig is.

X. H O O F T D E E L.

*De Wanſtaltigheden der Sexe.**Deformi-
tates ſexus.*

§ 1691.

Door deeze wordt verſtaan, alle verandering in de foortönderſcheidende deelen van Man en Vrouw, van welk eenen aart dezelve ook zyn mooge, mits datze, meer of min, het onderkennen van de een en ander twyffelagtig maaken.

§ 1692.

De Vrouwlyke Stem by Mannen; de Manlyke Stem by Vrouwen; de Baard by de laaften; het ontbeeren der Baard by de eerſten; en de tweeſlagtige Teeldeelen; zyn de voornaamſten deezer Wangefaltten.

*De Vrouwlyke Stem by Mannen.**Femina
vox apud
Viros.*

§ 1693.

Deeze, die ten uiterſten miſhaaglyk is, ſchynd inzonderheid af te hangen van eene te enge Strotspleet, en kan by Kinderen ſomwylen, by Bejaarden nimmer verbeterd worden.

§ 1694.

De beſte Hulpmiddelen beſtaan daarin, dat men dikmaalen beproeve de Bas te zingen; dat men vooräl 's Morgens onmiddelyk na men is opgeſtaan, by herhaaling, en zoo hard als mooglyk is, de Klinkletters A en O uitspreeke; dat men eenige reizen Daags, met de meefſt mooglyke Stemsverheffing, Schreuwte, of Zinge, in een Vat 't welk van boven open is; gelyk ook, dat men eene middenmaatige Vuurtang met een draad hange aan een der Vingeren van de regter of linker Hand; met het einde deezer Vinger, de een of ander Gehoorweg toefſtoppe; de twee beenen der Tang doe ſlingeren tegen eene Kift, Lataafel, of dergelyke; en zyne Stem voege by het geluid 't welk de Tang het Oor indrukt. Het laaſte hulpmiddel is geen der minſte, maar eiſcht, zoo wel als de overige, indien het van eenige uitwerking zyn zal, eenen weinig gevorderden Ouderdom, en een langduurig gebruik.

*Virilis
vox apud
Feminas.*

De Manlyke Stem by Vrouwen.

§ 1695.

Zoo mishaaglyk het vorige gebrek is, zoo mishaaglyk, en mishaaglyker nog, is het tegenwoordige. Vrouwen waarlyk, hier aan onderhevig, hoe schoon ze anders ook zyn moogen, verliezen een groot gedeelte haarer bevalligheid, en worden niet zelden, vooräl wanneer ze eenig verstand hebben, en men haar niet van naby kend, beschouwd als Xantippes.

§ 1696.

Eene te groote wydte van de Strotspleet is de onmiddelyke oorzaak deezer Wangestalte, die fomwylen geholpen wordt, door de Hals staande den Nagt te omslaan met doeken in eenig saamentrekkend Vogt nat gemaakt; door geen gebruik te maaken van warme Dranken, wel van koude; door van tyd tot tyd op eene langzaame wyze door te slikken, een gedeelte van eenig zagt saamentrekkend en versterkend Hulpmiddel; als mede, door niemand te hooren Zingen die eene zeer zwaare Stem heeft, en zelve zig in agt te neemen voor hard Spreken, Schreeuwen, Zingen en dergelyken.

*Barba
apud Fe-
minas-*

De Baard by Vrouwen.

§ 1697.

Deeze is meest betreklyk tot de Bovenlip, de Kin, of tot beiden te gelyk; zelden tot de Wangen. Ze is een der grootste Wangestalten van de Sexe, en die het Oog der Mannen op eene zeer treffende wyze aandoet.

§ 1698.

Men kan dezelve wel eenigzints verheelen door het veelvuldig gebruik van het Scheermes, of de Schaar; maar niet wegneemen dan door het uittrekken der Hairen met een Tangetje, en het vernielen van derzelver Wortels, door het aanbrengen van den *Geeft des Zeezoits*, of eenig ander dergelyk Hulpmiddel.

*Defectus
barbae a-
pud Viros.*

De ontbeering der Baard by Mannen.

§ 1699.

Het gemis der Baard by Mannen, is niet minder afzienlyk dan den Baard by Vrouwen, en geeft altoos vermoeden van Verwyfdheid.

§ 1699.

§ 1699.

Eene aangebooren gesteldheid, of toevallige beleediging van de Huid des Aangezichts, zyn de gewoone oorzaaken deezer Wangestalte.

§ 1700.

Alle aangebooren Baardloosheid is ongeneeslyk, om dat dezelve beruſt op eene ontbeering der Hairbollen. Men kan hetzelfde zeggen van de toevallige, in weêrwil van alles wat de Kwakzalverei, ten voordeele van zekere zoogenaamde foortelyke Middelen, ter bevordering van den groei der Hairen, met zoo veel grootſpreeking heeft aangepreezen.

De Tweeflagtige Teeldeelen.

§ 1701.

Door TWEEFLAGTIGE TEELDEELEN, verſtaat men eene vermenging der Manlyke en Vrouwlyke, in een zelfde Voorwerp.

*Partes
genitales;
utriusque
sexus ſi-
mul.*

§ 1702.

Deeze Wangestalte is meer ſchynbaar dan weezenlyk; en beſtaat doorgaans by Vrouwen in eene verlengde Kittelaar; by Mannen, in een gedeeltelyk gemis van deeze of geene der uiterlyke Teelleeden.

§ 1703.

De eerſte Wangestalte kan verholpen worden door het Snymes; de laaſte, door het gebruik van Werktuigen, welke niet wel kunnen bepaald worden, om datze met den byzonderen aart der ontbeering moeten overëenkoomen.

XI. H O O F T D E E L.

Aanmerkingen over de Lighaamlyke Opvoeding der Kinderen, ter verhoeding van verscheidenerlye Wangestalten.

§ 1705.

Zeer veele Wangestalten zyn van dien aart, datze meer afhangen van eene misflag in de lighaamlyke opvoeding der Kinderen, dan wel van oorzaaken, in derzelver Gestel gegrond, of van elders aangebragt.

§ 1706.

De verhoeding van deezē, die wel is waar, meer in de magt staat der Ouders, Voedsters, en Schoolleeraars, dan van den Heelmeeſter; moet egter door deezē geregeld worden, vermits maar zeer weinig Menſchen in ſtaat zyn, om over dit gewigtig gedeelte der Opvoeding, betaamlyk te oordeelen.

§ 1707.

Eenige weinige aanmerkingen derhalven, betreklyk tot het verhoeden der meest weezenlyke Wangestalten, door het in agt neemen van oplettenheden in het beſtier der Kinderen, welke onder het bereik zyn van een iegelyk, hebbe ik gedagt dat niet geheel onbestaanbaar waren met myn Ontwerp, nog, als nutlooze byvoegzelen tot het Leerſtuk der Wangestalten, zouden kunnen beſchouwd worden.

1708.

Het *Bakren*, het *Draagen*, de *Ligging*, het *Staan*, het *Gaan*, het *Zitten*, en de *Kleeding der Kinderen*; gelyk ook de *houding van het Hoofd*, der *Armen*, van den *Rug*, van den *Buik*, der *Billen*, en der *Voeten*, zullen de voornaame onderwerpen zyn, tot dewelke ik myne Aanmerkingen bepaalen zal.

Het Bakren der Kinderen.

§ 1709.

De meest gewoone wyze van Bakren is nadeelig in verscheidenerleije opzigten. Zy is naamlyk, te warm, te sluitend, en te kort.

§ 1709.

§ 1710.

Kinderen moeten gebakerd worden, zoo veel de natuur van het Luchtgestel, en der Jaargetyden zulks toelaat, in overéénkomst met de handelwyze dier Volkeren welke wy onbeschaafd noemen; dat is te zeggen, of geheel niet, of zoo, dat alle deelen van hun Lighaam zig vrijelyk beweegen kunnen; geene derzelver geprangt worden; en vooräl de Borst en Buik zig onbelemmerd kunnen uitzetten. De Dekens en Luijers daarénboven, moeten ligt zyn, en in eene kleine hoeveelheid; zoo om het Lighaam niet te zeer te broeijen, als om hetzelfde niet lastig te vallen door haare zwaarte. De Bakering eindelyk moet lang zyn, dat is, zig tot verre beneden de Voeten uitstrekken; en niet vaster, dan maar even genoeg is, om het Kind te kunnen behandelen.

§ 1711.

Men kan zig nauwlyks verbeelden, zonder de droevige gevolgen van het tegendeel gezien te hebben; hoe veel deeze wyze van Bakeren toebrengt, tot de gezondheid van het Kind, en de goede gestalte van deszelfs Lighaam, die altoos het best gevormd en volmaakt wordt, wanneer men dezelve meer vertrouwd aan de Natuur, dan aan de gewaande Kunst en bedreevenheid van Vrouwen, die geene andere Regel volgen, dan die der gewoonte.

Het Draagen der Kinderen.

§ 1712.

Het draagen der Kinderen op den Arm der Moeder, of van eene Min, hoe noodzaaklyk en nuttig zulks ook zyn mooge, heeft veelmaalen den grond gelegd tot eene scheefheid van den Hals, of des Ruggraads, alleen doordien zulks geschied op een en denzelfden Arm, en het Kind hier door verpligt wordt, altoos naar dezelfde zyde over te hellen.

§ 1713.

Hoe beuzelächtig derhalven deezen raad ook schynen mooge, men moet de Kinderen doen draagen, dan eens op den regter, dan eens op den linker Arm, en tevens wel bedagt zyn, om de tedere Ribben van deezen, niet op de eene of andere wyze te drukken.

De ligging der Kinderen.

§ 1714.

Het liggen der Kinderen op Bedden, door de weelde uitgedagt, is zoo verderfelyk voor hunne Gezondheid, als fchadelyk voor hunnen Leëft, indienze anders welgemaakt gebooren zyn.

§ 1715.

Dusdaanige Bedden naamlyk, hoe vlak ook gefpreid, kunnen door hunne zagtheid, de zwaarte van het Kind niet opweegen; zakken door zoo dra men hetzelfde daarin legt; doen het Lighaam eenigzints krommen; en verzwakken het gantsche geftel, door hunne broeijing. Wanner dezelve, gelyk altoos het geval is, voorzien zyn met Hoofdkuszens van gelyke zagtheid, en tot eene zekere hoogte op een gelegd, zyn hunne fchaadelyke uitwerkzelen nog zeekerder, om dat de broeijing zoo wel, als de kromming van het Lighaam des Kinds, aldan nog vergroot worden.

§ 1716.

Kinderen derhalven, moeten liggen op vaste Bedden, of op Matrassen, met het Hoofd rustende op niet meer dan een eenig vast en vlak Kusen, op dat het gantsche Lighaam, zoo na mooglyk, eene horizontale plaatzing hebbe. Het dek moet ligt zyn, en of geheel niet, of immers zeer weinig wegen op het Lighaam van het Kind.

Het staan der Kinderen.

§ 1717.

De natuurlyke stand van het Lighaam, is die, waarin alle overeenkomstige deelen van hetzelfde, met gelyke afftanden, in evenwigt zyn rondom de lyn van zwaarte, die van het toppunt des Hoofds loodregt vald op het midden van het vlak der Voetzoolen.

§ 1718.

De top des Hoofds in deezen stand, vald in een vlak, evenwydig aan den Gezigteinder; de Hals en het Lighaam, staan byna loodlynig op de onderfte Ledemaaten; de Dyên, Kniën, en Beenen, evenwydig geplaatst naaft elkander, rusten
even

even dus op de Voeten; de Armen, ter weêrzyden langs het Lighaam nederhangende, zyn dus gekeerd, dat de Handpalm naar binnen, de Duim naar vooren, en de Pink naar agteren ziet; de Voeten eindelyk, op den grond rustende, staan eenigzints gekeerd naar buiten, zoo, dat de Hielen naar elkander zien, en de Teenen van een wyken

§ 1719.

Alle aanhoudende, of dikmaal hervatte plaatzing van het Lighaam der Kinderen, voor een meerder of minder gedeelte van deezen stand afwykende; zyn schaadelyk, en geeven gelegenheid tot veele en verschillende Wangestalten.

§ 1720.

Men verhoed dezelve, door de Kinderen te gewennen aan een dergelyken stand, door niet te gedoogen datze staande leunen tegen eenig ander Lighaam; en doorze vroegtydig in zekere maate te doen onderwyzen, in de Konst van Dansen of van Exerceeren.

Het Zitten der Kinderen.

§ 1721.

In weinig dingen, de Lighaamlyke Opvoeding betreffende, worden zoo veele mislagen begaan, dan in het zitten der Kinderen; 't zy men hetzelfde beschouwd in het afgetrokkene; 't zy in verband met het verrigten van zekere bezigheden.

§ 1722.

Zeer jonge Kinderen van geringe lieden, zitten doorgaans, en somwylen geheele Dagen, in houten Kinderstoelen met eene open Zitting, van vooren geflooter, en bekrompen genoeg gemaakt, om hun te beletten, de Beenen anders dan nederhangend te plaatzen. Die van vermoogende, zitten veelal op andere, en meer kostbaare Stoelen, van vooren voorzien met eene Stoof, hangende meer of min beneden de Zitting, op datze daar op hunne nederhangende Voeten zouden kunnen doen rusten.

§ 1723.

Beide deeze wyzen van zitten zyn schaadelyk; de eerste egter is zulks meerder dan de laaste. Kinderen naamlyk, die zwaar en te gelyk zwak zyn, of eene voorbe-

beschikkende gesteltheid hebben tot Engelsche ziekte, krygen hier door alleenlyk, kromme Dye en Scheenbeenderen, en niet zelden ook de beginzelen eener scheefwording van den Ruggraad.

§ 1724.

Kinderen van meerder Ouderdom, en van behoeftige Ouders, zitten veeltids op oude Stoelen met eene flegte matte zitting; van vermoogende, op zulke die met een zagt Kussen gedekt zyn, of waarvan het Kussen rust op zeelen.

§ 1725.

In elk deezer gevallen, in het eerste egter het meest, maaken de Billen eene holte in de Zitting, worden de Dyën meer of min scherphoekig geboogen op het Bekken; en buigt de Ruggraad naar evenredigheid voorwaards. Byzonderheden waarlyk, welke niet lang kunnen plaats hebben, zonder datze gevolgd worden vanaanmerklyke Wangestalten.

§ 1726.

Het onöplettend zitten der Kinderen van allerlei Ouderdom, van allerlei Rang, zoo op zig zelfs, als in het verrigten van zekere bezigheden, van het Leezen by voorbeeld, het Schryven, het Naijen, het Braijen, en dergelyken, geeft zoo dikmaalen aanleiding tot het scheef worden van den Ruggraad, dat het byna overtollig schynd, hier omtrent iets aantemerkten.

§ 1727.

Van meerder belang is het, dat men de Hulpmiddelen aanwyze ter weering deezer mislagen; en ter verhoeding der Wangestalten hier van afhanglyk. Ze zyn kortelyk deeze.

§ 1728.

Men doet de Kinderen nooit anders zitten dan op Stoelen, welkers Zitting onindrukbaar is; nimmer Schryven, dan aan Taafels, in hoogte overéenkoomende met het benedenste van hunne Borst; nooit eenig Handwerk verrigten; zonder nauwkeurige toezigt op de regte houding van hun Lighaam; en nimmer gebruik maaken in den eerstentyd van hun Leven, dan van Kinderstoelen, welkers Stooven met de Zitting van boven na genoeg gelyk zyn, of althans zoo veel voorwaards uitsteeken, dat de Beenen, om de Voeten daarop te zetten, slegts stomp-hoekig behoeven geboogen te zyn. Konde men ook eene Ontlaststoel uitdenken,

be-

bevreed van voorgemelde onvolkomenheden, en verkrijgbaar, voor minvermoo-
gende zoo wel als voor Ryken, zulks zoude eenen zeer weezenlyken dienst gedaan
zyn aan de Maatschappye.

Het gaan der Kinderen.

§ 1729.

Een zeer ongelukkig gebruik voor den leeft der Kinderen, wil, dat men den-
zelven, om my van de gewoone spreekwyze te bedienen, het Gaan leere, op den
ouderdom van 9 Maanden, een Jaar, of weinig meerder.

§ 1730.

Men bediend zig hier toe van zoogenaamde Leibanden, op verschillende wyze
gemaakt en vastgehegt, waar aan de Kinderen al hangende, meestal door de Bee-
nen hunner geleidsters worden voortgestuwd.

§ 1731.

Kinderen behoeft het gaan niet geleerd te worden: de Natuur zelve onderwyft
hen zulks, zoo dra de kragten van het Lighaam hier toe genoegzaam zyn. Voor
deezen tyd, en voor zy zelve daar van blyken geeven, is het zoo min geoor-
loofd hun tot gaan te noodzaaken, dat men zelfs grootelyks misdoet met hen op
de Beenen te zetten, daar de geringe vastheid van hun Beengestel, de zwaarte van
het Lighaam niet genoeg kan opweegen, om hetzelve te draagen zonder doorbui-
ging. Veele kromme Dye- Scheen- en Kuitbeenderen waarlyk zouden verhoed
zyn, wanneer men minder de Natuur vooruut geloopt, en de Kinderen niet
tot gaan verplicht hadt, voorënaleer zy zelve om zoo te spreekken, door de vaar-
dige en kragtige beweeging hunner Ledemaaten, en het aanhoudend poogen tot
gaan, zulks als scheenen te vorderen.

De Kleeding der Kinderen.

§ 1732.

Aanmerklyke mislagen worden 'er begaan in de kleeding der Kinderen, zoo in
de vroege Jeugd, als in eenen meer gevorderden Ouderdom.

§ 1733.

Een der grootſten egter, is het gebruik van lange ſtyve en enge Keurslyven, door dewelke de Schouders opwaards geperſt, de verbreeding der Borſt verhindert, de ingewanden van den Buik op eene nadeelige wyze gedrukt, en het uitgroeijen der Borſten by Mysjes, meeftäl dermaaten belemmerd wordt, dat dezelve in ryper Jaaren, Moeder geworden zynde, nauwlyks, of geheel niet, in ſtaat zyn haare Kinderen te kunnen zoogen.

§ 1734.

De zwaare, veele, en zoo zeer geplooid Rokken ook, in verſcheiden gedeeltens van ons Land, by de Vrouwen in gebruik, zyn niet minder ſchadelyk voor de volmaking van het Bekken, en geeven maar al te veel gelegenheid tot moeilijke Verloſſingen.

§ 1735.

Hoe veele ſcheeve Lighaamen daarënboven, door het gebruik van voorgemelde en andere kwaalyk gemaakte Keurslyven veröorzaakt zyn, kunnen dezulken beſt getuigen, wier beroep zig inzonderheid bepaald tot het maaken van Werktuigen, ter verhelping deezer Wangefaltten.

§ 1736.

Schoon het derhalven beſt ware, dat men de Keurslyven de kleeding der Kinderen uitſloot, althans tot zoo lange, dat hun Lighaam merendeels volgroeid was; is derzelver gebruik al te veel doorden Tyden het vooröordeel gewettigd, om zulks immer te verwagten, of daar op aan te dringen. Men kan hetzelfde zeggen, omtrent de voorgemelde Rokken van veele onzer vrouwlyke Landgenooten; en miſchien zelfs is het waar, dat het uitroeijen van deezen, eene volſtrekte onmooglykheid inſluit.

§ 1737.

Dit niettegenſtaande, is het de pligt van elk Geneesheer en Heelmeeſter, om alle zyne poogingen daar toe aan te wenden, dat men ten minſten de Kinderen geene andere Keurslyven geeve, dan die flap, toegeefbaar, ruim, eer te kort dan te lang zyn, en welke op de eene plaats geene meerder weêrſtand bieden, dan op de andere; dat men de gewoone Schouderſtukken derzelver breed neeme, en haar ſlegts los aanſluite op den Schoudertop: dat alle overige deelen der kleeding ligt zyn, en
gee-

geenig punt van de oppervlakte des Lighaams, hier door op eene ongemaklyke wyze gedrukt wordt: dat eindelyk, de Heupen niet te zeer bezwaard worden door den last der Rokken; de Beenen niet gekneld door Kousfebanden; nog de Voeten geprangd door Schoenen welke of al te eng, of te kort zyn.

De houding van het Hoofd.

§ 1738.

Het Hoofd moet dus geplaatst zyn op den Hals, dat het nog ter regter, nog ter 's linker zyde, nog naar vooren, nog naar agteren overhelle.

§ 1739.

Alle andere standen van hetzelfde, by aanhoudenheid, of herhaaling voortgezet, geeven gelegenheid tot eene wanvormige gedaante van den Ruggraad, en tot dat foort van Scheefhoofdigheid, welk wy § 1560. gezegt hebben, dat afhanglyk was van de inkorting van een der *Borst - Sleutelbeensche Speenspieren*.

§ 1740.

Veelerleije Hulpmiddelen zyn 'er van tyd tot tyd voorgeschreeven, ter verhoeding deezer Wangestalten uit voorgemelde oorzaak. De beste zyn, dat men zorgvuldig agt geeve op de houding van het Hoofd der Kinderen; niet gedooge datze hetzelfde immer hangen laate; en haar gewenne het regt te houden, door haar dagelyks, by wyze van Spel waaraan eenige belooning gehegt wordt, eenig glad, ligt, of rond Lighaam, dusdaanig te doen draagen op het Hoofd, dat het daar niet afvalle.

§ 1741.

Is dit eenvoudig hulpmiddel niet genoegzaam, of kan men de Kinderen niet genoeg daar aan onderwerpen, 't zy om datze meestäl buiten ons oog zyn, 't zy om eenige andere redenen, als dan moet men gebruik maaken van den Kinband van PRIOU, welke ik ter zyner plaatze zal beschryven en afbeelden.

De houding der Armen.

§ 1742.

De goede houding der Armen, die tevens de vryheid van derzelve beweegin-

gen influit, hangd inzonderheid af van de behoorlyke lengte der Sleutelbeenderen, en deeze wederom van derzelve kromten.

§ 1743.

Men voorziet in het een en ander, door zorg te draagen dat in het Bakeren en Kleeden der Kinderen, de Schouders niet geprangd worden; en door het Kind, zoo dra het voor Spel vatbaar is, by herhaaling eene ligte stok, in lengte gelyk aan deszelfs Lighaam, geduurende eenen zekeren tyd, met dwerssch uitgestrekte Armen, aan zyne beide einden te doen draagen.

De houding van den Rug.

§ 1744.

De Ruggraad, die by Jonggebooren Kinderen byna regt is, verkrijgt allengskens de gedaante eener Romynsche S, over welkers kromte men best kan oordeelen, door het beschouwen des geraamte van een welgemaakt volwasfen Mensch, door de zaag loodlynig verdeeld in twee gelyke helften.

§ 1745.

Deeze kromte wordt fomwylen tegennatuurlyk vergroot, in het een of ander gedeelte derzelve, alleen door eene kwaade houding van het Lighaam der Kinderen, op deeze of gene wyze.

§ 1746.

Men voorkomt dezelve, door de volmaaking van de gedaante des Lighaams, zoo veel mooglyk zy te vertrouwen aan de werking der Natuur; en alleen dat gene in agt te neemen, welk wy §. 1720 en 1728. omtrent het staan en zitten der Kinderen gezegt hebben.

De houding van den Buik.

§ 1747.

De Buik der Kinderen, steekt fomwylen meer voorwaards uit dan ze doen moet; niet zoo zeer uit hoofde van eenige Zieklyke gesteltheid, als doordien men oogluikend, of willekeurig, hun eenigerleije last, met min of meer aanhoudenheid, voor denzelven doet draagen.

§ 1748.

§ 1748.

Men voorkomt deezen misftand, door de Jonge Lieden niets, dat eenige merklyke zwaarte heeft, op die wyze te doen draagen; en door hun niet toe te laten, datze zig vermaaken met Spellen, welke hen verpligt tot fterke agteröverbuigingen van het Lighaam.

De houding der Billen.

§ 1749.

De Billen dienen zoo wel om evenwigt te maaken met den Buik, als ter plaatzing van zekere aanzienlyke Spieren, welke de Dyën beweegen op het Bekken. Dit onder anderen is de reeden, dat die der Vrouwen dikker zyn dan der Mannen, en dat Menfchen die fchraale Billen en een dikke Buik hebben, verpligt zyn zig agteröver te werpen, ter vinding van het zoo noodzaaklyk Evenwigt.

§ 1750.

De natuur zelve zorgd doorgaans zoo wel voor de onderlinge evenreedigheid van den Buik en der Billen, dat men byna nimmer noodig heeft, uit hoofde van een natuulyk gebrek, eenige Wangefalte ten dien opzichte te verbeteren.

§ 1751.

Kwaade gewoontens flegts in het gaan, doen de laaften dikmaalen te veel agterwaards uitfteeken, en veröorzaaken dus eenen misftand, die, alsze eens gevestigd is niet kan verholpen worden, maar die gemaklyk verhoed wordt, door eene behoorlyke toezigt op de algemeene houding van het Lighaam der Kinderen, vooräl in een ftanden ftand; en door hunnen Rug niet te bezwaaren, met het opleggen van laften, welke niet kunnen gedraagen worden, zonder vooröverkromming.

De houding der Voeten.

§ 1752.

Hoedaanig de natuurlyke houding is der Voeten, hebbenwe § 1718, aangewezen. Deeze houding veränderd dikmaalen op verfcheidenerleije wyzen, meer waarlyk door onagtzaamheid in het beftier der Kinderen, dan wel uit hoofde van eenigerleije aangebooren, of toevallig verkreegen Wangefalte deezer Deelen.

§ 1753.

§ 1753.

Men voorkomt deeze veranderingen ligtelyk, door, van de geboorte af zorge te draagen, dat de Voeten der Kinderen op geenerlye wyze geprangd worden; dat is te zeggen, noch door eene gebrekkige Bakering, noch door kwalyk gemaakte Schoenen. Eene tydige onderwerping derzelve, aan de onderrigting van een Dansmeester, verstandig genoeg om zyne Leerlingen minder bekwaam te maaken voor het Tooneel, dan voor eene beschaafde Saamenleving, is ten deezen opzigte, zoo noodzaaklyk, als omtrent alle overige deelen van dat gedeelte der Lighaamlyke Opvoeding, welk inzonderheid betrekking heeft tot ons tegenwoordig Onderwerp, de bouwkundige schoonheid naamlyk van het Lighaam.



B E S C H R Y V I N G

D E R

NIET ALGEMEEN BEKENDE,

I N D I T

D E E L

A A N G E P R E E Z E N

HULPMIDDELEN.

RESCUE

THE

IN

THE

THE

HULL

B E S C H R Y V I N G

D E R

NIET ALGEMEEN BEKENDE,

I N D I T

D E E L

A A N G E P R E E Z E N

H U L P M I D D E L E N .

Bruine Onderaardsche Steen.

Lapis Infernalis fuscus.

Neemt *Zilver*, in de *Kapel* gezuiverd,
zoo veel gy wild.

Rx. *Argenti probe Cupellati*, q. v.

Salpeter Geest, die zeer sterk is, in
eene driedubbele hoeveelheid.

Spirit. nitri concentratissimi, tri-
plum.

Doet het een en ander in een Phiöol, en steld het in een Zandbad. Damp
de ontbinding uit tot een derde. Onttrekt dezelve vervolgens alle vogt, door ze
E e e in

in eene wyde Smeltkroes, op een klein Vuur te doen kooken, tot het als Was vloeid; en giet ze als dan schielyk in eenen Yzeren Vorm, hier toe byzonder geschikt, en wiens pypjes, te vooren gewarmd, en van binnen met Olie besmeerd zyn. Koud geworden, droogt men de uitgenoomen Pennetjes, en bewaard dezelve voor het gebruik in een welgeslooten Glas.

Groene Onderaardsche Steen.

I

Lapis infernalis viridis.

Deeze wordt gemaakt op dezelfde wyze als de voorige; maar van Zilver, niet zoo zeer gezuiverd van het daar mede verbonden Koper.

AANMERKING. De eerste bereiding, schoon gemeenlyk scherper gegagt dan de laatste, is, als ze met eene lugtige Hand, en al stippend wordt aangebragt, een groot Velmaakend Hulpmiddel, in alle gevallen waar de grond der Zweer enigzints slap, en het verlies van Huid zoo groot is, dat dit Weefzel zig niet genoeg kan uitbreiden, naar het Middenpunt der Verzweering, om het geheel beslag te maaken van het Lidteken. Zy schynd derhalven, meer te werken by wyze van saamentrekking en opdrooging, dan van verteering.

De tweede, hoewel op gelyke wyze gebruikt, verteerd altoos het gene zy aanraakt, en maakt daarënboven, eenen indruk, die my meestäl heeft toegescheenen, gelyk te zyn aan die van het *blauw Koperrood*. Met deeze hebbe ik nimmer kunnen slagen ter bevordering der Velmaaking; en het is hierom inzonderheid, dat ik overäl waar zulks te passe kwam, tot dit einde de vorige hebbe aangepreezen.

Bytende Kamfer Olie.

Oleum causticum camphoræ.

Neemt. Gewreeven Kamfer, drie Oncen.

℞. *Camphor. tritæ.* Unc. iij.

Salpeter Geest, zes Oncen.

Spiritus nitri. Unc. vi.

Stelt het bloot, in een welgeslooten Glas, aan eene zachte warmte, en giet, na de volkoomen oplossing des Kamfers, de bovendryvende Olie af van het overige.

AANMERKING. Dit Middel, welks vermoogen, door zynen Naam zelve kenbaar wordt, is van een nuttig gebruik ter wegneeming van vleeschagtige en

en andere Uitwassen; mits dat men hetzelfde voorzigtiglyk; en by herhaaling, door middel van een Pinceel aanbrengt.

Edenburger Wondbalzem.

Balsamus traumaticus Edinburgensis.

Neemt. Fyn gewreeven Benzoin, ander-
halve Once.

R. Bensoini triti Unc. i ss.

Peruviaansche Balzem, een Once.

Balsam. Peruv Unc i.

Fyn gewreeven Lever Aloë, twee
Dragmen.

Aloës hepatici trit. Dragm. ij.

Overgehaalde Brandewyn, een
Pond.

Spir vini rectific. Libr. i.

Laat het in een Zandbad, drie Dagen trekken, en alsdan doorgekleinst worden.

AANMERKING. Van weinig Middelen, welke ik immer ter zuivering van zekere Wonden en Verzweeringen, gelyk ook, ter bevordering der Vleeschgroeiing, beproefd hebbe; ben ik zoo voldaan geweest als van dit; dan eens aangebragt door middel van Plukzel, hier mede doordrongen; dan eens by wyze van indrupping; naar dat de een of ander deezer Gebreken, of oppervlakkig waren, of eene meer of min aanmerklyke diepte hadden.

Eene noodzaaklyke oplettenheid egter, in het gebruik van dit middel is, dat men het zoo min mooglyk zy, legge op de randen des gebreks, om dat het deeze eenigzints droog maakt, en hier door de nadering der Huid, tot het middenpunt der Wonde of Verzweering belemmerd.

Engelsch Bytmiddel.

Causticum Anglicum.

Neemt. Gebrande Aluin.

R. Aluminis usti.

Roode neergeslagen Kwik.

Merc. præcip. rubr.

Van elks gelyke deelen,

ad. part. equal.

Brengt dezelve, in een steenen of glazen Mortier, tot een niet al te fyn poel-
jer, en bewaar dit tot het gebruik.

AANMERKING. Dit Mengzel verteerd zeer wel alleweelge Uitwassen,

en wordt gebruikt by wyze van opstrooijing. Nimmer egter moet men zig van hetzelfde bedienen in dergelyke gevallen, welkers natuur ons niet regt bekend is, of waarömtrent men eenig vermoeden heeft van kwaadäartigheid.

Engelsche Gompleister.

Neemt. *Vischlym*.

Aftrekzel van Benzoin.

Van elks gelyke Deelen.

Emplastrum gummatum Anglicum.

Rx. *Ichthyocollæ*.

Tinctur. benfoini.

ââ. part æqual.

Smelt het eerste in het laafte, op een klein Vuur, in een aarden Vat. Doopt in dit Mengzel eene feine Schuijer, en strykt het hier mede op dun Taf, zoo gelyk immer mooglyk zy, en warm genoeg om het voor een gedeelte in deszelfs weefzel te doen indringen.

AANMERKING. Dit is een der beste Hegtpleisters welke my bekend zyn, aangelegt na eene voorgaande bevogtiging met wat Speekzel, of Water. In het geval ook, waarin ik dezelve § 379. hebbe aangepreezen, kanze door geene andere vervangen worden zonder gevaar van mislukking. Sommige menschen egter kunnen dezelve niet wel verdraagen, en in dit geval, bediend men zig dikmaalen met vrugt van de eenvoudige *Palmpleister*, na voorgaande genoegzaame kooking, zoo lang gekneed en getrokken, tot ze zig als tot dunne draaden laat uitrekken.

Jenever Boter.

Neemt. *Versche Boter*, een Pond.

Jenever Beziën, die wel ryp,
en met de Vingeren verbrooken
zyn, een hand vol.

Butyrum Juniperi.

Rx. *Butyr recent*, Libr. I.

Baccar. Juniper, maturarum &
digitis fractarum, Manup. I.

Smelt de Boter op een klein Vuur, en kookt ze vervolgens, met de Beziën, tot de laaften wel week zyn. Kleinst het Mengzel door, en bewaard het voor het gebruik.

AANMERKING. Van dit Middel, dat weekmaakend en tevens prikkel-

len.

lend is, bediend men zig by wyze van smeering, na dat het altoorens een weinig warm gemaakt is, en men het Deel gewreeven heeft met een Wollen Lap, tot de Huid begind rood te worden. De beroemde ANDRY is de eerste, en misschien ook de eenige, die het zelve by voorkeur aanprijft in de gebrekkige voeding der Deelen; en inderdaad is het waar, dat het hierin meerder uitwerkt, dan men in den eersten opslag daar van schynd te kunnen verwagten.

Middel van PALMARIUS voor den dol-
len Hondsbet.

Neemt. *Wynruit.*

Yzerkruid.

Salie.

Wegebree.

Eiken Vaaren.

Gemeene Alsem.

Kruis en Munt.

Byvoet.

Citroen Kruid.

Betonie.

St. Jans Kruid.

Klein duizend Guldens Kruid.

Van elks gelyke Deelen.

Medicamentum PALMARI contra
morsum Canis rabidi.

R. *Rutæ.*

Verbenæ.

Salviæ.

Plantaginis.

Polypod. quercin.

Absynth. vulgar.

Menthæ.

Artemisiæ.

Melissæ.

Betonicæ.

Hyperici.

Centaurii minoris.

ââ part œqual.

Pluk dezelve, in den Tyd datze de meeste kragt hebben; dat is, omtrent de volle Maan in Juny. Laatze afzonderlyk droogen in papieren peperhuizen, op eene plaats, die niet bloot gesteld is aan den Regen, de Zon, nog eenige vogtigheid. Wanneer men 'er zig van bedienen wil, neemt men een gelyk gewigt van ieder, en brengtze tot een fyn poeijer, waar van alle Morgens, drie Uuren voor het Ontbyt, eene halve Dragme, met een gelyk gedeelte Suiker, of in Vleeschnat, Wyn, en dergelyke vermengd, wordt ingegeven. Het gebruik hier van, moet 10 of 12 Dagen, agtervolgt worden.

Middel van BEVERWYK voor den
zelfden Beet.

Neemt *Meesterwortel*.

Averuit.

Kleine Salie.

Betonie.

Groot Huislook.

Rode Byvoet.

Nipt of Kattenkruid.

Lavas.

Van elks gelyke deelen.

Medicam. BEVEROVICI contra
eundem morsum.

R. *Imperatoriae*.

Abrotani.

Salviae minoris.

Betonicae.

Sedi majoris.

Artemisiae rubrae.

Nepeti.

Levistici.

ââ part æquales.

De Kruiden in Water, en de Huislook in Wyn gekookt, worden afzonderlyk doorgekleinst, en vermengt.

Men geeft hier van, geduurende den tyd van Negen Dagen, drie maalen Daags, een Roemer vol, en laat ook de wonde hier mede wasschen.

Middel voor denzelfden Beet, door de
Staaten van Gelderland gemeen
gemaakt.

Neemt. *Meesterwortel*,

Byvoet.

Averuit.

Salie.

Wynruit.

Betonie.

Groot Huislook.

Volders Kaarden.

Lavas.

Van elks één of twee Dragmen.

Medicament. contra eundem morsum
ab Ordinibus Gelriae publicatum.

R. *Imperatoriae*.

Artemisiae.

Abrotani.

Salviae.

Rutæ.

Betonicae.

Sedi majoris.

Dioscori sativi.

Levistici.

ââ Dragm. i. vel ij.

Kookt dit met eene genoegzaame hoeveelheid Water, in een welgeslooten Vat, tot drie Ponden; en giet het, koud geworden zynde, door. — Men gebruikt hetzelfde in de hoeveelheid van $\frac{1}{2}$ pint, twee maalen Daags, geduurende den tyd van 9 Dagen, en wasscht by herhaaling de Wond met het overige.

Middel

Middel voor denzelfden Beet, medege-
deeld door de Staaten van Friesland.

Medicam. contra eundem morsum ab Or-
dinibus Frisicæ publicatum.

Neemt. *Wilde Kaarden.*

Waaivortel.

Hondsribbe.

Wynruit.

Duizendblad.

Huislook.

Averuit.

Wilde Kervel.

Drieblad.

Van elks zoo veel gy wild.

R. *Dipsaci sylvestris.*

Consolidæ.

Plantag. quinque nerviæ.

Rutæ.

Millesfolii.

Semp. vivivi.

Abrotani.

Myrrhi.

Trifolii.

aa. quant. vis.

Dit in een Mortier gestooten en uitgeperst zynde, doet men by één deel van het Sap, twee deelen Wynazyn; en by 6 Lood van dit Mengzel, één Lood Theriaak. — Men geeft hier van dagelyks, en wel, 'sMorgens voor het Ontbyt, 3 Lood, na dat men 's Avonds te vooren gevest heeft. — Voor Vrouwen wordt hetzelfde met minder Theriaak bedeed, en voor Kinderen, naar gelang van hunne Jaaren.

Middel voor denzelfden Beet, op orde
des Konings van Pruisschen gemeen-
gemaakt.

Medicam. contra eundem Morsum, jussu
Regis Borussiae publicatum.

Neemt *Meywormen*, in Honig gelegd,
met den aanklevenden Honig.

XXIV.

Theriaak, twee Oncen.

Ebbenhout, twee Dragmen.

Virginiaansche Slangenwortel,
een Dragme.

Vylzel van Lood, een Dragme.

Eischen Swam, twintig Greinen.

Honig.

Zoo veel noodig is, om 'er een
Conserf van te maaken.

R. *Scarabeorum*, in melle positorum,
cum adhærente melle.

N. XXIV.

Theriace, Unc. ij.

Ligni ex Ebeno, dragm. ij.

Rad. Serp. Virgin, Dragm. i.

Limatur. plumbi, Dragm. i.

Fung. fraxini, Gran. xx.

Mellis.

q. f. ut f. Conserva.

De

De gift is twee Dragmen ten hoogsten, en voor het minst twintig Greinen. — Vier en twintig Uuren voor men het inneemt, moet men zig onthouden van Eeten, en twaalf Uuren van Drinken. Als de Dorst intusschen zeer groot is, kan men het gebruik toestaan, van Thee, of van Water, waarin wat Vlierbloemen zyn afgekookt. — De Lyder moet zig, gedurende de behandeling, uit de Lugt houden, en de eerste 12 Uuren te Bedde blyven, ter bevordering van het Zweet. Na verloop van deezen Tyd moet hem een schoon Hembd worden aangedaan, en moeten ook de Bedlakens veranderd worden. — In den Winter behoord men de Kamer warm te houden, en alle togt, zoo veel mooglyk zy, af te weeren. De Wond wordt behandeld met Wyn, Brandewyn, Bieräzyn, Zout Water, de Konings Zalf, versche, dog gezoute Boter, of met de Scorpioen-Olie. Na de Geneezing moet men zig een geruimen tyd, van alles wat verhittend is, onthouden.

Middel van COBB, tegen de Water-
vrees.

Neemt *Natuurlyke Vermillioen.*

Gemaakte ———

Van elks xxiv Greinen.

Beste Muskus.

xvi Greinen.

Medicam. COBBII, contra Hydro-
phobiam.

R. *Cinnabar. nativi.*

——— factitii.

ââ Gran. xxiv.

Mofchi optimi.

Gr. xvi.

Dit, tot een fyn poeijer gebragt, moet men met Honig of Stroop van Venus-hair, tot een Brok maaken, en denzelven alle 3 Uuren doen inneemen.

AANMERKING. Hoe zeer men in den tegenwoordigen tyd, met reden is ingenoomen, tegen veelerhanden zoogenaamde soortlyke Geneesmiddelen, veelal oneindig boven haare weezenlyke waarde verheeven; hebbe ik egter niet kunnen nalaaten, om de meest beroemde Hulpmiddelen tegen den Dollen Hondsbet, hier in te laschen. Onkundig naamlyk, van den waaren aart des Vergifts, door dergelyk eene Beet aangebragt; onzecker van de veranderingen welke hetzelve onze Machine indrukt; gevoelig van den jammerlyken toestand der Lydende voor hun afsterven; en overtuigd van onsonvermoogen, om door eene regelmaatige, en op zekere beginzelen steunende Behandeling, dezelve te hulp te koomen; dagt ik vryheid te hebben niet alleen, maar zelfs verplicht te zyn, van myne gewoone denk- en handelwyze

af

af te wyken; en in dit geval, ook dat gene op te geeven, waar van ik geen de minste zekerheid hebbe voor my zelve.

Gaarne hadde ik de beschryving deezer Hulpmiddelen nog vermeerderd met die der Kookdrank van de Utrechtsche Bild, welke by ons zoo veel gerugt maakt; en inderdaad in sommige gevallen uitwerkzelen gehadt heeft, die niet alleen my, maar ook andere onzer beroemdste Genees- en Heelkundige, verwonderd hebben. Maar, eene diepe geheimhouding, altoos afgekeurd, dog somwylen verschoonbaar, maakt my zulks onmooglyk. Eenige reeden hebbe ik om te denken, datze niet, of althans zeer weinig verschild van die van BEVERWYK; dewyl de vergelykende Proeven, van my genoomen, eene zelfde kleur, reuk, smaak, en verandering met zekere zuure en Loogzoutige byvoegzelen, aanboden; en het geheele verschil daar op uitkwam, dat het een en ander Middel, in eene zelfde hoeveelheid, in een gelyk glas, en in een zelfden trap van warmte gesteld, dat der Bild 24 uren laater begon te bederven, dan dat van BEVERWYK.

Pynstillend, en Windbreekend Mengzel.

Neemt *Kruis en Muntwater*, vier Oncen.

Vloeibaar Heulsap van Sydenham
twintig Druppelen.

Mineraal pynstillend vogt van Hof-
man, een Dragma.

Dat het vermengt worde.

Mixtura anodina & Carminans.

℞. *Aquæ menthæ*, Unc. iv.

Laudan. liquidi Sydenhami.

Gtt. xx.

Liquor. Anodin. miner. Hofmanni.

Dragm. j.

Misceatur.

Men geeft hier van alle 5 of 6 Minuten een Lepel vol, en houd daar mede aan, tot zoo lange alle toevallen geweeken zyn.

AANMERKING Dit Middel, doet in het geval §. 1086 gemeld, wonderen. Ik hebbe 'er my nimmer van bediend, zonder voldoening. Het zelfde kan ik zeggen van sommige myner Kunstgenooten, verstandig genoeg, om de oorzaken der beklemden Breuken te onderscheiden van elkanderen. Het is oorspronglyk van een Friesch Geneesheer wiens naam ik my niet kan vertegenwoordigen, en moet, ingevolge myner ondervindingen, evenreedig aan het dringend gevaar, met meer *Heulsap* bedeed worden.

Poeijer voor de Engelsche Ziekte.

Neemt. *Izerroest*, een Once.

Kreeftsöogen, een half Once.

Gemaakt Vermillioen,
een Dragma.

Pulvis contra Rachitem.

R. *Ferrugo martis*, Unc. i.

Lapid cancrorum, Unc. β.

Cinnabar. factitii.

Dragm. j.

Brengtelk op zig zelve tot een fyn Poeijer, vermengt alles nauwkeurig met elkanderen, verdeelt het geheel in vyftig gelyke deelen, en laat dagelyks twee deezer Deelen gegeven worden.

AANMERKING. Dit Middel is een der beste welke ik immer in de Engelsche Ziekte beproefd hebbe. Ik ben hetzelve verschuldigt aan den beroemden CAMPER, en hebbe 'er uitwerkzelen van gezien, welke alle verwagting te boven gingen. Met het gebruik deszelve egter, moet men paaren eene geschikte Leefregel; en al dat gene inagt neemen, welk ik §. 1424. omtrent de behandeling deezer Ziekte gezegt hebbe.

Velmaakende Zalf van SCHLIGTING.

Neemt. *Goudglit*.

Loodwit.

Kalmynsteen.

Van elks gelyke Deelen.

Unguent. epuloticum SCHLIGTINGI.

R. *Litharg. auri*.

Cerussa.

Lap. Calamin.

aa part œqual.

Doet alles tot een zeer fyn Poeijer gewreeven, en vermengt met elkander, in een verglaasd aarden Vat. Giet 'er op versch geslagen Raapölie, en beste Wyn Azyn, van elks gelyke deelen, tot deeze de voorige bedekken ter hoogte van drie dwersche Vingeren. Roerd alles dikmaalen om met een houten Spatel; en laat het zoo lang in het Vat beslooten, tot het geheel nauwkeurlg vermengd is,
ne

en de dikte gekreegen heeft eener Zalve, van middenmatige stevigheid. —
Deeze, in eene Varkensblaas bewaard voor het uitdroogen, wordt op Linnen of
Plukzel gestreeken aangelegt; en kan naar eisch der omstandigheden, by het ge-
bruik vermengd worden met deeze of gene Hulpmiddelen.

AANMERKING. Van deeze Zalf moet ik zeggen, datze met oordeel ge-
bruikt, byna nimmer verleen laat; en ze den voorrang verdiend voor alle ande-
re. Ingevallen, waarin behalven het opdroogen, ook drukking te pas komt, kan
men een gedeelte derzelver, tot een Koekje gekneet, bloot op de Zweer leg-
gen, en dit met een Drukdoekje en welsluitend Verband op zyne plaats hou-
den, als wanneer het by uitstek beantwoord aan dit Oogmerk.

Wondwater van Theden.

Aqua vulneraria Thedeni.

Neemt. *Zuuringwater.*

R. *Aquæ acetosæ.*
Brandewyn.
Spiritus vini.

Van elks drie Ponden.


aa Libr. jii.

Geest van Koperrood, tien Oncen.
Spir. vitrioli Unc. x.
witte Suiker. een Pond.
Sacchar. albi. Libr. i.

Laat dit agt Dagen, in een warm Bad trekken, en alsdan doorgekleinst worden.
— Men bediend zig van hetzelfde, meest altoos by wyze van Omslagen, en
ter bevogting der Verbanden. Het moet in de meeste gevallen koud worden
aangebragt.

AANMERKING. Van dit Middel maakt de Heer THEDEN gebruik,
byna in alle gevallen, van eene uiterlyke oorzaak afhanglyk. — Des-
zelfs uitwerkzelen zegt hy, zyn verbaazend, zoo ter Bloedstemping, als ter
oplossing van het buitengevaatte Bloed in Kneuzingen, en van beginnende
Ontstekingen. In Zenuwkwetzingen zelve, bevogtigt hy hier mede zyn uit-
dryvend Verband, van hetwelke wy vervolgens eene Beschryving en Af-
beelding zullen mededeelen. — Ik hebbe hetzelfde beproefd in verscheiden
deezer gevallen, en doorgaans met een zeer goed gevolg. Ter Bloedstem-
ping

ping egter, heeft het my altoos toegeseheenen, dat het geene zonderlinge verdiensten heeft; en de Heer THEDEN zelve, heeft, na de uitvinding van het gebruik der Spons, in dit geval, edelmoedig erkend, dat deeze, daarin den voorrang heeft. — Het is en blyft, hierom, een zeer goed Hulpmiddel, en kan, met oordeel aangewend, niet ontbeerd worden.



BESCHRYVING
EN
AFBEELDING
DER
IN DIT DEEL AANGEPREEZEN
WERKTUIGEN.

BESCHRYVING

DE

VERBODING

DE

IN DIT DEEL VANGELIEN

WERKTUIGEN.

B E S C H R Y V I N G

E N

A F B E E L D I N G

D E R

IN DIT DEEL AANGEPREEZEN

W E R K T U I G E N.



E E R S T E P L A A T.

Fig. 1.

Een *Tentyzer*, zeer geschikt tot het onderzoek van diep gaande wonden of Verzweeringen. Het wordt gemaakt, of van Staal, of van Zilver; heeft eene willekeurige lengte, en is voorzien aan het einde *a* met een olyfwys Knopje, aan het einde *b* met een Oog, om het tevens te kunnen gebruiken ter doorbrenging van een Hairfnoer. Het Lighaam deezes Werktuigs moet dun, rond, en zeer effen zyn, en van het Oog tot het geknopte einde, allengskens in dikte afneemen.

Ggg 2

Fig. 2.

PLAAT

I.

Fig. 2.

Een *Tentyzer*, van 15 tot 18 Duimen lengte, in dikte gelyk aan een dunne Brainaald. Deszelfs einde *c* heeft een dergelyk Knopje als het voorige; het einde *d* is opgerold, op dat het gemaklyk zoude kunnen geborgen worden in de Kooker des Heelmeeſter. De Stof van dit Werktuig is een draad, bereid van zeer fyn en wel week gemaakt Zilver, ten einde het alle vereiſchte buigbaarheid zoude hebben, ter opvolging der verſchillende kromtens eener Wonde of Verzweering.

Fig. 3.

Een *dubbel Curet*, ter opruiming van zekere vreemde Lihaamen, gedrongen in eenige natuurlyke of toevallige opening van het Lighaam.

Dit Werktuig is in deszelfs Lighaam, of rond of agtkantig, naar willekeur des Heelmeeſters. De beide einden *e* en *f*, zyn lepelwys uitgehold. De holle zyden deezer einden, zyn voorzien met verſcheiden kleine rasptanden; de verheven zyden, zyn glad en effen. Het Geheel is lang 7 en $\frac{1}{2}$ Duimen, en wordt beſt gemaakt uit Staal, dog kan ook bereid worden uit goed Zilver.

Fig. 4.

Een *eenvoudig Haakje*, geſchikt ter vaſthouding van ſommige Deelen, by het ontleeden, en veele Heelkundige Kunſtbewerkingen. Het Handvatſel deezer Werktuigs wordt gemaakt van Hout, en is beſt agtkantig. Deszelfs ſtaalen Lighaam *g*, is rond, en eindigt by *h*, in een Haakje, dat niet moet gehard worden, wyl het anders ligt vatbaar is voor verbreeking. De lengte van dit Werktuig is in 't geheel 5 Duimen; 3 naamlyk voor deszelfs Lighaam, en 2 voor het Handvatſel.

Fig. 5.

Een gewoone *Sleuſſonde*, verörend ter geleide van het Snymes in verſcheiden gelegenheden. Deeze wordt beſt gemaakt van Staal, en is lang van *i*, tot *k*, 4 en $\frac{1}{2}$ Duimen; van *k*, tot *l*, één Duim. Het einde der Sleuf by *i* is geſlooten; by *k*, loopt dezelve zagtelyk uit in het begin van het Handvatſel, waaraan men deeze gedaante gegeven heeft, op dat het by het ſnyden van den Tongriem zoude kunnen dienen ter bepaaling van deeze, en opligting van den Tong. De grond der ſleuf van dit Werktuig, deszelfs randen, en den rug, moeten allen wel glad en effen bewerkt zyn: de eerſte, op dat het Snymes in zynen loop geene hinderpaa

paalen ontmoete; de laaften, op dat de Wonde of Verzwearing in welke het ge- PLAAT
bragt wordt, niet noodeloos door hetzelfde beleedigd worde. 2.

Fig. 6.

Het zoogenaamde *Myrthenblad*; een oud, van veelen afgekeurd, dog niet ongemaklyk Werktuig, ter afneeming der Verbanden, en het fmeeren van zekere Zalven en Pleisters, op Plukzel of Linnen. Men maakt hetzelfde fomwylen uit Staal, fomwylen uit Zilver, naar dat of de keuze, of het vermoogen des Heelmeefters zulks vorderd of toelaat, Deszelfs geheele lengte is 5 en $\frac{1}{2}$ Duimen, 4 naamlyk voor het Tangwyze, en 1 en $\frac{1}{2}$ voor het Spatelwyze gedeelte.

Fig. 7.

Een *Ontleed tangetje*, dat tevens in de Heelkunde kan dienen ter afneeming der Verbanden, en het opruimen van vreemde Lighaamen, toevallig gedrongen in de zelfftandigheid der Deelen. Het wordt dan eens gemaakt uit Zilver, dan eens uit Staal; en moet altoos zulk eene veerkragt hebben, dat de Vingeren des Heelmeefters niet vermoeid worden by deszelfs gebruik. Zyne lengte behoord nimmer meerder te zyn dan 3 en $\frac{3}{4}$ Duimen.

Fig. 8.

Een *geoogd Verband Tangetje*, by de meeste Hedendaagsche Heelmeefters geagt als het beste; fchoon ik het voorige altoos gemaklyker bevonden hebbe. Men kan hetzelfde maaken, of uit Staal of uit Zilver; de keuze van ftof, is ten zynen opzigte onverschillig. Deszelfs lengte moet niet meer bedraagen dan 5 en $\frac{1}{4}$ Duimen, waar van flegts 2 begreepen zyn tuffchen *m*, en *n*. Het geheele Werktuig moet wel glad en effen bewerkt zyn; en de einden van deszelfs Bekken, by *m*, van binnen met kleine Tanden voorzien worden door middel eener fyne driekante Vyl.

T W E E D E P L A A T.

Fig. 1.

Een *Rondsnedige Biftourie*.

Fig. 2.

Een *Holsnedige Biftourie*.

Ggg 3

Fig. 3.

PLAAT

2.

Fig. 3.

Een Regte *Liftourie*.

Alle deeze Werktuigen hebben dit gemeen met elkanderen, dat hun snydend gedeelte, de lengte heeft van 2 Duimen; en derzelver Hiel, die hier binnen de bepaaling van het Hegt begrepen is, van 7, of 8 Lynen: dat het einde der rug van deezen Hiel uitloopt in een plat en geknopt Staartje, *o, o, o*, vallende in een gelyk groote uitranding van het overéénstemmend gedeelte des Hegts, als het Werktuig gesteld is in het geval van gebruik, en agtervolgens de Afbeeldingen: dat de grootste breedte van het Lemmet, ter plaatze van het voorste einde des Hegts, gelyk is aan 5 Lynen, en allengskens afneemt tot aan den Punt; de *rondsnedige Liftourie*, alleen uitgezondert, welks grootste breedte zig bevind by *q*, dat de Rug, by *p, p, p*, de dikte heeft van 1 en $\frac{1}{2}$ Lyn, en tot aan denzelfden Punt, trapswys, en van stee tot stee vermindert: datze moeten gemaakt zyn, van zuiver en fyn Staal, en zoo, dat de snede buigd alsze gedrukt word op den Nagel: eindelyk, dat menze telkens aanzette, alsze gebruikt zyn, en nooit anders dan op Lancet steenen.

Fig. 4.

Een *Snymes op zyn plat geboogen*, ter wegneemiug van zekere Gezwellen en Uitwassen. Dit Werktuig is lang van *r*, tot *s*, 2 en $\frac{1}{2}$ Duimen, en deszelfs Hegt 4 en $\frac{1}{4}$ Duimen. De grootste breedte van het Lemmet die ter plaatze is van *s*, is 4 Lynen, de dikte van het agterste gedeelte der Rug houd iets meer dan 1 Lyn. Deeze zelfde dikte, en de breedte van het Lemmet, verminderen ongevoelig naar vooren, en loopten byna tot niet aan den Punt. Het Hegt is agtkantig, maar zoo, dat de twee vlakten, die met het plat van het Lemmet overéénstemmen, de breedste zyn: het eindigt by *t*, op de wyze der hegten van de Ontleedmesjes.

Fig. 5.

Het *Vytmesje*, dus genoemd naar het Gebrek, by welks behandeling het inzonderheid te passe komt. Dit Mesje heeft alle hoedaanigheden van het gewoone Scheermes, dog is van *u*, tot *v*, de uitgestrektheid van deszelfs Snede, niet langer dan 2 Duimen. De Hiel deezes Werktuigs eindigt van agteren met een plat geknopt Staartje *w*, even als by de drie eerst beschreeven Snymessen: deszelfs lengte is iets meer dan 1 Duim.

Fig. 6.

Fig. 6.

PLAAT

2.

Een *Laneet ter opening van Ettergezwellen*. Het zelve verschilt niet van de gewoone *Lancetten*, dan in grootte; en moet op dezelfde wyze bewerkt, geslepen, aangezet, en gezuiverd worden. By eene volgende gelegenheid, zullen we hier omtrent eenige meerdere byzonderheden mededeelen.

D E R D E P L A A T.

Fig. 1.

Een *regte incisie Schaar*. Deszelfs Stangen en Oogen, maakt men veelal van Zilver; de Bladen moeten bereid worden uit fyn Staal. Het snydend gedeelte van deeze moet overal eene volmaakt gelyke hardheid hebben, en zoo fyn zyn, dat men niets dan de Levantsche steen noodig heeft, om den Draad daar van weg te neemen. De lengte der Bladen behoord gelyk te zyn aan 2 Duimen, van *a* tot *b*; die van het Schild, aan 1 Duim van *b* tot *c*; die der Stangen aan 15 Lynen, van *c* tot *d*; en die der Oogen, van *d* tot *e*, aan 1 Duim; dat is derhalven voor de geheele lengte van *a* tot *e*, 5 en $\frac{1}{4}$ Duimen. De Punten *a* moeten stomp zyn; of zo als sommige willen, geknopt, op de wyze der volgende Afbeelding.

Fig. 2.

De *half kromme incisie Schaar*, door veele Heelmeesters verworpen, maar inderdaad van een voortreflyk gebruik in verscheiden gelegenheden. Deszelfs maakzel rust op dezelfde beginzelen als de voorige, waar van ze niet verschilt dan door de kromte haarer Bladen.

Fig. 3.

Een *Ontleed Schaartje*, dat tevens in de Heelkunde by verscheiden gelegenheden een oneindig nut influit. Deszelfs Bladen van *f* tot *g* zyn lang 1 en $\frac{1}{4}$ Duim; het Schild, van *g*, tot *h*, 1 Duim en 2 Lynen; de Stangen van *h* tot *i*, 1 Duim en 9 Lynen; de Oogen, van *i* tot *k*, 1 Duim; en dus het geheele Werktuig van *f* tot *k*, 5 Duimen en 2 Lynen. De Punten moeten Spits, en de Sneden wel scherp zyn.

Fig. 4.

De *hedendaagsche Stylet Schaar der Engelschen*; een Werktuig by ons nauwlyks bekend; van niemand zoo veel ik weete afgebeeld; en veel beter dan de gewoone

PLAAT 3. ne Stylet Schaaren. De geheele lengte derzelve is 5 Duimen en 3 Lynen; die der Bladen 1 en $\frac{1}{2}$ Duimen; van het Schild 1 Duim; van de Stangen, 1 Duim, en 8 Lynen; en der Oogen, 1 Duim, en 2 Lynen. De hoek welke de Bladen met het Schild en de overige deelen der Schaar maaken in het punt *l*, het Werktuig niet geopend zynde, is gelyk aan 141 Graaden; de breedte van het Styletwyze Blad by *m* is 3 Lynen; by *n*, 1 Lyn; en die van het andere by *l*, 4, by *o* 2 en $\frac{1}{2}$ Lynen. De zyden *p* en *q* der beide Oogen, moeten met de Stangen, na genoeg eenen zelfde regte lyn maaken; en het geheele Werktuig uit best Staal bereid worden,

Fig. 5.

Een holle Schaar, zeer geschikt voor het wegsnyden van zekere Gezwellen, Uitwassen, en dergelyke. Deeze verschilt alleen daarin van de regte incisie Schaar Fig. 1, dat de beide Bladen op haar plat hol zyn, en het Schild zoo wel als de Stangen, dermaate naar dezelfde zyde omgeboogen, dat, als men de oogen doet rusten op een platte oppervlakte, het midden der geheele holte, na genoeg beantwoord aan het draaipunt der Schaar, en deszelfs Punten, 2 Duimen boven deeze zelfde oppervlakte verheven zyn.

V I E R D E P L A A T.

Het *Tourniquet* van PETIT, zoo als het sedert 23 Jaaren, by meest alle Heelmeesters van Frankryk gebruikt wordt.

Dit Werktuig is meestal gemaakt uit geel Koper, en hier door kleiner, en meer handelbaar dan het gewoone, terwyl het tevens geene meerdere zwaarte heeft.

Hetzelve bestaat uit drie Platen, een Schroef, twee Kussens, en een Band.

De bovenste Plaat *AA*, draagt op zyne bovenste oppervlakte twee Beugels *bb*; heeft by *cc* twee ronde openingen; en in het midden een Bos *I*, die van binnen eene Moer draagt, en gedeeltelyk daar op geklonken, gedeeltelyk gefoudeert wordt.

De middenste plaat *BB*, is voorzien by *dd*, met twee rolronde yzeren Stylen, hier op geklonken, en gaande door de twee openingen *cc*, van de bovenste plaat. Deszelfs rand is van stee tot stee doorboord met verscheiden kleine gaatjes, ter doorlaating eener Naald en Draad, voor de aanhegting van een der Kussens.

De onderste Plaat, de kleinste van allen *CC*, heeft twee gelyke Beugels *ee* als de bovenste, en is even als de middenste, bedeed met verscheiden gaatjes, ter aanhegting van een Kussen.

De

De Schroef *D* heeft 4 Lynen middenlyn, en van boven een gespleeten Hoofd. PLAAT
4.
je, ter inlaating van het midden der vleugelwyze Plaat *ff*; deszelfs onderste einde verdund by *g* tot een Spil, die aan het benedenste gedeelte der middenste plaat op een klammetje wordt vast geklonken.

De kussens worden gemaakt uit Schaapen Leder met Olie bereid, en stevig opgevuld met Katoen-wol. Het grootste *E*. wordt genaaid aan de middenste, het kleinste *F* aan de onderste Plaat, op de Wyze als te zien is by *B G B*.

De Band *H, H, H*, wordt gevlogten van grove gesponnen Zyde, en moet 3 voeten lang, en 8 Lynen breed zyn. Aan deszelfs eene einde wordt een sterke Gesp *h*, vastgehegt; het daar op volgende gedeelte heeft twee ronde openingen ter doorlaating der Stylen *d d*, van de middenste Plaat; en een soort van Knoopsgat tusschen dezelve, voor den doorgang der Bos *I*, van de bovenste. Voor het overige loopt dezelve door de Beugels der bovenste en onderste Platen, by de Letters *b b*, en *e e*, aangewezen.

De grootte van dit Werktuig is eenigzints verschillend, naar het verschil der Deelen aan welke het wordt aangelegt. Zoo als het hier is afgebeeld, diend het inzonderheid voor den Arm by Volwassenen. Voor den Dye, moet het zelve een vierde, of ten minsten, een derde meerderkragt hebben; en voor den Arm van Kinderen, een derde, of de helft minder.

V Y F D E P L A A T.

Fig. 1.

Het *Werktuig van LOTTERIE* ter stemping der Bloedvliet eener gekwetste Tusschenribbige Slagader, gezien op zyn plat, en van terzyden. — *a, a, a, a*, Zyn vier gaatjes, geschikt ter vasthegting van een Stukje fyne, drooge, en wel in een geperste Spons. *b*, Is eene eironde opening, ter doorlaating van het Bloed, inde Borstholte uitgestort. *c, c*, Zyn twee langwerpige openingen, verordend tot den doorgang van eene Band, door dewelke dit Werktuig, aangelegt zynde, op zyne plaats bevestigd wordt. *d, d*, Twee gaatjes, dienende ter vastnauing van voormelden om het Lighaam gaanden Band, wanneer men vrees, datze anders zoude los gaan, en het Werktuig doen verplaatzen.

Het geheel wordt gemaakt van ongehard Staal, dat wel glad bewerkt is. Deszelfs lengte en breedte moet gelyk zyn aan de Afbeelding *A*: de dikte aan die van *B*: en de omgeronde Hoeken van het voorste einde, aan *e, f*.

H h h

Fig. 2.

PLAAT

5.

Fig. 2.

De *Stopper des Verhemelte*, voor zoo veel dezelve vatbaar is voor eene Afbeelding. Ik zegge, voor zoo veel dezelve vatbaar is voor eene Afbeelding; omdat de waare gedaante deezes Werktuigs niet kan bepaald worden, doordien de holte des Verhemelte niet by alle Menschen dezelfde is; het Beenbederf van het zelve zeer verschillende Vernielingen aanrigt; en het Werktuig altoos moet beantwoorden aan de een en ander deezer byzonderheden.

Meestäl, wordt deszelfs gedaante geregeld naar het Gezigt, zonder eenige bepaalde meeting. Het gevolg hier van is, dat het zelden voldoet aan het oogmerk, en de vereischte sluiting onvolkoomen is. Om zeeker te zyn, moet men een week gemaakt eirond plaatje van Was, ter dikte van 2 Lynen, of daar omtrent; en dat eene Middenlyn heeft van 18 Lynen, door den top des Duims van de Regterhand, zagtelyk in de opening drukken van het Verhemelte, het zelve wegneemen, en het overtollige der platte randen, met eene Schaar afsnyden. Een week gemaakt Zilveren Plaatje van $\frac{3}{4}$ Lyn dikte, geeft men als dan alle mooglyke gelykheid aan dit Model, zoo van de holle, als van de verheven zyde; soudeert vervolgens op het midden der laatste zyde, een rolrond Zilveren Styltje C; maakt aan het einde g, van dit, een schroef draad, om te sluiten in de Moer D; en bekleed het zelve met een stukje Spons, evenreedig aan de grootte der opening van het Verhemelte.

Fig. 3.

De *Pharyngotomus*, een Werktuig, door den beroemden PETIT uitgedagt, ter opening der Verzweringen welke in de Keel plaats grypen. Deszelfs Schede E, F, is gemaakt van Zilver, dik $\frac{3}{4}$ Lyn, breed 10 Lynen, en lang 5 Duimen; naar de lengte, op de helft der breedte omgeboogen, gefoudeert, en dermaaten gekromt, dat ze een gedeelte maakt des omtreks van een Cirkel, welks middenlyn gelyk is aan 16 Duimen. — Het kokerwyze Deel G, H, van het zelfde Metaal gemaakt, is lang 2 Duimen en 3 Lynen; heeft een ronde holte van 6 Lynen Middenlyn; is aan het einde G van binnen voorzien met een Moer, die het schroefwyze einde ontfangt van de Schede E, F; en op de hoogte van e, van een door gaat middenshot, daar de platte steel door heen gaat van het Lancet I. Aan de buitenste oppervlakte deezer kooker, aan de zyde, die met de holle bogt der schede overéénstemt, is gehegt een Ring K, ter houding van het geheele Werktuig; deszelfs agterste einde wordt geslooten met een doorgaat dekzel f, daar een ge-
ge.

geknopt rolrond Staafje in speeld, dienende ter vasthouding en beweeging des Lancets. — Dit Lancet, dat van best Staal moet gemaakt zyn, wordt met het agterste einde vastgemaakt in het gespleeten voorëind van gemeld rolrond Staafje; aan welks middendeel omtrent, gehegt is het eene einde van eene platte Spiraalveer, die met haar andere einde stoot tegen het te vooren beschreeven middenshot des Kookers; en door welke, de punt van het Lancet, binnen de holte der Scheide terug springt, zoo dra men ophoud met drukken op het Knopje g van het Staafje, daar de steel des Lancets in gevat is.

PLAAT
5.

Fig. 4.

Het Werktuig van den zelfden Heelmeester, tot het doen der Tegenöpeningen.

Dit is, ten opzigte van zyne Priem, en Canul, gelyk aan de gewoone *Troisquarts*, welkers maakzel wy naderhand beschryven zullen; en betreklyk tot L, M, N, aan de *Pharyngotomus*. Het verschild slegts van de een en ander, daarin; dat het twee Ringen heeft *h, h*; eene eironde opening *i*, ter doorlaating van een zogenaaemde Hairfnoer; en een Spleet, *k, k*, ter geleide van de punt eens Snymes.

Z E S D E P L A A T.

Fig. 1.

Het Werktuig van PIBRAC, ter herééniging der dwerssche Tongwonden. A, Een zakje van fyn Linnen, by *a, a*, vastgemaakt aan de geboogen einden van een Yzeren draad *aa, bb, cc*; by *bb*, en *cc* dermaaten geboogen, dat de eerste twee bogten beäntwoorden aan den rand der Onderlip; de laatste, aan den grond van het Kinstuk des Onderkaaks. Aan deezen draad is by *d d*, gehegt, het middendeel van een Lint *ee*, door het welke, dit Werktuig, als men de Tong gesteecken heeft in het Zakje, op zyne plaats bevestigt wordt.

Fig. 2.

Het *Pesfarium* des Heeren CAMPER, gedraaid uit Yvoor, en bestaande uit een holle Schyf, *B, B*, breed overkruls omtrent 2 Duimen, meerder, of minder, naar de omstandigheden verëisfchen. In deeze Schyf zyn drie Gaten, waar van slegts twee hier zichtbaar zyn by *f f*; Gaten, klein van omtrek, en geschikt ter doorlaating van vogten — De Schyf loopt uit in den Steel C, welke by *g g*, het dunst, en $\frac{3}{4}$ Duim breed is. Deeze eindigt in een plat stuk *DD*, welkers

H h h 2

randen

6. *P L A A T* randen zeer rond en glad gewerkt zyn, voorzien van twee gaten *bb*. — Het geheele Werktuig is lang $3\frac{1}{2}$ Duimen, breed $1\frac{1}{2}$ Duim, dik $\frac{3}{8}$, het onderste platte stuk $\frac{3}{4}$. — Eer hetzelfde aangelegt wordt, doet men een linnen band, 3 Vingers breed, met twee knopen en knoopsgaten voorzien, om het lyf van de Lyderesse : aan dezen Band moeten op de zyden, juist midden op de Heupen, gehegt worden 2 Bandjes, elk van $\frac{1}{4}$ El lengte. Men doet daarënboven 2 andere Banden, die ieder een Pink breed, en een El lang zyn, door de gaatjes *hh*, van het platte stuk *DD*, om hetzelfde, ingebracht zynde, hier mede te verbinden aan de voorigen. — De stand van het ingebragte Werktuig, moet dusdanig zyn, dat de randen *DD*, van het platte stuk, naar vooren en agteren zien; en het vlak of de holte der Schyf, opwaards gekeerd is.

Fig. 3.

De *Lieschbreukband* van denzelfden Hoogleraar. Deze verschilt inzonderheid daarin van alle andere; dat de lengte des Beugels van *E* tot *F* $\frac{10}{12}$ bevat van den gantschen omtrek des Bekkens, gemeeten in eene volstrekt dwersche strekking, over het meest blykbaare gedeelte van de een en ander *Tensor vaginae femoris*; en datze, in kookende Olie gehardt, eene zeer groote veerkragt hebben, zonder merklyke zwaarte. De overige byzonderheden van dien Band, zyn dezen. De Riem *i, k*, moet gehegt worden aan den Beugel, op den afstand eens Duims van deszelfs uiteinde: de Plaat *G*, moet by vette Menschen de afgebeelde gedaante hebben; by Mageren verlengd worden tot *l*: de kurken Pop, op de binnenste oppervlakte dezer Plaat genaaid, moet in grootte, hier aan na genoeg gelyk zyn, en een bolrond hebben, glooiend aflopend naar buiten, en boven: in dubbele Breuken, moet den afstand van *mn*, dat is, die der twee Platen en Poppen, geregeld worden naar den afstand der ringen van de Buikspieren, die niet altoos dezelfde is, en door de plaats der tweede Zwelling wordt aangewezen: de lederen Riem eindelyk, moet wel sluitend gehegt worden aan de haakjes der Popplaten, of door een Gesp in de plaats van dezen; en het geheele werktuig moet men bekleeden, zoo zagt immer mooglyk is, onmiddelyk met Duffels, en daar over met het een of ander Leder, of met bruin Haazenvel, het hair gekeerd naar buiten. Vermits dit Bekleedzel, den omtrek des Bands eenigermaten verkleind; is het noodzaaklyk dat men de maat wat ruim neeme, en althans een Duim hier voor rekene.

Fig. 4.

Fig. 4.

PLAAT

6.

Dat gedeelte des Bands eener Dyebreuk, van den zelfden zeer beroemden Man, welk het foortönderscheidend verschil maakt met den vorigen. * *o*, *p*, Betekend de helling des Beugels aan de zyde der Breuk naar beneden, en de gedaante der Popplaat; met welke laatste, de Pop zelve, in alle deelen moet overëenkoomen.

Z E V E N D E P L A A T.

De Slangswyze draadband voor de Navelbreuken; een Werktuig, zoo veel my bekend is, nog nimmer beschreeven; en my beleefdelyk medegedeeld van den Heere BOELHOUWER, een jong, dog verstandig Heelmeeſter. *AB*, is een plat Koper draad, ſlangswys geboogen, en in lengte gelyk aan iets minder dan de breedte der Lenden van het lydend Voorwerp. *a, a, a, a*, Een ſtrook Zyldoek ter breedte van $1\frac{1}{4}$ Duim, gaande door de ſlingeren van deeze. *C, D*, Twee lederen Riemen, by *b, b*, vaſtgenaaid om de einden van het Koperdraad, en tevens aan die van den Zyldoekſchen Band: deeze Riemen maaken met elkanderen, iets meer dan het overblyvend gedeelte van den gantschen omtrek des Lighaams, gemeeten overden Navel; en zyn doorſlagen met verſcheiden gaten. *E*, is een dunne, ronde, eenigzints hol en veerkragtig geſlagen Yzeren plaat, gezien aan de zyde van dezelfs buitenſte en bolle oppervlakte; in grootte iets meerder dan den omtrek is der Navelbreuk; bekleed met Ruſleder; en voorzien by *c, c*, met twee platronde knopwyze Styltjes. *F* eindelyk, is dezelfde Plaat, gezien van de holle zyde, en bekleed met zeem of eenig ander zagt Leder.

By den aanleg des Werktuigs, legt men den Lyder op den Rug, met het Hoofd en de Borſt een weinig verheven, en de Dyën ſtomphoekig geboogen. Men brengt den geheelen draadband, bekleed met een losſe Bombazynen ſchuif, op de hoogte des Navels, onder zyne Lenden door; zoo, dat de Riemen, die ook voor een gedeelte van deeze ſchuif moeten bekleed zyn, ter weêrzyden gelyklyk uitſteeken. Men brengt de Breuk alsze uit is, binnen; legt op denzelven, een half bolronde Kurken pop, gedoopt alvorens in een mengzel van Was, Spiegelhars, en Menie, en in omtrek nagenoeg, dog niet volkoomen gelyk, aan die der Plaat. Eindelyk legt men deeze zelfde Plaat, met zyne holle oppervlakte, op dien pop, en hegt de beide Riemen, door middel van deeze of gene hunner gaatjes vaſt aan de knopwyze Styltjes *cc*, zoo, dat het geheele Werktuig nauwkeurig ſluite, in den Staat eener middenmaatige inademing.

PLAAT 7. Ik moet van dit Werktuig zeggen, dat het alle verëischten influit ter bepaaling der Navelbreuken, althans by Menschen die geen zeer dikken en als hangenden Buik voordraagen, om dat het zig in allerlei standen van het Lighaam, en by de in- zoo wel als uit-ademing, door het veerend vermoogen van deszelfs draadwys gedeelte, nauwkeurig regeld naar den omtrek des Lighaams, en altoos eene gelyke fluiting geeft. — Het smert my, dat ik deszelfs Uitvinder niet hebbe kunnen naaspooren, en hier door buiten staat gesteld ben, om denzelven de verdiende eer te geven. — Ik hebbe 'er eenige weinige veranderingen in gemaakt; en het is na deeze, dat de Afbeelding vervaardigt is.

A G T S T E P L A A T.

De *Tabaksklysteer*, door den Heere H. G. OOSTERDYK, en my uitgedagt, en beschreeven in de *Vaderlandsche Letteroëffeningen*.

Dit Werktuig, 't welk ik met genoegen zie dat vry algemeen wordt goedgekeurd, en bereids in zeer veele, en verschillende gevallen, met den besten uitslag beproeft is, wordt gedraaid uit Palmboomen Hout, en bestaat uit drie Stukken, by *Fig. 1, 2 en 3*, afgebeeld.

Fig. 1.

Dat ik het *Mondstuk* noeme, en de lengte van 6 Duimen heeft, is eene Buis, die van boven eindigt met eene opening van 4, en van onderen met één van 6 Lynen Diameter. Het wordt, door een verlengden en gladden rand, welke een omtrek heeft van 5 Duimen en 2 Lynen, en by *a b c d* is aangewezen, verëénigt met

Fig. 2.

De *Bos* van het Werktuig. Deeze Bos heeft de lengte van 3 Duimen en 4 Lynen. Deszelfs rolronde holte *e*, is diep 3 Duimen, en heeft eene middenlyn van 1 Duim en 3 Lynen. Gelyk met den Bodem, is eene ronde opening *f*, met of zonder schroefdraad, welkers middenlyn gelyk is aan 5 Lynen. De geheele holte is bekleed met Blik, langs den bovenrand omgeslagen, en ter plaatze van *f*, voorzien met eene opening, een weinig kleiner dan de voorige. Het bovenste gedeelte *g, h*, beantwoordt in hoogte en omtrek, dermaate, aan den verlengden onderrand van het eerste stuk, dat het door deeze nauwkeurig kan omvangen worden. Voorts moet de omtrek der opening, by den Bodem, *i, k, l*, plat zyn

zyn; op dat het gedeelte *m*, van het derde stuk, juist hier tegen aan zoude kunnen sluiten. Dit zelfde derde Stuk. PLAAT
8.

Fig. 3.

't Welk de saamenstelling voltooid van dit Werktuig, is niet anders dan eene Kegelwyze Pyp, ter lengte van 8 Duimen en 2 Lynen. Derzelver omtrek is na genoeg gelyk aan die der Buis van het Mondstuk, op dat het in deeze, en de holte van den Bos, geborgen konne worden. Het eene einde deezer Pyp, *n*, heeft een olyfwys Knopje; het andere *o*, een Schroefdraad, welke ontfangen wordt in de zydelijke opening *f*, van het tweede stuk. Als deeze opening zonder draad is, moet ook dit einde glad zyn, en in omtrek, nauwkeurig daar aan beantwoorden. De onderste opening deezer Pyp, moet eene Middenlyn hebben van 4, en de bovenste van $1\frac{1}{2}$ Lynen.

Dit Werktuig wordt na onze opgave gemaakt, by den Konstdraaijer JACOBUS VAN RAAM, in de Stoofsteeg hier ter Stede woonagtig. Deszelfs prys, bedraagt niet meer dan één Gulden, en zefstien Stuivers.

Omtrent deszelfs gebruik moet men aanmerken, dat de Lyder met een half geboogen Lighaam, ter linker zyde gelegd worde op een Bedde, of eenigerleije andere Legerstede; dat men de Pyp *Fig. 3*, in de opening *f*, van den Bos, *Fig. 2*. gesteecken hebbende, die Bos maatig vast, en byna geheel vulle met Rooktabak, en dezelve doe ontbranden, door het bybrengen van de eene of andere Vuurstof; dat men hier na, denzelfden Bos vereenige met het Mondstuk *Fig. 1*. en tragte, door een zachte blaazing, de Tabak meer en meer te doen ontbranden; dat men eindelyk, de Pyp, vooräf met Olie of eenig zagt Vet besmeerd, tot aan de kringwyze Lyn *p*, in den Endeldarm brenge, en door eene middenmaatige blaazing van weinig minuten, naar verëisch van zaaken meer of min dikmaalen herhaald, de Rook doe opklimmen in den Darmbuis.

By een dikmaalig gebruik van dit Werktuig kan het gebeuren, dat het uiterste einde der Pyp, door den aanhangenden Tabaksrook, in eene zekere maate verstoppt worde. In dit geval moet men zig bedienen van den tusschentyd der inblaazingen, om de opening te zuiveren door middel van een *Pypwiffcher*, een zeer gering en bekend Werktuig, 't welk ik gewoon ben, in den Bos van onze Tabaksklyfsteer te besluiten.

Om geen gevaar te loopen, dat 'er, te gelyk met den Tabaksrook, vonken in den Darmbuis opklimmen, behoeft men slegts zorge te draagen, dat de Tabak
niet

9. *PLAAT* niet meer dan tot twee derden verbrande, voor men den Bos weder op nieuws aanvulle; hoewel het waar zy, dat dit gevaar meer denkbeeldig is dan weezenlyk, en althans geenerleiye schadelyke uitwerkzelen kan voortbrengen.

N E G E N D E P L A A T.

Het *Werktuig des Heeren HUSSEM*, ter herstelling des ontwrigten Schouder, van my §. 1325. voor alle andere aangepreezen.

Fig. 1.

Vertoond het *Werktuig* zelve, in zyn gantsche saamenstel; en wel A, een Eiken-Notenboomen- of Maghoniehouten Berd, lang 2 voeten en $8\frac{1}{2}$ Duimen, breed $5\frac{1}{2}$ Duimen, en Dik 10 Lynen. — Aan het einde van dit Berd, by *a*, is, door middel eener koperen Seharnier (aan deszelfs agterste of liever onderste oppervlakte met een plaatje gehegt,) verbonden het schild B, dat uit Koper gemaakt, na de zydelijke rondte van de Borst geboogen, met Kalfsleder bekleed, en aan zyne holle zyde, met gebrand Paardenhair, kuffenswyze gevuld is. De afstand der bovenhoeken *b, b*, van dit Schild, ten opzigte van elkanderen, is $8\frac{1}{2}$, der beneden 9, en deszelfs hoogte 7 Duimen. By de eene bovenhoek, is door middel van een Koper Schroefje, en een soort van Knoopsgat, losjes veréénigt, de Riem *c*, die aan zyn einde een Gesp draagt, en de lengte heeft van $6\frac{1}{2}$ Duimen: by de andere, is op gelyke wyze vast gemaakt, de Riem *d, d*; lang 3 voet en 8 Duimen. Een derde Riem, *e, e, e*, aan zyn eene einde voorzien van een Gesp, lang 4 Voeten en 4 Duimen, en even als de vorige breed $1\frac{1}{2}$ Duimen, loopt door twee lederen lutsjes, dwersch over de buitenste oppervlakte van het Schild, en is voor het overige, met niets verbonden. — Aan het andere einde van het voorbeschreeven Berd, zyn geplaatst twee Zyklampen van hetzelfde Hout, *f, f*; lang aan haar Voetstuk 5, en hoog in haar midden, 3 Duimen. Tusschen deeze Klampjes, is bevat het Windas C, dat van Palmboomen hout gemaakt is; eenen omtrek heeft van 6 Duimen; en aan zyne beide einden, eene eenigzints verheven en ronde rand heeft. Het Koperen Rad van dit Windas *g*, met hetzelfde vereenigt, en om een gemeenen Spil draaijende, heeft 24 Kamtanden, waarvan flegts eenige hier zichtbaar zyn. In het midden der lengte van den As, is in eene langwerpig vierkante holte, onder een koper Plaatje *h*, vastgeklonken eene sterke hennippe Band, *i, i, i*, lang 2 Voeten en 10 Duimen: breed $1\frac{1}{2}$ Duim, en by derzelver einde *k*, tusschen een

een omgeboogen koperen plaatje *l*, vereenigt met een sterke yzeren Haak *m*. Een Spil, *D*, van Yzer gemaakt, draagende aan zyn eene einde het Rondzel *n*, en aan zyn andere, het koperen schuinze Tandrad *o*; is by *p*, verëenigt met den yzeren Zwengel, *E*, die de lengte heeft van $5\frac{1}{2}$ Duimen; en een regten hoek maakt met het houten Handvatzel *F*, dat $4\frac{3}{4}$ Duimen lang is. De Pal *G* eindelyk, by *r*, *r* vast geklonken, reift vervolgens eenigzints opwaards, is lang 6 Duimen, en valt met zyn einde, tusſchen de Tandten van het Rad *o*.

PLAAT
9.

Fig. 2.

Is een dubbele Kalfslederen Riem, by het gebruik des voorgemelde Werktuigs dienende ter aanhegting van den Haak *m*, *Fig. 1.* Deeze Riem bestaat uit twee ſtukken *H*, *I*, by *s*, *s*. zeer vast genaaid aan, en tusſchen elkander. *K*, is lang 19 Duimen, waar van $9\frac{1}{2}$ Duimen begreepen zyn tusſchen *t*, *t*, dat de breedte heeft van $1\frac{3}{4}$ Duimen: de overige breedte van dit ſtuk, is 1 Duim. Op de buitenſte oppervlakte van deszelfs breedſte einde, draagt dezelve de Gesp *L*. De lengte van *I*, is $14\frac{1}{2}$ Duimen: deszelfs breedte by *v*, dat het midden is der Luts, welke dit Deel maakt, is omtrent 10 Lynen.

Aangaande het aanleggen van dit Werktuig, kan ik alleenlyk aanmerken, dat het Schild, op een dubbel gevouwen Laken, geplaatſt wordt tegen het boven zydeſke gedeelte van de Borſt, en aldaar bevestigd door de aanſluiting van deszelfs Riemen, gedeeltelyk op den tegengeſtelden Schouder, gedeeltelyk aan de tegenſtaande zyde van de Borſt: dat de Arm, een weinig opgeligt, en in het Gewrigt des Elboogs ſtomphoekig geboogen zynde, zoo ver de Opperarm betreft, gelegd worde op het Berd: dat men de Riem *Fig. 2.* dus aanlegge, onmiddelyk boven de knokkels des Armbeens, dat de Luts *I*, beneden de punt des Elboogs nederhange: dat men vervolgens de Haak *m*, *Fig. 1.* vast ſlaa in het onderſte deezer Luts, zoo dat deszelfs punt naar buiten gekeert is, en de Band *i*, *i*, *i*, van dezelfde *Figuur*, ſpanne, door eenige weinige ſlagen te doen met den Zwengel *E*: dat men eindelyk, door het langzaam omdraaijen deezer Zwengel, by deszelfs Handvatzel, de uitrekking zoo verre voortzette, tot men in ſtaat is, het uitgeweeken hoofd des Armbeens te herbrengen in zyne Gewrigts vlakke. — De overige byzonderheden, hier toe betreklyk, gelyk ook de verſcheidenheden van deszelfs aanwending, ingevolge den verſchillenden aart der Ontwrigting, laate ik over aan den Uitvinder, die van alles eene meer omſtandige, en voldingende Beſchryving heeft medegedeeld aan het *Zeeuwſch Genootſchap der Weetenſchappen*, welkers gemeenmaaking ik rykhalzend te gemoete zie.

Het *Werktuig* van VACHER, ter regting eener scheve Ruggraad, verbeeld in deszelfs aanleg, en veréénigt met het Keurslyf.

Fig. 1.

Het *Werktuig*, gezien van agteren; dat is, op het vlak van het Rugstuk des Keurslyf.

A, is een Koper plaatje, lang $3\frac{1}{2}$ Duimen, breed 1 Duim en 8 Lynen, en dik $1\frac{1}{2}$ Lyn: het heeft de gedaante eener Regthoek, welkers hoeken zyn afgesneden. By elk deezer hoeken is een gaatje, *a, a, a, a*, voorzien met eene Schroefdraad, en van een Lyn Diameter, ter ontfanging van even zoo veele Schroeven met platte hoofden, die het zelve hegten aan het Baleinen Keurslyf, welks dikte zy doorloopen. *b, b*, Zyn twee vierkante Beugels, waar van de eene geplaatst is, digt by den bovenrand van de Plaat; de andere twee vingeren breed van deszelfs onderrand; en die beiden dienen ter bepaaling en geleiding van het benedenste gedeelte des opligtenden Booms van het *Werktuig*. Beneden, en ter regterzyde van den ondersten Beugel, is gehegt een Wipveer, *o*, draaijende om de overéénstemmende Schroef die het plaatje veréénigt met het Keurslyf, of om eene andere *c*, en verordend ter ondersteuning van voorgemelden Boom, door van stee tot stee te vallen, tusschen de tanden van deszelfs Kamrand. Een Staalen veer *d*, lang $1\frac{1}{2}$ Duim, regeld de beweeging deezer Wipveer, en perst dezelve geduurig tegen den Boom.

B, B, De Boom deezes *Werktuigs*, is een Staalen Staaf, koud geslagen. Dezelve heeft overäl eene gelyke dikte, en is breed, $2\frac{1}{2}$ Lynen. Hy strekt zig regstandig uit van de eerste Lendenwervel, tot het agtermiddenste gedeelte van den Hals. Ter deezer plaatze, deszelfs dikte en breedte, regtstreeks verwisseld zynde, verkreight hy de bogt van het bolrond des Agter- en Opperhoofds, en strekt zig uit, tot aan den bovenrand des Voorhoofdsbeen, gelyk alles nader, in de tweede *Figuur* wordt aangewezen. De benedenste helft van het eerste gedeelte deezes Booms, draagt ter regter zyde eenige schuinze Tandén, in uitgestrektheid gelyk aan deszelfs dikte: deeze Tandén moeten een Lyn van elkander staan, en niet meer nog minder. Ik plaatze dezelve aan de regter, en niet gelyk de uitvinder van dit *Werktuig*, aan de linker zyde, om dat men dus de Boom, de Wipveer, en dergelyke gemaklyker kan bestieren.

C, C, C, C, Verbeeld het meest saamengestelde gedeelte van het geheele Werktuig, bestaande inzonderheid uit vyf stukken. Het eerste *d, d*, is eene Muts, van eenigerleijze zachte stof gemaakt, en zoo ruim, dat derzelver randen *ee, ee*, ter breedte van vier dwersche Vingeren, kunnen omgeslagen worden. Deeze Muts moet even boven de Voorhoofdsbulten, twee knoopsgaten hebben, ieder van een Duim lengte. — Het tweede stuk, waar van hier, by *f*, slegts een klein gedeelte kan gezien worden; is een dubbele linnen Band, gevuld met Katoen-wol. Zy is drie Vingeren breed, en beantwoord in lengte, aan den omtrek des Hoofds. Deeze Band wordt zoo aangelegt, dat deszelfs midden beantwoord aan het Agterhoofd; de zydedeelen agter de Ooren opklimmen; en de einden gaan door de voorgemelde knoopsgaten van de Muts. — Het derde stuk is eene dubbele Gesp, hier niet zichtbaar, maar verbeeld by *Fig. 3*; en dienende, gedeeltelyk tot vastmaking des voorbeschreeven Bands, gedeeltelyk ter inlaating van het vierde stuk. Dit stuk, *D, D*, is een koperen Band, lang 8 Duimen, breed van vooren 4, en van agteren, $\frac{1}{2}$ Duim. Deszelfs dikte, die van vooren naar agteren, allengskens afneemt, bedraagt voor het meest 1, en voor het minst $\frac{1}{4}$ Lyn. Deeze Band is geboogen naar het bol-rond van het Opperhoofd. Aan deszelfs voorste einde is een kleine Spil, by *g*, in *Fig. 2* aangewezen, welke het middengat doorloopt van de Gesp. By den grond der Spil, begint eene langwerpige Spleet *b*, breed $1\frac{1}{2}$ Lyn, en lang $2\frac{1}{2}$ Duimen. Langs de buitenranden van het voorste einde deezer Band, evenwydig aan de Spleet, zyn 16 vierkante Kamtanden, 8 aan ieder zyde, die nauwkeurig met elkander overeenkoomen, en hier by *i, i*, slegts voor de helft zichtbaar zyn. Het einde deezes Bands eindelyk, dat aan het Agterhoofd beantwoord, is bedeed met verscheiden gaatjes, groot genoeg om eene Naald door te laten, ter vasthegting eens Lints, breed 1 Duim, en lang 10 Duimen. — Het vyfde stuk, *k*, van Koper gemaakt, is lang 14 Lynen, breed 3 Lynen, dik 1 Lyn. Zyne beide einden zyn omgerond, en draagen elk een kleine graat, die boven derzelver oppervlakten $1\frac{1}{2}$ Lyn uitspringen. In het midden van dit Stuk, is eene opening van $1\frac{1}{2}$ Lyn Diameter. Door deeze opening gaan de beide einden van eenen Koperen draad, dermaaten geboogen, dat dezelve een Ring maakt *l*, groot genoeg om het einde der opheffende Boom door te laten. De beide einden van dit Koperdraad, worden binnenwaards indervoegen omgeslagen, datze ditzelfde vyfde Stuk ondersteunen. De Ring moet in deszelfs gat, gemaklyk kunnen draaien.

Fig. 2.

PLAAT
10.

Het zelfde Werktuig, in gelyke omftandigheid, gezien van ter zyden.

Dezelfde Letters, wyzen dezelfde Deelen aan als in de vorige Afbeelding. Dezulke, die daar in, geheel niet, of niet klaar genoeg te zien zyn, worden hier, meer byzonder aangewezen.

E, E, Is het vervolg van deszelfs Boom, waarin, by *m*, *m*, zes vierkante Kamtanden zyn, ter ontvanging van den Ring *l*, Fig. 1.

F, F, Zyn de 8 Tanden ter regter zyde, van het vierde Stuk; en G, G, het regter einde van het Lint *f*, Fig. 1, gaande door de overéénftemmende Gefp.

H, H, Is een zyden Lint, in lengte overéénkomende met tweemaal de omtrek van het Hoofd; gaande over de Muts; en na twee omgangen vast gefpeld aan het Agterhoofd, hier ter regterzyde verbeeld by *n*.

Fig. 3.

Is de meergemelde dubbele Gefp: *p*, *p*, *p*, *p*, deszelfs vier Tongen: *q*. de opening in de Middenplaat, welke laafte 10 Lynen lang, en 8 breed moet zyn. De lengte der Gespen, *r*, *r*, *r*, *r*, moet iets meerder zyn, dan de breedte is van het Lint, Fig. 1, *f*, en *s*, Fig. 2.

By den aanleg deezer Werktuigs, moeten de volgende byzonderheden in agt genomen worden.

Het Keurslyf in de eerste plaats aangedaan zynde, wordt niet vaster gereegen, dan zoo veel zonder eenig ongemak gefchieden kan. Men plaatft als dan, dat gedeelte van het Werktuig, 't welk men den naam kan geeven van het *Hoofdstel*, om dat het zig geheel bepaald tot het Hoofd. De Muts naamlyk van dit gedeelte, wordt wel diep, glad, en effen op het Hoofd gezet, dog zoo, dat deszelfs randen, over de Oogen, en rondöm het Hoofd, nederhangen. Men legt vervolgens de Linnen Band onder de zoo lang omgeflogen randen der Muts, om het Hoofd, doende dezelve agter langs de Ooren opklimmen, om deszelfs beide einden, door de Knoopsgaten van de Muts te brengen, en de geheele Band, door middel der Gespen, aan te fluiten.

De Koperen band, en het dwarsplaatje, dat de Ring draagt, moeten veréénigt zyn met elkander, voor en alëer ze verbonden worden, met de overige deelen van het Hoofdstel. Ten deezen einde, fteekt men de Ring door de spleet van den Beugel; men plaatft de twee graatjes tuffchen twee overéénftemmende Kammen; men doet het voorfte einde des Koperen Beugels, onder de middenplaat.

plaat der Gespen doorgaan, tot de Spil valt in deszelfs opening; men omringt vervolgens, over de Muts, op de te vooren gemelde wyze, het Hoofd, met den zyden Band; en bepaald daar onder, ter plaatze van het Agterhoofd, het midden des bands welke aan den Beugel gehegt is; slaat het einde deezer laaste band opwaards; en speld dezelve, van buiten vast aan de Muts, op de wyze, als by *t*, *Fig. 1.* is aangewezen: eindelyk, slaat men de randen der Muts, zonder het Voorhoofd te veel te ontblooten, opwaards, en bevestigt dezelve hier en daar met Spelden. — Dit alles gedaan, en den aanleg van het Hoofdstel voltooid zynde, schuift men de opligtende Boom des Werktuigs, in de Beugels van het Rugplaatje, zoo verre naar beneden, dat deszelfs bovenste en boogwyze gedeelte, den top des Hoofds aanraake, en steekt het einde van dit zelfde Deel in den Ring te vooren beschreeven, doende dien Ring vallen tusschen twee Tanden van derzelve bovenrand. Men schuift hier na, de meergemelde Boom zoo veel opwaards, als men ter regting van het Hoofd noodig oordeeld, en niet meer dan den Lyder verdragen kan zonder merklyk ongemak; dewyl men altoos meester is, om deeze regting in vervolg van Tyd, en als by trappen te vermeederen.

PLAAT
10.

E L F D E P L A A T.

Fig. 1.

Het *Werktuig des Heeren LABEE*, ter regting der scheefstaande Voeten van jonge Kinderen. — *A*, is een dun Lindenhouten Plankje, in grootte na genoeg gelyk aan den Voetzool, en van agteren bepaald door eene opstaande rand *a*, gemaakt van dun Koper, ter steuning van den Hiel. — *B*, *B*, zyn twee smalle, regt opgaande Spalkjes van het zelfde Hout, in lengte beantwoordende aan het Been; en door middel van een smal koperen dwerssch Styltje, by *b*, *b*, gesteecken in een Koperen schuif, geplaatst aan de benedenste oppervlakte van het Voetstuk, op de hoogte der Enklauwen. — *C*, *C*, *C*, Is eene smalle Beugel van geel Koper, met zyn eene einde geklonken langs de geheele breedte der onderste oppervlakte van voorgemeld Voetstuk, op een kleinen afstand van het Schuifje, naar de Voorzyde.

Fig. 2.

Is hetzelfde Werktuig, gezien van onderen, ter duidelyker bevatting van deszelfs saamenstel. — *D*, is het vastgeklonken gedeelte des Beugels, in zyne gantsche

PLAAT II. uitgestrektheid: *c*, deszelfs tegengestelde, en losse uiteinde. *E*, verbeeld het Koperen schuifje, ter inlaating van de dwersstyltjes der Spalken by *d*, *d*; en *e*, *e*, *e*, de ingesneden, omgeboogen, en vastgeklonken gedeelten van het Koperen Hielstuk *a*, *Fig. 1*.

Fig. 3.

Is een der Spalkjes van dit Werktuig, gezien van ter zyden. *f*, *f*, Het Koperen dwersstyltje, dat altoos in lengte moet beantwoorden aan de helft der lengte van het Schuifje, *E*, *Fig. 2*; en iets, dog weinig minder breedte hebben.

De aanleg van dit Werktuig, dat inderdaad in verscheiden gevallen uitmuntende diensten gedaan heeft, geschied dus. — De Voet, in den best mooglyken stand gebragt en gehouden zynde, wordt te gelyk met het Been, omwonden met een smal, lang, en nauwkeurig aangelegd Windzel; of liever met een stuk Kleefpleister, lang en breed genoeg, om beide deeze Deelen in te sluiten; en ter weërzyden tot omtrent derzelver midden, aan veele hoofden, die nauwkeurig aan elkander beantwoorden, ingesneden. Men plaatst de Voet op het Voetstuk des Werktuigs, de Hiel doende steunen tegen den rand *a*, *Fig. 1*; en sluite den Beugel om den rug van den Voet (na dat men 'er zoo veel heeft afgesneden, als dezelve te lang mogt zyn) door middel eener andere strook Kleefpleister, iets breeder dan deeze, — Vervolgens, steekt men de dwersch styltjes der spalken, ter weërzyden in het schuifje, en bevestigt alles met een Windzel, dat van den wortel der Teenen, tot aan de Knie opklimt, en matig vast wordt aangeslooten.

Fig. 4.

Het *Klompje des Heeren VAN DER HAAR*, verbeeld naa een Model, door zyn Ed: zelve, my geschonken. Het is, even als het voörige Werktuig, uit Lindenhout gemaakt, en tot hetzelfde gebruik verörend. — *F*, *F*, *F*, is het Lighaam des Werktuigs, nauwkeurig uitgesneden naar de gedaante van den Voet, zoo van boven als van onderen, van binnen als van buiten. — *G*, *G*, is deszelfs regt op gaand en Spalkwys gedeelte, dat in lengte en breedte, met de zydelyke vlakke des Beens moet overëenkoomen, en aan de zyde *g* die naar het Been is toegekeerd, lugtig hol zyn.

Dit Werktuig, wordt, na eene gelyke voorbereiding, op dezelfde wyze aangelegt, en bevestigt. — Gelyk het spalkwyse gedeelte, altoos moet rusten tegen de buiten of binnenzijde van het Been, is het noodig, dat men alle deelen van het Klomp-

Klompje op eene verschillende wyze regele, naar dat het of aan het regter, of PLAAT
II.
aan het linker Been, moet gebruikt worden.

Fig. 5.

Het *Werktuig*. §. 1552. aangepreezen, ter vasthouding eener Schryfpen, gezien van deszelfs buitenste gedeelte. — *H*, Is een Koper plaatje, naar den rug des Duims geboogen, voorzien by *h* met een Haakje, en verëenigt ter eener zyde, met den lederen Riem, *I*, *I*; ter anderer, door middel van het loodlynig Staafje *i*, dat aan de buitenzyde een dwersch Schroefje draagt, met den Koperen Spiraal veer *K*; die wederom aan zyn einde *k*, een dergelyk Schroefje inlaat, van, en hier door verëenigt is met, den Koperen Buis *L*, die by *l*, *l*, rondöm digt, by *m*, open is; en van binnen eene Veer heeft, welke door het Schroefje *n*, willekeurig verwyderd wordt van de binnenste oppervlakte der zyde *o*, *o*, van dit Buisje. — Deszelfs binnen Veer, die ter bepaaling der Schryfpen diend, ziet men.

Fig. 6.

By *M*; die de open zyde vertoond van voorgemeld Buisje, en wordt vast geklonken by *p*, *Fig. 5*.

Dit *Werktuig*, moet, ten opzichte van alle deszelfs deelen, nauwkeurig in grootte beantwoorden aan de Afbeelding. — Het wordt gebruikt in deezer voegen. — Men legt het plaatje *H*, op den rug van het overgebleven gedeelte des Duims van den regter Hand, en bevestigt hetzelfde, door den Riem *I*, met deeze of gene zyner gaatjes vast te maaken aan het Haakje *h*; zoo, dat de Spiraalveer *K*, en het Buisje *L*, gekeerd zyn naar de zyde des Wysvingers. Men steekt in het voorste einde van het Buisje, dat is te zeggen, in dat einde, welk het verst verwydert is van de Schroef *n*, de Steel eener ontveerde Schryfpen; doet dezelve daar in, zoo veel agterwaards opklimmen als noodig is; bevestigt ze alsdan door het toedraaijen van het voorgemelde Schroefje, en de speeling der binnen Veer, hier van afhanglyk; en bestierd de Schaft en punt der Pen, met den wys- en midden Vinger, naar genoegen.

De uitvinder van dit Konstuig is de Yzerfmit . . . *WIER*, hier ter Stede, in de Kerkstraat, by de Lydschegraft woonagtig. De Afbeelding is vervaardigt naar een Model, gemaakt door . . . *ELWE*, ter zelfder plaatze, in de Barnesteeg gehuisvest; en die daarin eenige veranderingen gemaakt heeft, welke ik
met

PLAAT 12. met regt, den naam mag geeven van verbeteringen. — Ik hebbe nogthans, het oorspronglyke doen gebruiken, door een zeer aanzienlyk Man, uit eene nabuurige Stad, in een zeer zeldzaam geval, met den best mooglyken uitflag; en verbeelde my dlt te moeten melden, om de verdienste des uitvinders niet te bena-deelen.

T W A A L F D E P L A A T.

Fig. 1.

De *Gehoor-trommel*, voor Hardhoorenden. — A, Deszelfs Lighaam. B, Het Dekzel, dat doorgaans by wyze van Bloemwerk is doorgeslagen. C, De Pyp, die by *a*, door middel van een Schroefwys einde, verëenigt is met den Trommel, en by *b*, eindigt met een olyfwys knopje dat vertind is, en by het gebruik gesteecken wordt in den Gehoorweg. — Alle deeze deelen van het Werktuig, zyn gemaakt van rood Koper. Het Handvatzel D is Hout, en wordt by *c* vast geschroefd aan den bodem des Trommels. — De Trommel is hoog 4 Duimen; van dezelfde lengte is ook het Handvatzel. — Het Dekzel, dat of vlak, of een weinig hol is, houd over kruis 6 Duimen: gelyke maat heeft het bovenste gedeelte van den Trommel, die van onderen eenigzints enger is. — De geheele lengte der Pyp is 13 Duimen, waar van 2 begreepen zyn tuschen *b*, en *d*.

Fig. 2.

De *Gehoor- of Spreek-trompet van NUCK*. — E, Deszelfs wyde en Trompetsywyse einde, ter onderschepping van het geluid. — F, F, F, Drie en een halve Slingers, ter verlenging van den weg, welke de bewooge Lugt moet afleggen eer ze valdt op het Trommelvlies, en ter versterking van het zelfde geluid. G, Het nauwe einde, dat in den Gehoorweg gesteecken wordt. — H, Het Handvatzel, vast geschroeft, of op eenige andere wyze gehegt, aan het Lighaam des Werktuigs, by *e*. — De Trompet bestaat geheel uit Koper: het Handvatzel is Hout.

Fig. 3.

Het *Werktuig van DEKKER*, voor Hardhoorende, dat onder de Paruik of Muts kan verborgen worden. — I, I, Het Lighaam des Werktuigs, van Y voor gemaakt, en in omtrek gelyk aan de Oorschelp — K, Het Pypje, uit dezelfde stof gedraaid; van binnen gemaakt als een Slekkenhuis; voorzien by *f*, met

met eene zeer kleine opening, het einde van deszelfs holte, en ingelaaten op de wyze van g, g, g, in eene opening van het Lighaam. — *h, h*, Zyn twee Linden, of Zyden bandjes, met dewelke het aangelegde Werktuig, om den Wortel des Oorschelps wordt vast gemaakt.

PLAAT
12

Fig. 4.

De *Konstneus van ULHOORN*, gezien van deszelfs binnenste of holle Zyde, en uit Lindenhout gemaakt. — *L, L*. Is eene staale Veer, geschroefd by *h*, op eene kleine verhevenheid van de binnenste oppervlakte des Werktuigs. — Dewyl deeze Veer diend, om het aangelegde Werktuig in zyne plaats te houden, en deszelfs vleugels ten dien einde moeten rusten tegen de zywenden der Neusholte van binnen, is het nodig, dat dezelve niet zeer styf zy, ter vermyding van het kwetsen des Snotvlies. — De Zyranden, en den bovenrand, *i, i, i*, moeten nauwkeurig beäntwoorden aan de Randen van den verloren Neus, en dezelfde verhevenheden en holten hebben als deezen, maar, in eenen tegengestelden zin. — Het geheel moet ligt zyn, en van buiten geschilderd worden, overéénkomftig met de natuurlyke kleur van het Aangezigt.

Fig. 5.

De *Konstneus*, door den Heere CAMPER afgebeeld en beschreeven, gezien van deszelfs agterfte gedeelte *M, N, O, P*, en even als de voorige, van Lindenhout gemaakt, en geschilderd. In deszelfs holte by *R*, is een Zilver klammetje met een beweegbaar Ringetje, aan hetwelke gehegt wordt een gewaft zyde Koortje *S*, dat by het aanleggen deezes Werktuigs om een der Snytanden wordt vast gemaakt. — Men begrypt naamlyk, dat het verlies van den Neus waarin dit Werktuig is aangepreezen, gepaart gaat met een verlies des Verhemelte, 't gene deeze vasthegting, die anders onmöoglyk zyn zoude, gemaklyk maakt.

Fig. 6.


De *Stopper des Verhemelte*, door denzelfden Hoogleeraar gemeen gemaakt, en in hetzelfde geval aangepreezen. — *T*, Een Sponsje, vast gemaakt aan een ovaal stukje Kalfsleer *U, U*, en geschikt na de wydte en gedaante van de Neusgaten. — *V*. Is een langägtig Plaatje, met een Sponsje *W*, bekleed; gemaakt uit een Schubbe van een Schildpad; gehegt aan het Kalfsleertje; en dienende in plaats van de Huig.

PLAAT

12.

Fig. 7.

De *Kin. of liever Halsband van PRIOU*, ter ophouding van het Hoofd, door deeze of gene oorzaak, te veel vooröverhangende. X, De Halsband zelve, bestaande uit een plat, en half rond geboogen Koperdraad, gedekt met Katoen wol, en stevig omkleed met Fluweel. Aan deszelfs einden *k, k*, zyn gehegt twee smalle zyde Linten, *l, l*, met dewelke dezelve om den Hals wordt vastgehouden, zoo dat de hoeken der Onderkaak, eenigzints rusten op zynen bovenrand. — Y. Y. zyn twee Koperdraaden, slangwyze geboogen; vereenigt met den Halsband; op eenen zekeren afstand van elkander gehouden door de Dwerschplaatjes, *m, m*, en ingelaaten in een Schuif, gemaakt aan het bovenste en voorste gedeelte van het Borststuk des Keurslyfs, door middel der twee krulwyze einden *n, n*.



BESCHRYVING

EN

AFBEELDING

DER

IN DIT DEEL AANGEPREEZEN

VERBANDEN.

BESCHRYVING

DE

AFBEELDING

DE

IN DIT DEEL AANGEPREZEN

VERBANDEN.

B E S C H R Y V I N G

E N

A F B E E L D I N G

D E R

IN DIT DEEL AANGEPREEZEN

V E R B A N D E N.



D E R T I E N D E P L A A T.

Fig. I.

De Zeshoofdige Hoofdband, de Band van GALENUS, of de Zeshoofdige Band der Armen.

Men maakt dezelve uit een stuk Linnen, 1 El lang, $\frac{1}{2}$ El breed, of zoo groot als noodig is, om het gantsche Hoofd te bedekken; dat is, overeenkomstig met de uitgestrektheid van dat Deel zelve. — Dit Linnen wordt dermaaten gevouwen, dat het naar de breedte in drie gelyke deelen kan verdeeld worden, en men snyd deeze deelen meer of minder tot by het midden in, zoo dat 'er aan ieder zyde drie hoofden voortkoomen, nauwkeurig gelyk aan elkanderen. — Dus bereid, plaatst men het zelve op den rug der handen, en legt het indervoegen om het

PLAAT
13.

Hoofd, dat zyn midden, aan deszelfs bovenste gedeelte beäntwoord, en de zes hoofden ter zyden nederhangen. — De twee agterste hoofden, welkers randen men alvorens een weinig binnenwaards omflaat, worden als dan geleid naar het Voorhoofd, onmiddelyk boven de Wenkbrauwen, en ter plaatze alwaar ze elkander ontmoeten, op eene onderliggende Drukdoek, die de gantsche uitgebreidheid van het bovenste gedeelte des Hoofds beslaat, vast gespeld. — Vervolgens brengt men de twee voorste hoofden, derzelver randen even dus omgeslagen, agterwaards, en speld ze op elkander vast aan het Agterhoofd. — De middenste hoofden *a, a*, eindelyk, welke tot hier toe, ter gemaklyker aanleg der voorige, opwaards omgeslagen en vast gehouden waren, worden over de Ooren, gevoerd naar beneden, en onder de Kin met elkanderen veréénigt door een Speld, een Strikknoop, of een omgelegd linden Bandje: de randen van deeze moeten even als die der voorigen, een weinig binnenwaards worden omgeslagen.

Van alle Hoofdverbanden, by de Schryvers voorkoomende, is dit het eenvoudigste, en gemaklykste. Het voldoet in allerlei gevallen van Hoofdwonden, aan alle mooglyke uitzigten des Heelmeeesters; vooräl in den Zomer, of in heete Lugtstreeken.

Fig. 2.

De *Omgeslagen Hoofdband*, de *Hoofdband van HIPPOCRATES*, of de *Myterwyze Hoofdband*. — Deeze bestaat uit een Windzel, lang 10 Ellen, meer of minder, naar de grootte van het Hoofd; breed van 2 tot 3 dwersche Vingeren; en aan twee gelyke hoofden opgerold. — Deszelfs aanleg is deeze. — Men plaatst het midden des Windzels, onmiddelyk boven de Wenkbrauwen, tegen het midden van het Voorhoofd, en leid byde hoofden, over de Ooren, agterwaards naar den Nek, alwaar dezelve van hand veränderd, en stevig aangeslooten worden. — Een derzelver, onverschillig welke, dog altoos de onderste, slaat men over de andere opwaards, en geleid deeze over den Pylnaad en het midden des Voorhoofds, tot aan den wortel van den Neus; terwyl de andere, kringwys voortlopende, ter aangewezen plaatze, dwersch over dezelve heengaat, tot omtrent het tegengestelde Oor, en daar een kleine wyl wordt vastgehouden. — Het eerste hoofd, andermaal opwaards omgeslagen, wordt nadermaaten naar den Nek gevoerd, dat het, of ter regter, of ter linker zyde, een gedeelte bedekt van den slag die over den Pylnaad loopt; intusschen dat het laatste,

laaste, zynen kringwyzenloop vervolgende, ter deezer plaatze (in den Nek naamlyk) PLAAT
13.
wederom over dezelve geleid, stevig aangeslooten, en aan het tegengestelde Oor vastgehouden wordt. — Als nu, staat men het zelfde eerste Hoofd, voor de derdemaal van Hand verändert, indervoegen op- en voorwaards, dat het ter anderer zyde een gedeelte bedekt van den slag die over den Pylnaad loopt, gelyk aan de vorige en brengtze op nieuws tot aan den Neuswortel; terwyl het laaste, zynen kringwyzen loop behoudende, van vooren daaröver wederöm op dezelfde wyze heen gaat, en voor een oogenblik gehouden wordt. — Men vervolgt naderhand, met Meloensnedege slagen, *b, b, b, b, b, b*, ten opzichte van het eerste, en met kringwyze, *c, c, c*, ten opzichte van het tweede hoofd, tot zoo lange, dat het gantsche Hoofd gedekt is; en eindigt met twee regtlynige *d, d*, en een derde *e*, alle van vooren en agteren gedekt met een kringwyze.

Fig. 3.

Het *Zon-gelyke Verband*, voor het stuiten des Bloedvliets eener geöpende Slaapslagader. — Dit bestaat uit een Windzel, op twee hoofden opgerold, lang 6 Ellen; en breed, niet meer dan twee dwersche Vingeren. Het wordt dus aangelegt. — Men legt het midden des Windzels, tegen die slaap, welke tegen de gekwetste over staat, en maakt een Kringwyze omgang. Ter plaatze der Wonde, doet men de hoofden van Hand veranderen, en maakt daar mede, ter gelyker tyd een Pakkers Knoop *f*, op de onderliggende trapwyze Drukdoek *g, g, g*. — Met het een deezer hoofden, *h*, gaat men onder de Kin door, en met het andere maakt men de slag *i*, over het Hoofd. — Hier na, de beide Hoofden van het Windzel elkander ontmoetende aan de gezonde Slaap, maakt men met dezelve, hier ter plaatze een gelyke Knoop, brengt het eene Hoofd van vooren over het Voorhoofd *k*; het andere over het Opperhoofd, *l*, en maakt, ter zyden der vorige Knoop, eene andere, *m*. — Eindelyk, doet men ter aansluiting van alles, zoo veel de uitgestrektheid van het Windzel zulks toelaat, eenige Kringwyze omgangen, alle gaande over voorgemelden Drukdoek.

Dit Verband, van VERDUC uitgedagt, is door DE BAS verbeterd, en het beste van alle, welke in dit geval zyn voorgeschreeven.

Fig. 4.

Het *Verband van DEIDIER*, ter stemping van den Bloedvliet, veröorzaakt door eene kwetsing der Halsvaten. — Het zelve bestaat uit een strook Linnen, lang 1 El,

PLAAT
13.

El, breed 4 dwersche Vingeren, naar zyne lengte drie dubbel opgevouwen; en uit een Windzel, dat 3 Vingeren breed, en 7 Ellen lang is. — Men maakt met het laatste twee of drie slagen om den Hals, over den aangelegden toefstet; en plaatst het midden van het eerste, op den top des Hoofds, doende deszelfs beide einden zydwaards nederhangen. — Vervolgens, bevestigt men dat gedeelte deezer einden, dat aan de plaats der Wonde ter eener zyde beäntwoord, en ter anderer zyde daar juist tegen over vald, door een vierde rondgaande slag van het Windzel; en slaat beide einden, eerst opwaards, dan weder nederwaards, dezelve telkens bevestigende met een kringwyze slag des Windzels; en vervolgt hier mede, zoo dikmaalen, en tot zoo lange, dat het een en ander ten einde geloopt is. *n*, Verbeeld dat gedeelte van het *Longuet*, welk over het Hoofd gaat: *o*, de Kringwyze omgangen van het Windzel: *p*, de plaats ter linkerzyde, waar de omgekeerde slagen vallen van het eerste.

Fig. 5.

De *Slingerband* voor den *Neus*, waar in twee Gaten zyn *r*, *r*, die met de *Neus* gaten moeten overéén stemmen. — De vier Hoofden van deezen Band, worden by den aanleg, geleid over de Wangen, en aan de Muts vastgespeld.

Fig. 6.

Het *Mombakkes*, dienende ter bedekking van het gantsche Aangezigt, als het zelve voor het meeste gedeelte gebrand, of op eene andere wyze beschadigt is. — Dit Verband wordt gemaakt uit een stuk Linnen, eene halve Elle lang, en zoo breed als de lengte is van het aangezigt; aan ieder zyde, tot op het midden, in drie Hoofden *s*, *s*, *s*, *s*, *s*, *s*, ingesneeden. De bovenste deezer Hoofden moeten de breedste zyn; de middenste, en de onderste, eene gelyke breedte hebben. Tusschen de vier eerste Hoofden, moeten in het midden twee gaten zyn, *t*, *t*, voor de Oogen; tusschen de middenste en de laatste eene kleine dwersche opening *v*, voor den *Neus*; en onder deeze eene grootere dergelyke, *w*, voor den Mond. — Al de Hoofden van dit Verband, moeten by den aanleg, zydwaards geleid worden naar het Agterhoofd, en aldaar met Spelden verzeekert.

VEERTIENDE PLAAT.

PLAAT

14.

Fig. 1.

Het *Verband des Lighaams met den Schouderband*. — Dit bestaat uit een gewoon Servet, of een stuk sterk Linnen, drie of vier dubbel gevouwen, in breedte overéénkoomende met de lengte der Borst of des Buiks, en zoo lang, dat het $1\frac{1}{2}$ omgang kan maaken, om het Lighaam; gelyk ook, uit een strook Linnen, agt dwersche Vingeren breed, en $1\frac{1}{2}$ El lang, van zyn einde, tot in het midden, aan twee Hoofden ingesneedden. — Het eerste gedeelte des Verbands wordt aangelegt op de wyze, *w, w*, en, van stee tot stee, verzekert met spelden. Aan het agterste gedeelte van dit, wordt vastgespeld, het niet ingesneden einde van het tweede gedeelte: de twee Hoofden van het andere einde, leid men dermaaten over de Schouders naar vooren, dat ze elkander kruisschen by *x*, en by *y, y*, met binnenwaards omgeslagen einden kunnen worden vastgespeld.

Fig. 2.

Het *Sterverband voor de Breuken van het Schouderblad*. — Dit wordt gemaakt met een Windzel, vier Vingeren breed, 10 Ellen lang, en aan een Hoofd opgerold. Deszelfs aanleg is deeze. — Men plaatst het einde onder den Oxel der gezonde zyde, en gaat schuins opwaards over den Rug, naar den Schoudertop der beleedigde: van hier, daald men voorwaards neder tot onder den Oxel, en klimt schuins opwaards over den Rug naar den tegengestelden Schoudertop, een Kruis maakende met den vorigen omgang, tusschen de Schouderbladen: op gelyke wyze doet men nog drie of vier omgangen van de eene zyde naar de andere, alle elkander kruissende by *z, z*: eindelyk, geleid men het Windzel, over den gezonden Schouder, langs het voorste van de Borst, en den Oxel der beleedigde zyde, over den laaften Schoudertop; en vervolgens weder, langs de Borst tot onder den gezonden Oxel, doende het zelve eindigen met één of meer Kringwyze slagen, op de wyze van *a*, rondom het Lighaam.

Fig. 3.

Het *Koornäirverband voor de Ontwrigting des Opperarms, en de breuk van den Schoudertop*. — Hier toe wordt verëischt een Windzel, dat 12 Ellen lang, 3 Vingeren breed, en aan één Hoofd opgerold is. — Men begint deszelfs aanleg, van vooren onder den gezonden Oxel, gaat schuins opwaards langs de Borst, naar

PLAAT
15.

den beleedigden Schouder, dezelve indervoegen omwindende, dat op deszelfs top een kruis gemaakt wodt; waar na men, langs den Rug, schuins nedergaande, de omwinding vervolgt tot daar dezelve begonnen was; dat is, tot onder den Oxel der gezonde zyde. — Dergelyke flagen maakt men vervolgens nog drie maalen, al oos zorg draagende, datze elkander kruisfchen by *b*, *b*, en aldaar eene nederdaalende *Spica* maaken; waar na, het Windzel ten einde loopende, één of twee flagen daar mede nog gedaan worden over den gezonden Schouder *c*, voor men het verzeekert met spelden. — Men moet wel aanmerken, dat al de flagen van dit Windzel, ten opzichte haarer breedte, elkander voor de helft of althans voor een derde bedekken moeten, op dat de eene slag de andere vast houde, en den gantschen Schouder gelykelyk gesteund worde.

Fig. 4.

De *Armband*, ter ondersteuning van den Onderarm, in verscheiden gelegenheden. — Deeze is niet anders, dan een Servet, een Zakdoek, of een vierkant stuk Linnen, driehoekig gevouwen, en dus aangelegt, dat de geboogen Onderarm, op deszelfs midden rustende by *d*, de eene hoek *e*, langs het gezonde zydelyke deel van den Hals gevoerd, en agter op den Schouder, aan de onderklederen wordt vastgespeld, terwyl de andere hoek *f*, op dezelfde wyze gelegd en bevestigd wordt aan de ongestelde zyde; en de laatste op de wyze van *g*, omgeslagen, aan de tweede wordt vast gespeld. — Dikmaalen is het goed, dat men de twee eerste hoeken, op elkander spelde by *b*, en voorál by Kinderen, of onhandelbaare Menschen.

VYFTIENDE PLAAT.

Het Verband van BRASDOR voor de Breuken van het Sleutelbeen. — *A, A*, Is een soort van Corset, bestaande uit twee stukken, die geplaatst moeten worden, agter tegen de Schouderbladen, en beiden veréénigt zyn met een Schouderband, *B, B*. Elk der stukken *A, A*, bestaat uit een dubbel grof en sterk Weefzel, bekleed met Zeemleder. Zy zyn hoog 6, en breed 4 Duimen, de maaten naamlyk bepaald voor Volwassenen, en van binnen Kussenswyze gevuld: De rand met welke zy elkander aanraaken, is doorboord met veele Vetergaatjes. De Schouderstukken zyn gemaakt uit een dubbele band van het zelfde Leder,

van

van binnen zagtelyk opgevuld: zy zyn daarenboven versterkt door een lederen Riem, waar van het eene einde bevat wordt, door den buitenrand der Rugstukken, het andere C, C. ongedekt, en doorflagen is met veele gaatjes. Digt by ieder onderrand eindelyk der Rugstukken, zyn geplaatst twee Gespen D, D, gekeerd in eenen schuinzen stand naar beneden, en overéénkomstig in grootte met de breedte der Riemen.

De Aanleg deezer Verbands blykt van zelve uit de Afbeelding; vooräl, wanneer men tevens agt geeft op den loop der Schouderstukken van vooren, by E, E.

PLAAT

15

ZESTIENDE PLAAT.

Fig. 1.

Het *Uitdryvend Verband des Heeren THEDEN*, voor den Arm, en opzigtelyk alleen tot den aanleg der Windzels, welke hetzelfde saamenstellen; vermits deszelfs overige deelen, de Drukdoeken naamlyk, naar eisch der gevallen moeten veranderd worden, en voor geene algemeene beschryving vatbaar zyn.

Hetzelve bestaat uit vyf Windzels, die elk, omtrent eene Elle lang, en een Vinger breed zyn; gelyk ook, uit een Windzel van 12 tot 18 Ellen lengte, en ter breedte van 2, of na genoeg, 3 dwersche Vingeren. Men legt het aan op deeze wyze. — Met elk der vyf eerste Windzels, wordt een byzondere Vinger dermaaten bewonden, dat men eerst twee kringwyze omgangen maakt rondöm den top, welke elkander nauwkeurig bedekken; en vervolgt met krulwyze, die telkens ter helft van de breedte des Windzels, over elkander liggen, tot aan de Nahand, over welkers rug, het einde van het Windzel uitgebreid, en door een Helper bevestigd wordt. — Als alle Vingers, de Duim niet uitgezondert, dermaaten, dat is op de wyze van F, F, bewonden zyn, maakt men dwersch over de Nahand, by den wortel der Vingeren, met het groote Windzel, twee kringwyze omgangen, G, G, op dezelfde wyze geschikt als die der Vingeren; en gaat, met krulwyze, die insgelyks voor de helft elkanderen bedekken, tot aan den vouw des Elboogs. Hier ter plaatze, maakt men, dan eens eenige kruiswyze, dan eens, gelyk hier by H verbeeld is, één of meer dwersche flagen, ter bedekking van den punt des Elboogs; en klimt weder met krulwyze flagen op, tot den Schouder; waar na het vervolg des Windzels, over dit Deel I, I, langs den tegengestelden Oxel, Borst, en Rug, eens of meermaalen geleid zynde, ter plaatze daar het eindigt wordt vast gespeld.

PLAAT
16.

Hetzelfde Verband, welks ontwikkeling verhoed wordt, door alle slagen van het Windzel aan een te naaijen, of met spelden te bevestigen, moet aan de onderste Ledemaaten, door eenige slagen om het Bekken, gesteund worden.

Fig. 2.

De *Verëenigende band der langwerpige Wonden*. — Deeze is in het gestelde geval, betreklyk tot alle Deelen van het Lighaam zonder onderscheid, maar vooräl tot de Ledemaaten; en wordt gemaakt met een Windzel, aan twee hoofden, K, K, opgerold, dat in het midden eene langwerpige opening *a*, heeft, en welks lengte en breedte niet wel kan bepaald worden, om dat dezelve verschillen naar de verschillende diktens en lengtens der Deelen zelve. — Den aanleg deezer Verbands wordt begonnen aan het tegenöverstaande gedeelte van de Wonde, zorg dragende, dat de midden-spleet valle op deeze. — Men doet één der hoofden, en wel bepaaldelyk dat, 't welk tegen die spleet overstaat, van binnen, buitenwaards door dezelve heen gaan; sluite beide hoofden aan zoo veel noodig is, en bevestige deeze eerste slag met twee of meer kringwyze omgangen, die dezelve nauwkeurig bedekken.

Fig. 3.

Het *Verëenigend Verband van PETIT*, voor de breuk der Pees van *Achilles*, zoo veel mooglyk zy, gelyk gemaakt aan de Muil van *MONROO*, die in de volgende Plaat wordt afgebeeld. — Dit Verband bestaat uit eene driedubbele Longuet, lang 3 Ellen, breed omtrent 3 dwersche Vingeren; uit een Windzel dat twee Vingeren breed, en ruim 4 Ellen lang is; gelyk ook uit een ander van dezelfde breedte, en ter lengte van 8 Ellen. De aanleg deezer stukken is de volgende, na dat eerst de Knie stomphoekig geboogen en de Voet uitgestrekt is. — Men vouwd de Longuet naar zyne lengte in twee gelyke deelen, om het midden te vinden zyner uitgestrektheid. — Men legt dezelve langs het agterste gedeelte des Beens, en langs den Voetzool, dermaaten aan, dat de middenvouw beäntwoord aan den wortel der Teenen, en doet de eene helft afvallen, terwyl de andere, dat is, die onmiddelyk de Huid aanraakt, zoo boven als onder, door een Helper wordt vast gehouden. — Hier na bevestigt men het onderste gedeelte deezer helft tegen den Voetzool, door eenige kringwyze slagen met het kortste Windzel, die van den wortel der Teenen, tot omtrent het gewrigt van den Voorvoet zig uitstrekken; slaat het onderste gedeelte van

van de andere helft des Longuets over deeze opwaards; en bedekt met het overige deszelfde Windzels, ook dit gedeelte, met gelyke omwindingen, maar die nu nederdaalen naar den wortel der Teenen. — Men legt eindelyk, het geheele afgevallen gedeelte van het meergemeld Longuet, nauwkeurig op het andere; strekt met beide, de Voet zoo veel uit als den Lyder zonder merklyk ongemak verdraagen kan; bevestigt de bovenste deelen, juist langs het midden van de Kuit, door eenige kringwyze omgangen rondom het Been te doen met het langste Windzel, dezelve beginnende onmiddelyk beneden het Kniegewrigt, en eindigende aan het onderste gedeelte van de Kuit; slaat de bovenste einden van het Longuet, die ik onderstelle, dat tot hier toe altoos door een Helper zyn vast gehouden, over deeze omgangen nederwaards; en bevestigt ten laasten ook deeze, door opklimmende kringwyze slagen, met het overblyvend gedeelte deszelfden Windzels. — In deezervoegen kreigt het geheele verband de gedaante van K, L, M, en werkt vry nauwkeurig op dezelfde wyze als de Muil van MONROO, gevende daarënboven by L, eenen volkoomen toegang tot de plaats der beleediging. — Men moet wel aanmerken, dat men hetzelfde niet al te fluitend aanlegge, vermits de Breuk der Pees van *Achilles* doorgaans vergezeld gaat van Uitstorting, die gevolgt wordt van Zwelling, en zelden anders dan eene middenmaatige sluiting toelaat.

PLAAT
17.

Z E V E N T I E N D E P L A A T.

De Muil van MONROO, zoo op zig zelf, als in haaren aanleg.

Fig. 1.

Een lederen gevoerden Riem; by A, B, rondächtig uitgesneden; by C, D, E, F, voorzien met eene rye vetergaten; en by G, met een Gesp, gehegt aan een afzonderlyk riemtje. De lengte van D, E, moet overëenkomen met den omtrek van het onderste gedeelte des Dyës; van F, met die des bovenste gedeelte van het Been. De geheele breedte H, I, moet beäntwoorden aan de onderhelft, of het onderste derde deel van den Dyë, de Knieholte, en de Kuit van het lydend Voorwerp.

Fig. 2.

Een Muil, gemaakt van gevoerd Zylboek; open by K, ter doorlaating der Teenen; en by L, voorzien met een sterke lederen Riem, in breedte overëen-

Lll 3

koo.

PLAAT 17. koomende met de Gesp G, der voorige *Figuur*, en omtrent zoo lang als het Been van den Lyder.

Fig. 3.

De aanleg van beide deeze stukken aan den Voet en het Been. — M. De Muil, om den uitgestrekten Voet vast gestrikt by N. — O, Deszelfs opklimmenden Riem, met zoo veel spanning als draaglyk is, gehegt aan de gesp G, der 1. *Figuur*, hier niet zichtbaar. P, dat gedeelte van den lederen Band *Fig. 1*, dat het bovenste gedeelte van het Been influit, rondom hetzelfde toegereegen. — R, dat gedeelte van denzelfden Band, 't welk het onderste Deel van den Dye omvangt, op gelyke wyze bevestigt.

A G T T I E N D E P L A A T.

Fig. 1.

De opschortende Band des Balzaks. — Deeze wordt best gemaakt uit Bombazyn, en heeft vier hoofden; twee bovenste naamlyk, en twee onderste. — De bovenste hoofden, *a, a*, die van eene verschillende lengte, naar de verschillende dikte van het Lighaam, zyn moeten, worden kringwys geleid langs de Heupen, en dienen in de plaats van een Gordel. De twee onderste, *b, b*, die elk een Duim breed zyn, worden door het gemeenschaplyk deel *c*, by *d*, genaaid, aan het zakwys middendeel *e*, dat boven by den Gordel breed, onder smaller is, en even beneden denzelfden Gordel, eene ronde opening heeft ter doorlaating van de Roede. — Deeze hoofden, by den aanleg tusschen de Beenen doorgeleid, worden vast gemaakt door middel van linden Bandjes, die aan derzelver einden moeten gehegt zyn aan den Gordel, op de hoogte der Heupen.

Fig. 2.

Het T Verband, geschikt ter ondersteuning van de overige deelen des Verbands, in verscheiden Gebreken en Kunstbewerkingen, in den omtrek des Aars, en van de Teeldeelen. — *f, f*. De Gordel, breed 2 dwersche Vingeren, en in lengte gelyk aan den omtrek des Lighaams: deszelfs eene einde heeft 2 gaatjes, het andere 2 bandjes, door middel van welke ze wordt aangeslooten. — Aan het agter-middenste gedeelte deezes Gordels, is gehegt de strook *g*, breed omtrent 3 dwersche Vingeren; van eene, niet wel bepaalbare lengte; en, tot daár

daar ze den Aars naderd, ingesneden in twee gelyk breede hoofden, *h, h*, die by het gebruik, langs de Liefchen voorwaards opgeleid, aan den Gordel worden vast gespeld. — Het Weefzel van deezen geheelen Band, is Linnen: deszelfs twee onderscheide deelen, worden by *i*, gereegen op elkander.

PLAAT
18.

Fig. 3.

Het *Navelbreuk-verband* voor jonge Kinderen, gemaakt van een stuk welklevende, dog niet harsagtige Pleister, in lengte gelyk aan anderhalven omtrek des Lighaams, breed 4 dwersche Vingeren, en tot omtrent aan zyn midden, in 4 hoofden, *k, k, k, k*, ingesneden. — Voor den aanleg van hetzelfde, plaatst men een half bolrond kurken popje, gedoopt in hetzelfde mengzel als ik by gelegenheid der beschryving van de *Lieschbreukband* hebbe opgegeeven, op den uitpuilenden Navel, en overdekt dit met een vierkant stukje Kleefpleister. — Hier na, plaatst men het midden van den Band op de Lendenwervelen, juist tegen over den Navel, en legt eerst de twee bovenste, dan de twee onderste hoofden, dermaaten van vooren over elkander, dat het geheel een volmaakt kringswys Verband maakt, door het welke het eerst aangelegde popje gelykredig en onwankelbaar op zyne plaats bevestigd wordt.

Fig. 4.

De *Boekband*, gemaakt uit drie stukken Linnen, in lengte gelyk aan $1\frac{1}{2}$ omtrek des gebrooken Deels; in breedte beantwoordende, aan deszelfs uitgestrektheid; en in haar midden, op de wyze van *l, l*, met lugtige steken op elkander gereegen. — Elk deezer dus verëenigde stukken, snyd men ter wêerzyden, tot digt by het naaizel in tot 3 Hoofden, dog zoodanig, dat de insnydingen niet juist in eene zelfde Lyn vallen, maar door dezelve 18 ongelyke hoofden, *m, m, m, m, m, m; n, n, n, n, n, n; o, o, o, o, o, o*; gemaakt worden, op dat 'er by den aanleg, geene ruimtens tusschen dezelve zouden overblyven. — De lengten deezer stukken, daarënboven, verkleind men trapswyze, van buiten naar binnen 1 Duim, indervoegen, dat de hoofden van het eerste stuk de langste, en van het laaste, de kortste zyn.

De aanlegging van hetzelfde is deeze. — Men bevogtigt het geheel, met enkel Water, met Water en Azyn, met Water en Brandewyn, naar dat deeze of gene omstandigheden zulks eischen, en altoos, ter betere aansluiting. — Men plaatst het midden des Verbands, ten opzichte des Opperärms, aan de agterzyde; ten
aan

PLAAT 18. aanzien des Onderärms, aan de buitenzyde; met betrekking tot den Dye, aan dezelfde zyde; en ten opzigte van het Been, van onderen. — Men plaat eindelyk, alle hoofden in eene juist dwersche strekking, om het beleedigd Deel; beginnende met de binnenste ter plaatze van de Breuk; vervolgende met de overige van denzelfden rang; van die der tweede op gelyke wyze; en van de derde, ten laasten, en even dusdaanig.

Meest alle Heelmeeesters, gebruiken dit Verband alleen in saamengestelde Beenbreuken. Ik ben gewoon, 'er my ook van te bedienen in de eenvoudige van den Dye, en het Been; en doe zulks met eenen uitflag, welke volkomen beantwoord aan het oogmerk.

A A N M E R K I N G.

IK hebbe, in den loop deezes Deels, verscheiden Verbanden aangepreezen, van dewelke geene Beschryving, of Afbeelding gegeven zyn. Deeze zyn inzonderheid de *Kaak-Slingerband van SORANUS*, het *Veréénigend Verband der dwersche Halswonden*, en de *Veréénigende Band van de dwersche Wonden der Ledemaaten*.—

Het eerste dezer Verbanden, is zoo gemeenzaam, en dus bekend by alle Heelmeeesters, dat deszelfs Beschryving my toefcheen; buiten de paalen te vallen van myn Bestek.

Het tweede verdiende geene byzondere Afbeelding, om dat het niet anders is, dan het *Verband des Lighaams* zonder den Schouderband, waaraan van boven en vooren, twee smalle strooken Linnen gehegt zyn, welke ter weêrzyden, langs het vooröver geboogen Hoofd, opwaards geleid zynde, aan de Muts worden vastgespeld.

Het laatste dagt my, dat uit eene enkele Beschryving genoeg konde begreepen worden; als flegts bestaande uit twee dikke pleister Compresen, breed twee dwersche Vingeren, en lang genoeg, om den halven omtrek te omvatten van het Deel; gelegt, de eene onmiddelyk boven, de andere beneden de Wonde; en aangeslooten door twee lange strooken Kleefpleister, ter breedte van drie dwersche Vingeren ieder, waar van de bovenste schuins nederwaards, de onderste schuins opwaards, over voorgemelde Drukdoeken, en rondom het Deel gevoerd worden.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 7.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 8.




Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.











Fig. 6.












Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 1.





Fig. 4.






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 1.





Fig. 2.






Fig. 3.



Fig. 1.





Fig. 6.



Fig. 4.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 7.




Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.






Fig. 1.




Fig. 3.





Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 2.




Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 4.

